

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы		044-80/11 ()
Әдістемелік нұсқаулық		64 беттің 1 беті

**«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ жанындағы
медицина колледжі**

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ

Пән: «Шұғыл мейіргерлік күтім»

Мамандығы: 09130100 – «Мейіргер ісі»

Біліктілігі: 4S09130103- «Жалпы практикадағы мейіргер»

Курс: 2

Семестр: 4

Қорытынды бақылау түрі: Д/сынақ

Жалпы еңбек сыйымдылығы сағат/кредиттер: КЗ:24/1

Аудитория: 24

Шымкент, 2023 ж.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы		044-80/11 ()
Әдістемелік нұсқаулық		64 беттің 2 беті

Әдістемелік нұсқаулық «Шұғыл мейіргерлік күтім» пәнінің жұмыс бағдарламасы (силлабусы) негізінде құрастырылды.

Оқытушы: Совет А.Ә.

Мамандығы: 0302000 "Мейіргер ісі"

Біліктілігі: 0302043 "Жалпы практика мейіргері"

Әдістемелік нұсқаулық «Мейіргер ісі-2» кафедра мәжілісінде қаралды.

Хаттама № 1 " 1 " 09 2023 ж.

Кафедра менгерушісі: Г.Н. Айбекова Айбекова Г.Н.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 3 беті

1- сабақ

5. 1. Сабақтың тақырыбы: Кіріспе. Шұғыл жағдайларда ауруханаға дейінгі кезеңде науқасты клиникалық зерттеу және диагностикалау әдістері.

5. 2. Сабақтың мақсаты:

- Қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету.
- Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету.

5. 3. Пәннің міндеттері:

Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету әрекеттерін орындау, өзінің рөлдерін, құқықтары мен лимиттерін түсіну, нормативтік – құқықтық актілерге және шұғыл көмек көрсету кезінде ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес өзінің іс-әрекеті мен әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті өзіне алуы, мейірбикелік күтімнің сапасын жақсарту үшін кәсіби қызметке шұғыл көмек көрсету кезінде басқару ережелерін ұстану.

5. 4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

1. Алғашқы көмек дегеніміз не?
2. Зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету принциптері

Алғашқы көмек — адам өміріне немесе денсаулығына кенеттен қауіп төнгенде оның өмірін сақтап қалу үшін немесе апаттың зиянды әсерін азайту үшін қолданылатын қарапайым шаралар. Апаттың қатарына әр түрлі жарақаттар, сынық, буынның шығуы, улану, суға бату, күйу, ұсу, электр тоғы соғу, т.б. жатады. Алғашқы көмектің негізгі шаралары: апатқа түскен адамды апат әсерінен құтқару (өрттен, судан шығару); апаттың зиянды әсерін тоқтату (адамды жылыту, иіс тисе таза ауа жұтқызу); қан тоқтату, жараны байлау, сынған аяқтың немесе қолдың қозғалысын тежеу; жасанды дем алдыру, жүрекке жабық массаж жасау, апатқа түскен адамды тезірек емдеу мекемесіне жеткізу немесе жедел медициналық көмек көрсететін дәрігерлер тобын шақыру.

Бірінші рет қарау, зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету (бірінші кезекте, өмірлік маңызды органдарға төнген қауіпті анықтауға бағытталған) ол:

1. есін тексеру (ми жүйесі);
2. тынысын тексеру;
3. пульсін тексеру (жүректің жұмысын);
4. жедел жәрдем шақыру .

Есін тексеру - Зардап шегушінің есінен айырылмағанын анықтаңыз. - Егер ол қатты айқай, иығынан жұлқылау сияқты сыртқы тітіркендіргіштерді сезбесе, оны көмек көрсетуге келісті деп есептеңіз.

Жалпы жүйеліктегі алғашқы медициналық жәрдем көрсетуде зардап шегушіні қарау маңызды бөлімге жатады. Оның әрқашан бірінші басын тексеру керек, содан кейін қолмен ұстап қарайды. Ол бас сүйегінің жұмсарғанын немесе жарылғанын, қанталаудың болуын айқындауға мүмкіндік береді. Бет жүзін тексергенде оның түсіне көңіл аудару керек. Бозғылт, терлеген, беті суық, көзі жұмылған және аузы ашық болса, естен тану жағдайында екенін дәлелдейді. Беті ысып, қызарып тұрса қызбалықты білдіреді. Мұрыннан қан кету бас сүйегінің, мұрын сүйектері немесе мұрынның қан тамырлары зақымдану салдарынан болуы мүмкін. Егер де мұрын сынған болса, оны байқау оңай. Көзді қарап тексеру басқа денелерді, жараны анықтау, көз қарашықтарының ұлғаю жағдайын, олардың жарыққа реакциясын анықтау үшін жасалады.

Көзбен қатар бас сүйегінің жарақат қауіптілігін дәлелдейтін, құлақтың жарғағы қаралады, есту және құлақтан шығатын сұйықтық тексеріледі.

Ауыз қуыстарын тексергенде ауыздың зақымдануына, ерін түсіне, тістердің бүтіндігіне және жақ сүйектеріне ерекше көңіл бөлінеді. Бозарған ерін жүректің кемшіліктерін, ал көгерген ерін оттегі жетіспеушілігін көрсетеді. Ауыздан шыққан сұйықтық қан түсті болса, ішкі ағзалардың, тыныс алу және ас қорыту жолдарының бұзылуын білдіреді.

QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	044-80/11 ()	
Әдістемелік нұсқаулық	64 беттің 4 беті	

Мойынды жағаны шешкеннен кейін қарайды, сонымен бірге мойын омыртқа бөлігінің бүтіндігін, оның функцияларын тексереді, мойнынан зорлықпен өлтіру ізін іздейді.

Зардап шегушінің арқасын тексеру үшін ішіне немесе қырынан жатқызу керек, егер де мұндай мүмкіншілік болса, арқасына қол сұғып ұстап қарайды. Бұл жұмыс процесінде сүйектердің, жұмсақ тіндердің зақымдалған орындары, аурудың шоғырланған жерлері анықталады. Арқаны тексеру кезінде омыртқаның күйіне ерекше көңіл бөлу керек

Кеуденің алдыңғы бөлігін қарағанда бұғананың бүтіндігін олардың ортаңғы бөлігін басу арқылы тексереді, содан кейін зардап шегушінің терең дем алуын сұрайды; егер де қабырға және кеуде клеткалары зақымдалмаса, онда тыныс алу түзу, ауырмайтын, бір қалыпты болады.

Кеуденің үстіңгі жағын тексеріп болғаннан кейін ішті және жамбас сүйегіне тексеріс жүргізіледі. Қол-аяқты көзбен шолып тексеруде зақымданған жері болса қолмен тексеру біруақытта жүргізіледі.

Сонымен қатар қол-аяқтың қозғалыс функциясын, олардың бүтіндігін, сезімталдығын, деформацияның бар жоғын, жара болған жерді, қансырауын тексереді.

Тексеру зардап шегушінің жай-күйін анықтауға мүмкіндік береді, едәуір зақымданған аумақтарды айқындайды, алғашқы жәрдем көрсету жолдарын белгілейді.

5.5. Оқыту және оқыту әдістері (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

5.6. Әдебиет. Соңғы бетте

5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер:

1. Алғашқы медициналық көмек көлеміне ... кіреді.
 - A. -сыртқы қан кетуді уақытша тоқтату
 - B. -қан және қан алмастырғыштарды құю
 - C. -жараны біріншілік хирургиялық өңдеу
 - D. -қантамырды ұзына бойы тігу
 - E. -қан тамырға тігіс салу
2. Қарыншалық фибрилляция кезіндегі алғашқы көмек:
 - A. -электрлік дефибрилляция
 - B. -лидокаинді көктамырға енгізу
 - C. -калий хлориді, кальций хлориді, атропинді енгізу
 - D. -жүректің жабық массажын жасау
 - E. -амиодаронды көк тамырға енгізу
3. Жүрек тоқтаған кезде ... қолданылады.
 - A. -адреналин
 - B. -кардиамин
 - C. -дроперидол
 - D. -фуросемид
 - E. -димедрол
4. Эклампсиядағы ауруханаға дейінгі көмек ...болып табылады.
 - A. -магнезиялы терапия
 - B. -жүрек гликозидтері
 - C. -33 % спирт
 - D. -мезатон
 - E. -седативті дәрілерді тағайындау
5. Тырысуды басу үшін ... қолданылады.
 - A. -реланиум
 - B. -эуфиллин
 - C. -гормондар
 - D. -атропин

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 5 беті

- Е. -адреналин
6. Стенокардия ұстамасы кезіндегі жедел көмекте ... беру керек.
- тіл астына нитроглицерин
 - ингаляциялық жолмен астмопент
 - тері астына димедрол
 - ішке преднизолон
 - көк тамырға атропин
7. 22 жастағы жас қыз капотен 10 таблеткасын ішіп уланды. Науқастың басы айналды, әлсізденді, көзі қарауытты. Үрейленіп жедел жәрдемді шақырды. Көмек көрсетуді қандай шарадан бастау қажет?
- асқазанды шаюдан
 - жасанды дем беруден
 - гипертензияті дәрмек енгізуден
 - жүрекке тікелей емес массаж жасаудан
 - жүрекке тікелей массаж жасаудан
8. Алғашқы медициналық көмек көлеміне ... кіреді.
- сыртқы қан кетуді уақытша тоқтату
 - қан және қан алмастырғыштарды құю
 - жараны біріншілік хирургиялық өңдеу
 - қан тамырды ұзына бойы тігу
 - қан тамырға тігіс салу
9. Эпилепсиялық ұстама кезінде бірінші кезекте:
- асфиксияны болдырмау
 - объективті тексеру жүргізу
 - тілді тістеп қалмауды қадағалау
 - тырысуды болдырмау
 - тыныштандыратын дәріні енгізу
10. Бүйрек ұстамасы кезіндегі жедел көмек
- но-шпаны енгізу
 - преднизолонды енгізу
 - дибазолды енгізу
 - лазиксті енгізу
 - кетоналды енгізу

Ситуациялық есеп:

Сіз көшеде өмір белгілері жоқ адамды таптыңыз.

Объективті: сана жоқ, каротид артериясындағы импульс анықталмайды, кеуде қуысының қозғалысы көрінбейді.

Тапсырма:

- Сіздің алдын ала диагнозыңыз?
- Сіздің дгэ тактикаңыз?

2- сабақ

5. 1. Дәрістің тақырыбы: Терминальды жағдайлар. Жүрек-өкпе реанимациясының әдістері.

5. 2. Сабақтың мақсаты:

- Қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету.
- Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету.

5. 3. Пәннің міндеттері:

Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету әрекеттерін орындау, өзінің рөлдерін, құқықтары мен

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 6 беті

лимиттерін түсіну, нормативтік – құқықтық актілерге және шұғыл көмек көрсету кезінде ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес өзінің іс-әрекеті мен әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті өзіне алуы, мейірбикелік күтімнің сапасын жақсарту үшін кәсіби қызметке шұғыл көмек көрсету кезінде басқару ережелерін ұстану.

5. 4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

1. Сафардың үш құрамды әдісін жүргізу?
2. Терминалды жағдайлар дегеніміз не?

Терминалды жағдайлар-(латынша terminalis- соңы,шегі) –АҚҚ-ның өте қатты төмендеп, метаболизмнің және газалмасуының терең бұзылуымен жүретін,өмір мен өлім арасындағы тіршілікке қабілеттіліктің критикалық деңгейі. СССР академигі В.А. Неговскийдің классификациясы бойынша терминалды жағдайдың 3 түрі бар: предагония, агония, клиникалық өлім. Сонымен қоса қазіргі таңда ТЖ-ға реанимациядан қайта тірілген организмді де жатқызады.Ол жағдай реаниматологияның жақсы дамуына байланысты.Ол жағдайлар өте күрделі патофизиологиялық құрылымды болғандықтан дәрігерден арнайы комплексті емді қажет етеді.

Сонымен қоса терминалды жағдайдың сатыларын қазіргі таңда былай жіктеуге болады:

- Ауыр шок (шок IV степени);
- Терең кома 4 балл және одан төмен;
- Коллапс;
- Терминалды пауза;
- преагония (преагональное состояние);
- агония (агональное состояние);
- Клиникалық өлім.

Егер клиникалық өлімнен науқасты сақтап қала алмасақ биологиялық өлім п.б.

Кенеттен өлім-белгілі бір ауыруы жоқ, қалыпты жағдайдағы адамдарда- аяқ астынан немесе 60 минут ішінде өзін жайсыз сезінумен болатын жағдай. Бұл жағдайға қинап өлтіру,травмалар, асфикция,суға бату,улану алып келмейді. КӨ себептері кардиальді және экстракардиальді деп бөлінеді. К-ді себептерге:

- Қарыншалар фибриляциясы;
- Пульсі жоқ қарыншалық тахикардия;
- Толық АВ-блокада;
- Асистолия;
- Электромеханикалық диссоциация;
- Анық тамырлық дистония.

Терминалды жағдай кезіндегі науқас жағдайын бағалау критерийі

- 1.Ұйқы және сан артерияларындағы пульсты бағалау;
 - 2.Тыныстың бар жоқтығын анықтау.Ол үшін дәрігер науқастың кеудесіне құлағын қойып,н/е айнаны мұрнына,аузына жақындатып,және пинцетпен жіп не мақта ұстап байқауға болады.
 - 3.Науқастағы команы Глазго шкаласымен анықтаймыз.
 - 4.Қарашық рефлексін бағалау үшін қабақты ашып қарашықты байқаймыз, одан соң қабақты қайтадан бірден ашқанда қарашық өзгермесе онда “қарашық” рефлексі теріс деген сөз.
- Егер жоғарыда айтылған 4 белгінің біреуі болса,тез арада реанимациялық шараны 1-4 минут ішінде жүргізу керек.

Науқастарға жүрек-өкпе-милық реанимация алғашқы 1-2-3-4 минуттарда жүргізілуі керек себебі миға қоректік зат болып, анаэробты гликолизді жүргізетін мидағы глюкоза қоры тек осы сәтке ғана жетеді. Реанимацияның негізгі міндеттері:

1. Эффективті гемодинамиканы қалыптастыру;
2. Тыныс алуды қалыптастыру;
3. Бас миының жұмысын қалыптастыру және реттеу;

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 7 беті

4. Терминальді жағдай рецидивінің алдын алу;

5. Асқынулардың алдын алу;

Жүрек-өкпе реанимациясын жүргізудің алгоритмы

1. Көмекке мұқтаж адаммен байланысу қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз. **Адамның жауап беру қабілетін тексеріңіз** реакцияны тексеріңіз. Олардың иығын сілкіп, қатты дауыстап: «Жақсысың ба?» Деп сұра. Нәресте үшін аяқтың түбін түртіп,

2. Жедел медициналық көмекті шақыру: зардап шегушінің ес-түссіз жағдайында жедел медициналық жәрдем бригадасын шақыру.

3. Ұйқы артериясының тамыр соғуын анықтау: - 2, 3 және 4 саусақтарды біріктіріп трахеяның шығыңқырап тұрған бөлігін анықтайды; - саусақтарды тереңге және сыртқа қарай шеміршек пен төс-бұғана-емізікті бұлшық еттің аралығына жылжыту; - ұйқы артериясын сипап тамыр соғуын анықтау.

4. Пациенттің өз еркімен тыныс алуын анықтау үшін «Көремін, естимін, сезінемін» тәсілі қолданылады: - көзбен көкірек қуысының қимылын бақылау; - құлақпен ауыз қуысынан шыққан дем алған шуылды тыңдау; - бетпен деммен шыққан ауаның қозғалысын сезіну.

Жүрек-өкпе реанимациясын жүргізу

5. Пациентті дайындау: Пациентті шалқасынан қатты тегіс жерге жатқызып, мойыны мен кеудесін жалаңаштау, аяқ жағын көтеру.

6. Зардап шегушінің төсіне қолды дұрыс қою: қол төс сүйегіне перпендикулярлы оның ортаңғы үштен бір бөлігіне қойылады. Жұмысшы қолдың теноры мен гипотеноры сүйеу нүктесі болады. Сол қол оң қолдың сыртына қойылады.

7. Тікелей емес жүрек массажын жүргізу: минутына 100 компрессиядан кем емес жылдамдықпен, яғни 18 секундта 30 компрессия (дауыстап санау) және компрессия тереңдігі 5 см. кем емес – ересектер үшін, алақанды көкіректен алмай, минималды үзіліспен, кеуде қуысының әр компрессиядан соң бастапқы қалпына келуіне мүмкіншілік жасай отырып жүргізу. Компрессияны тез және күшпен жасау керек. Қол шынтақ буынында толық түзетіледі және күш тек қана тіке салынады.

8. Ауыз қуысын көру: тыныс жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін ауыз қуысы қаралып, тазартылады, алмалы-салмалы протез алып тасталынады.

Сафардың үш құрамды әдісін жүргізу

9. Басты шалқайту: бір қолмен зардап шегушінің маңдай-төбе аймағынан ұстап басын шалқайту.

10. Жақ сүйегін алға қарай жылжыту: сонымен қатар иегін көтере отырып төменгі жақ сүйегін алға қарай жылжыту.

11. Науқастың ауызын ашу.

Өкпенің жасанды вентиляциясын жасау

12. Науқастың мұрынын (ауызын) жабу: өкпенің жасанды вентиляциясын жасау үшін «ауыздан-ауызға» әдісі немесе Амбу дорбасы қолданылады. Өкпенің жасанды вентиляциясы «ауыздан-ауызға» әдісін қолданғанда қауіпсіздік шараларын және гигиенаны сақтау үшін ылғалды салфетка немесе бинт кесігі арқылы жасалынады. Бір қолды науқастың мойны мен желкесінің астына жіберіп екінші қолды оның маңдайына қойып басын артқа қарай шалқайтады. Маңдайға қойылған қолмен мұрынды ауа шықпайтындай етіп қысу.

13. Тыныс жолдарына дем жіберу: демді ішке терең алып, ерінмен зардап шегушінің еріндерін тығыз қамтып алып, өкпедегі барлық ауаны зардап шегушінің кеуде қуысы көтерілетінде етіп тыныс жолдарына жігерлі үрлеу керек. Келесі демді кеуде қуысы алғашқы қалпына келгенде жасайды. Тыныс циклдарының аралығы 1 минутына 8-10 жиі болмауы керек (4-5 санағанда – 1 цикл). Науқасқа үрлеп берілетін ауаның көлемі әдеттегі көлемнен 50% көп болуы керек.

14. Компрессия мен өкпенің жасанды вентиляциясының арақатынасы 30:2 болуы керек.

15. Жүрек-өкпе реанимациясының 1 периоды 5 цикл 2 минуттың ішінде жүргізу.

16. Жүрек-өкпе реанимациясының нәтижелігін анықтау (стоп-анализ): ұйқы артериясында тамыр соғуын анықтау.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 8 беті

17. Пациенттің ары қарай реанимациялық бөлімге жіберу және оларға науқас жеткізілетіндігін ескерту керек.

5.5. Оқыту және оқыту әдістері (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

5.6. Әдебиет. Соңғы бетте

5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер:

1.Зардап шегуші қозғалыссыз, сыртқы жағдайға назар аудармайды. Тынысы және білек артериясының тамыр соғысы жоқ. Ұйқы артериясында тамыр соғысы әлсіз байқалады. Жоғарғы тыныс жолдарын ашу мақсатында.Сафардың үштік әдісін қолдана отырып, тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін бірінші кезекте... .

- A. -астыңғы жағын алға жылжытып аузын ашу керек
- B. -басын биіктетіп ұстау керек
- C. -басын артқа шалқайту керек
- D. -жәбірленушінің ауыз қуысын қарап, тазалау керек
- E. -ауа өткізгіш түтікше қою керек

2.Науқастың тыныс жолдарында бөгде зат анықталғанда мейірбикенің іс әрекеті:

- A. -Геймлих әдісін қолдану
- B. -коникотомия жасау
- C. -Сафардың 3 кезеңнен тұратын әдісін қолдану
- D. -мамандандырылған бригаданы шақыру
- E. -науқасты ауруханаға жатқызу

3.Қанды көрген кезде науқас талып қалғанда орындалатын іс әрекет:

- A. -мүсәтір спиртті мақтаны иіскеуге беру
- B. -басын көтеріп жатқызу
- C. -науқасты горизонтальды жатқызу
- D. -таза ауамен қамтамасыз ету
- E. -тілдің астына нитроглицеринді салу

4.28 жастағы науқас А. үйінде ауыр жағдайда табылды. Шағымдары: басының самай бөлігінің қатты ауырсынуы, басы айналуы, жүрек айнуы, құсуы, ентігіп ауа жетіспеуі. Науқастың айтуы бойынша осы жағдай жұмыс орнындағы от жағатын жүйенің ақаулары салдарынан кейін дамығанын айтады. Емдік шараларды бірінші кезекте бастауға болады:

- A. -науқасты таза ауаға шығару
- B. -өкпені жасанды желдендіру
- C. -науқасты тасымалдау
- D. -науқасты ауруханаға жатқызу
- E. -өкпе-жүрек реанимациясын жүргізу

5.Үлкендерге өкпе-жүрек реанимациясын бір адам жүргізген кезіндегі дем беру мен компрессияның арақатынасы:

- A. -30:2
- B. -4 :3
- C. -1 :5
- D. -2 :4
- E. -3 :6

6.30 жастағы әйел жерде ессіз жатыр. Тері қабаты сұр, цианозды. Жағы тырысқан, басы артқа шалқайған. Аяқ- қолы жартылай бүгілген, бұлшық еті тырысқан. Көз қарашығы екі жақтан кеңейген, жарыққа әсері жоқ. Қарағаннан кейін бірнеше секундтан соң, екі жақты бет бұлшық еті және аяқ-қолдың дірілі байқалады. Ауыздан қызғылт көпіршік ақты. Болжамды диагноз:

- A. -қояншық ұстамасы
- B. -агональді жағдай

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 9 беті

- C. -клиникалық өлім
- D. -истерия ұстамасы
- E. -кома

7.Естен танған науқасқа жәрдем көрсеткенде...қалыпын беру керек.

- A. -аяқты көтерумен горизонтальды
- B. -аяқтар бастан төмендеген
- C. -жартылай отыру
- D. -вертикальды
- E. -горизонтальды

8.Зақымданған адам арқасымен жатыр, көзі жұмулы, тынысы қиындаған, сирек, тері және шырышты қабықтары бозарыңқы, екі тізесі де зақымданған, көптеген кансыраған жаралар байқалады, екі тізесінің буындары сыртқа бұрылған, тамыр соғысы әлсіз пальпацияланады, жиі. Кенет көз алдыңызда жаралы адамның тынысы тоқтады. Дәрігерге дейінгі жасалынатын шара:

- A. -жүрек- өкпе реанимациясын жүргізу
- B. -қолда затпен иммобилизациялау
- C. -бұлшық ет ішіне анальгетиктерді егу
- D. -тері астынан анатоксин енгізу
- E. -жатқан жайда ошақтан эвакуациялау

9.28 жастағы науқас А. үйінде ауыр жағдайда табылды. Шағымдары: басының самай бөлігінің қатты ауырсынуы, басы айналуы, жүрек айнуы, құсуы, енгізіп ауа жетіспеуі. Науқастың айтуы бойынша осы жағдай жұмыс орнындағы от жағатын жүйенің ақаулары салдарынан кейін дамығанын айтады. Емдік шараларды бірінші кезекте бастауға болады:

- A. -науқасты таза ауаға шығару
- B. -өкпені жасанды желдендіру
- C. -науқасты тасымалдау
- D. -науқасты ауруханаға жатқызу
- E. -өкпе-жүрек реанимациясын жүргізу

10.Жүрек соғысы тоқтауының негізгі белгісі:

- A. ұйқы артериясында тамыр соғысынның болмауы
- B. өздігінен тыныс алуының болмауы
- C. көз қарашығының ұлғайуы
- D. есінің болмауы
- E. білек артериясында тамыр соғысынның болмауы

Ситуациялық есеп-1

Госпитальға дейінгі кезеңде жүргізілген жүрек - өкпе реанимация шараларынан кейін: аппаратта Өкпені жасанды желдендіру , жүрекке тікелей емес массаж, медикаментозды және инфузиялы терапия барысында – науқаста жүрек қызметі жағынан Жүрек соғуының жиілігі минутына 104 рет соға бастады, АҚ 145/80 мм.сп.бб,. Науқас әлі де ес – түссіз, өзі тыныс ала алмайды.

Тапсырма:

1. Гипоксиялық комадан шығару бойынша (бақылау – диагностикалық және емдік) жүргізілетін реанимациялық іс – шаралардың жоспарын құрыңыз.

Ситуациялық есеп-2

2. Қабылдау бөліміне 53 жастағы ер кісі төс артындағы және эпигастрий аймағындағы күйдіріп ауырсынуына, көңілінің айнуына, құсуға, басының айналуына, өлімнен қорқу үрейіне шағымданып қаралды. Анальгетиктерден және нитроглицериннен әсер болмаған. Науқас денесі мұздай тер басқан, боз, акроцианоз. Пульсы жіп тәрізді, жүрек тондары тұйықталған, ырғағы бұзылған экстрасистолия. Жүрек соғуының жиілігі минутына 54 рет. АҚ 60/40 мм.сп.бб.

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 10 беті

Кенеттен науқас есін жоғалтты, бірден бозарды, тынысы тоқтады, ұйқы артериясында пульсы анықталмайды, көз қарашықтары кеңейген, фотореакциясы жоқ.

Тапсырма:

1. Диагноз қойыңыз.
2. Сіздің қолданатын шараларыңыз.

3- сабақ

5. 1. Дәрістің тақырыбы: Ауырсынуды басу, жарақаттар (ашық, жабық) кезіндегі шұғыл мейіргерлік күтім. Десмургия. Жарақаттар. Көліктік иммобилизация.

5. 2. Сабақтың мақсаты:

- Қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету.
- Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету.

5. 3. Пәннің міндеттері:

Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету әрекеттерін орындау, өзінің рөлдерін, құқықтары мен лимиттерін түсіну, нормативтік – құқықтық актілерге және шұғыл көмек көрсету кезінде ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес өзінің іс-әрекеті мен әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті өзіне алуы, мейірбикелік күтімнің сапасын жақсарту үшін кәсіби қызметке шұғыл көмек көрсету кезінде басқару ережелерін ұстану.

5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

1. Жабық жарақат кезіндегі мейіргерлік көмек?
2. Иммобилизация түрлері?

Жарақаттар – бұл адам ұлпалары мен органдарының зақымдануы, сыртқы себептерден аяқ-қолдың сынуы мен буынның шығуынан, жұмсақ ұлпаның жаралануы мен дененің сыдырылуынан, органдардың зақымдануынан және көптеген басқа жайттардың әсерінен ұлпалар мен органдар тұтастығы мен қызметінің бұзылуы.

Алғашқы көмек – зардап шеккен адамның жарақатын асқындырмай, оған әртүрлі медициналық көмек шараларын дұрыс көрсетіп, оның өмірін сақтап қалуға бағытталған іс-әрекет. Сондықтан да жарақаттанған адамның өмірі мен патологиялық процестердің одан арғы салдары көбінесе апат болған жердегі алғашқы көмектің көрсетілген уақыты мен оның сапасына тығыз байланысты. Ашық зақымдалу, немесе жара, кілегейлі қабықша мен тері жамылғысының тұтастығының бұзылуы — бұл сыртқы жара, ал ішкі жара қан кетумен сипатталады (көкірек, құрсақ қуысы, ми сауытында). Жаралардың зақымдануына жарақаттаушы зат формасына, құрал түрлеріне қарай бірнеше түрі бар.

Жарақаттардың түрлері:

1. Тері бүтіндігінің бұзылуы бойынша жарақаттар бөлінеді: ашық және жабық жарақаттар. Ашық жарақатқа ұлпа мен ағзалардың анатомиялық тұтастығының бұзылуы жатады: жара, сынық, күйік, буынның таюы. Жабық жарақатқа - терінің сыдырылуы, сіңірдің созылуы, бұлшық еттің жаншылуы, аяқ - қолдың буыннан шығуы, сүйектің жабық сынуы.
2. Жедел және созылмалы жарақаттар. Жедел дегеніміз ағза ұлпасында бір сәтте қатты әсер ету нәтижесінде пайда болған зақымдану. Созылмалы дегеніміз аз күштің көп мәрте және тұрақты әсерінен пайда болған зақымдану.
3. Тікелей және тікелей емес жарақаттар. Тікелей жарақаттар соққы тиген жерде пайда болады. Тікелей емес жарақаттар, ағзаның басқа жерінде пайда болған жарақаттар.
4. Қайтымды және қайтымсыз жарақаттар.

Жарақаттың себебі - механикалық факторлар (соғылу, ауыр салмақты плитаның астында қалу, биіктен құлау).- химикалық факторлар (қышқылдардың, улағыш заттардың әсері).- физикалық факторлар (ыстық, суық, қысым, электр тогының, рентген, иондаушы сәулелердің әсері).-

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 11 беті

биологиялық факторлар (бактериялардың, вирустардың, басқа макро және микроағзалардың әсері)- психикалық факторлар (қорқу, ренжу, абыржу салдарынан).

Жарақаттанушылықтың түрлері:

- 1) транспорттық (автокөліктік, темір, әуе, су жол көліктік),
- 2) өндірістік (өнеркәсіптік, ауылшаруашылық),
- 3) балалық,
- 4) тұрмыстық,
- 5) спорттық,
- 6) көшелік,
- 7) әскерлік,
- 8) жасандық (суицидтік) жарақаттанушылық.

Жергілікті белгілері: дененің зақымданған бөлігінің ауырсынуы, бозаруы, ісінуі, қан кетуі, қызметінің бұзылуы.

Жалпы белгілер: ес-түсінен айырылуы, ыстығы көтерілуі, тамырдың нашар соғуы, артериалық қысымның төмендеуі, тыныс алудың, зат алмасудың бұзылуы және т.б.

Жарақаттардың асқынуы: жарақаттық шок, талықсу; қансырау, қан кету; жара инфекциясы; өмірге маңызды мүшелердің қызметінің (жүрек, бүйрек, өкпе) бұзылуы. Әсіресе ауыр зақым алғанда, оқ тигенде есінен танады. Зақымданған кезде миға келетін қан күрт азаятын болса да адам ес-түсін білмей қалады. Мұндай жағдайда естен тануды шок деп атайды.

Шоктың төрт дәрежесі бар.

I дәрежелі шок – орташа жарақат алған кезде болады. Мұндайда тері бозарады, кейде көгереді, бұлшық еттері дірілдейді. Тыныс алу минутына 90-100-ге қан қысымы сынап бағанасынан 100/60 мм-ге дейін төмендейді.

II дәрежелі шок — ауыр жарақат алғанда пайда болады. Мұндай жағдайда шырышты қабаты мен тері бұзылады. Адам сүлесок жатады, айналасына көңіл аудармайды, жай баяу сөйлейді. Тыныс алу минутына 30-ға, тамырының соғуы 120-ға дейін жиілейді, қан қысымы, дене қызуы едәуір төмендейді.

III дәрежелі шок. Көп зақым немесе көп жарақат алған кезде пайда болады. Мұндайда аурудың жалпы жағдайы ауырлайды, терісі бозарады, көгереді, есінен танады, қойған сұраққа естілер естілмес жауап береді. Тамыр соғуы минутына 120-140-қа жетеді, дене қызуы төмендейді. Қан қысымы 60-30 мм-ге дейін төмендейді.

IV дәрежелі шок кезінде ауру есінен танады, тамыр соғуы білінбейді, қан қысымы өте төмен болады, тыныс алуы сирек әрі үстүрт болады. Денеден қан көп кетсе немесе ағза салқындаса, шаршап қалса, тасымалдағанда қосымша зақым келтіріп алса, тасымалдағанда көлікпен селкілдесе, ауруын басатын дәрі берілмесе, адам естен танады. Мұны жарақаттық шок деп атайды. Мұндай жағдайда әуелі алғашқы көмек көрсетіп алу керек. Қан ақса, тез уақытта тоқтату керек. Егер кеуде жотасы үңірейіп тұрса, ондай жағдайда герметикалық таңғыш салады. Ал сүйек сынса, сүйек қозғалып кетпейтіндей етіп таңады, зақымданған болса, онда ыстық кофе мен шай беру керек. Жарақат қай жерде болса да, ол түрі мен ауырлығына қарай жанға батады. Ауру қатты болған сайын зақым алған адамның хал-жағдайы нашарлайды, ауруы асқынады.

Зардап шегушінің ауруын азайту үшін мына тәсілдер қолданылады:

1. Зардап шегушінің үстін жауып, салқындап қалмауын қадағалау.
2. Сынғанда иммобилизация жасау (жақтау қою).
3. Зембілге жатқызу.
4. Құрғақ, сұйық заттарды қолдану (полиэтилен қалтасына салынған мұз, қар, мұздай су) жүйке жүйелерін механикалық тітіркенуден қорғайды, ісігін және жарақаттың қабынуын азайтады.
5. Дәрі-дәрмектен амидопиринді 0,5 г., анальгинді 0,5-1,0 г., ацетилсалицил қышқылын 0,5-1,0 г мөлшерінде қолданған дұрыс.
6. Тасымалдағанда ауруханаға көп селкілдетпей, ұқыпты түрде жеткізген жөн.

Көмек көрсетуші адам жарақаттың түрін оның ауырлығын анықтап, тыныс жолдары мен жүрек

QONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 12 беті

қызметінің бұзылғанын ескеріп жедел шара қолдана білу қажет. Зақымданған адам қаны тоқтамай ағып жатса, оны тоқтатып, жарасын таңа білу, сынған жеріне жақтауды дұрыс қойып байлау, ауруды орнынан қозғаған кезде оны дұрыс көтеріп, тасымалдай білу, зардап шегушіні қауіпті аймақтан уақытында алып кету, үстіндегі киімін дұрыс шешу

Десмургия – дененің жарақаттанған не ауырған жеріне қозғалмайтындай жағдай жасау. Әсіресе, қол, аяқ, омыртқа жотасына қолданылады. Сүйек сынғанда жасаса, сүйектің ұсақ сынықтары қан тамырын, нерв талшықтарын т.б. тканьдерді зақымдамайды және сүйек тез бітеді. Сондай-ақ, жараны инфекция түсуден қорғайды. Қол–аяқ жарақаттанғанда (сынық, буын шығу, буын аурулары т.б.) сырқырап ауруын басады.

Иммобилизацияның уақытша, тұрақты, емдік түрлері болады. Уақытша иммобилизация жасағанда арнайы таңғыш пайдаланылады. Емдік иммобилизация – гипстеп таңу, тартып түзеті, ортопедиялық аппараттар және корсет кигізу. Иммобилизация жұмсақ және тез қататын гипс таңғышты бекітетін аппараттардың көмегімен жасалады. Қазір хирургияда жиі қолданылатын Иммобилизацияның бір түрі остеосинтез.

Иммобилизацияның транспорттық және емдік түрін ажыратады. Емдік иммобилизациядан транспорттықтың ерекшелігі-медициналық көмек көрсететін мекемегі зардап шеккенді жеткізгенге дейін зақымданған жерді иммобилизациялау.Сөйтіп, транспортты иммобилизация шоктың, тіндердің (тері, бұлшықет, тамыр, жүйке) сүйек жарықшалары мен екіншілік зақымдануының,инфекциялық асқынудың алдын алады. Транспорттық иммобилизация көрсеткіштеріне сүйек пен буын, ірі қан тамыр мен жүйке бағаны, жұмсақ тіндердің массивті зақымданулары, күйік, үсу,аяқ-қолдардың ұзақ қысылу синдромы жатады.Кері көрсеткіштер жоқ десек те болады. Транспорттық иммобилизация құралдарын екіге-стандартты шиналар және қолда бар құралдарға бөледі

Транспорттық шина салу ережелері: Транспорттық иммобилизация жарақат алған мезеттен кейін неғұрлым ерте жасалу керек. Транспорттық шиналар жарақат алған сегментпен қатар екі жанындағы буындарға да салыну керек.Сан сүйегі жарақаты кезінде үш буын иммобилизациялану керек (жамбас, тізе, табан) және иық жарақатында да. Аяқ-қолды иммобилизациялау үшін ортафизиологиялық жағдайға келтіру керек. Транспорттық шиналарды киім,аяқ киім үстінен салу керек, оның мақсаты ,біріншіден, шешіндіру кезінде қосымша травматизацияның алдын алу,екіншіден, киімді жұмсақ төсеніш ретінде пайдалану. Тіндер қосымша зақымданбау үшін шина салынбастан бұрын дене контурына сай модельдену керек,аяқ-қол жұмсақ төсенішпен оралу керек,ал сүйектің шығыңқы жерлеріне дәкеден не матадан төсеніш салу керек.Шинаны салғаннан кейін модельдемейді, ол қосымша жарақат етуі мүмкін.Қолда бар материалдардың кемшілігі дене контурына сай модельденбеуі. Шинаны тым тығыз орауға болмайды, себебі ол жұмсақ тіндердің қысылуына, соңынан ауыр ишемиялық бұзылыстарға әкелуі мүмкін. Жабық жарақаттар кезінде ось деформациясын түзеу мақсатында шина салмастан бұрын аяқ-қолдың тракциясын жасау керек.Көп жағдайда бұл жарғақшалардың ығысуын азайтып,оның айналасындағы тіндерге , әсіресе теріге қысымын азайтады.Ашық сынықтар кезінде тракцияны жасауға болмайды,себебі онда сүйек жарғақшалары жұмсақ тіндер тереңдігіне еніп кетіп,жараны қосымша зақымдайды. Қысқы уақытта иммобилизденген аяқ-қолды қосымша жылы орау керек.

5.5. Оқыту және оқыту әдістері (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

5.6. Әдебиет. Соңғы бетте

5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер:

1. Мойын омыртқасы зақымданғанда транспорттық иммобилизация ретінде ... қолданылады.

- A. -мақта-дәкелік Дельбе жағасы
- B. -Крамер шендеуіші
- C. -Дитерихса құрсауы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 13 беті

D. -айқасқан байламы

E. -«Тақия» байламы

2. Бас сүйегінің негізі сынғандағы көрініс:

A. -қан кету, мұрыннан және құлақтан ликвордың ағуы

B. -қабақтың ісінуі

C. -тері асты эмфиземасы

D. -көрудің қосарлануы

E. -тепе-теңдіктің бұзылысы

3. Сыныққа тән белгі:

A. -сүйек сықыры

B. -терінің көгеруі

C. -ісіну

D. -аяқ-қол қозғалысының шектелуі

E. -ауырсыну

4. Зақымданған адам арқасымен жатыр, көзі жұмулы, тынысы қиындаған, сирек, тері және шырышты қабықтары бозарыңқы, екі тізесі де зақымданған, көптеген кансыраған жаралар байқалады, екі тізесінің буындары сыртқа бұрылған, тамыр соғысы әлсіз пальпацияланады, жиі. Осы кезеңінде дәрігерге дейінгі бірінші кезектегі жасалынатын шара:

A. -бұлшық ет ішіне анальгетиктерді егу

B. -тері астынан анатоксин енгізу

C. -дәрі енгізу

D. -қолдағы затпен иммобилизациялау

E. -жатқан жайда ошақтан эвакуациялау

5. Зақымданған адам арқасымен жатыр, тері және шырышты қабықтары бозарыңқы, маңдайы салқын, дымқыл, демі жиі, сол қолында, шынтақтан жоғарырақ киімі жыртылған, алқызыл түсті қан атқылап аққан жара көрінеді. Зақымданған қозған, тұруға тырысады, қолының қызметі бұзылмаған. Бірінші кезектегі жасалынатын шара:

A. -иықтың төменгі бөлігінде артерияны саусақпен қысу

B. -жгут салуы

C. -асептикалық таңғыш салуы

D. -жатқан жайда ошақтан эвакуациялау

E. -тасымалдау алдында ыстық тәтті су беріп, жылыту

6. Зақымданған адам жерде отыр, жағдайы орташа, сирағының ортасындағы жараны көрсетеді. Жарасы терең, беттері тегіс емес, онда жер түйіршіктері және киім үзіктері көрінеді. Жарадан қошқыл түсті қан ағады. Бірінші кезектегі жасалынатын шара:

A. -жараны біріншілік өңдеу

B. -қан қысымын өлшеу

C. -жатқан жайда ошақтан эвакуациялау

D. -асептикалық басатын таңғыш салу

E. -бұлшық ет ішіне анальгетиктерді егу

7. Зақымданған адам арқасымен жатыр, көзі жұмулы, тынысы қиындаған, сирек, тері және шырышты қабықтары бозарыңқы, екі тізесі де зақымданған, көптеген кансыраған жаралар байқалады, екі тізесінің буындары сыртқа бұрылған, тамыр соғысы әлсіз пальпацияланады, жиі. Кенет көз алдыңызда жаралы адамның тынысы тоқтады. Дәрігерге дейінгі жасалынатын шара:

A. -жүрек- өкпе реанимациясын жүргізу

B. -қолда затпен иммобилизациялау

C. -бұлшық ет ішіне анальгетиктерді егу

D. -тері астынан анатоксин енгізу

E. -жатқан жайда ошақтан эвакуациялау

8. Басты иммобилизациялау әдісіне ... жатады.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 14 беті

- A. -«телпек» таңғышын салу
- B. -жәбірленушіні бүйірімен жатқызу
- C. -мақта-дәкелік Шанцтың жағасын салу
- D. -жәбірленушінің басын зембілге байлап бекіту
- E. -жәбірленушіні горизонтальды жатқызу

9. Омыртқаның мойын бөлігін иммобилизациялау әдісіне ... жатады.

- A. -мақта-дәкелік Шанцтың жағасын салу
- B. -жәбірленушінің басын зембілге байлап бекіту
- C. -қатты беткейге горизонтальды қалыпта жатқызу
- D. -жәбірленушіні бүйірімен жатқызу
- E. -жәбірленушінің басын көтеріп, аркасымен жатқызу

10. Сан сүйегінің сынығы кезінде тасымалдау иммобилизациясының қолайлы түрі:

- A. -Дитерихс шендеуішін салу
- B. -Крамер шендеуішін салу
- C. -пневматикалық шендеуіш салу
- D. -аяқ-қолдарды аутоиммобилизациялау
- E. -жәбірленушіні зембілге байлап бекіту

Ситуациялық есеп:

Ер адам бетінен соққы алды. Жұмсақ тіндердің ісінуіне байланысты бет асимметриясы, төменгі жақ аймағындағы гематома, тістеудің бұзылуы, төменгі жақ жиегіндегі "қадам" симптомы, фрагменттердің крепитациясы.

Тапсырма:

1. Науқастың төтенше жағдайын анықтаңыз.
2. Дәрігерге дейінгі көмек алгоритмін жасаңыз.
3. Таңу техникасын көрсетіңіз - "уздечка".

4-сабақ

5. 1. **Дәрістің тақырыбы:** Қан кету және гемостаз кезінде шұғыл мейіргерлік күтім көрсету.

5. 2. **Сабақтың мақсаты:**

- Қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету.
- Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету.

5. 3. **Пәннің міндеттері:**

Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету әрекеттерін орындау, өзінің рөлдерін, құқықтары мен лимиттерін түсіну, нормативтік – құқықтық актілерге және шұғыл көмек көрсету кезінде ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес өзінің іс-әрекеті мен әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті өзіне алуы, мейірбикелік күтімнің сапасын жақсарту үшін кәсіби қызметке шұғыл көмек көрсету кезінде басқару ережелерін ұстану.

5.4. **Тақырыптың негізгі сұрақтары.**

- 1) Артериялық қан кетуде мейіргерлік көмек?
- 2) Жедел қан жоғалту дегеніміз не?

Қан кету түрлері

Үлкен артериялар мен тамырларды жарақаттаған кезде өмірге қауіпті қан жоғалтуы мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше тезірек қанды тоқтатып, жедел жәрдем шақыру керек. Тамырларға аздап зақым келсе, қанның уақтылы тоқтатылуы да өте маңызды. Жеңіл, бірақ үнемі қан жоғалту жағдайында да адам есін жоғалтады.

Дұрыс көрсетілмеген алғашқы көмек жәбірленушіге зиян келтіруі мүмкін, атап айтқанда: үлкен қан жоғалту, жараның инфекциясы және қабынуы.

Егер қан кету өте күшті болмаса, көмек көрсеткеннен кейін шұғыл түрде хирургпен кеңесу керек, өйткені қан жоғалтуды жараны өңдеп, тігіп болғаннан немесе операция жасағаннан кейін ғана

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 15 беті

тоқтатуға болады. Қан кету көзіне байланысты гастроэнтеролог, онколог, пульмонолог, гинеколог сияқты мамандандырылған мамандардан кеңес алу қажет болуы мүмкін.

Қысқаша көмек:

1. Егер қан кету ауыр болса, жәбірленушіні жатқызып, аяқтарын көтеру керек.
2. Зақымдалған тамырды қысу немесе аяқ-қолды қатты бұғу немесе турникетті қолдану арқылы қанның уақытша тоқтап қалуы мүмкін.
3. Дереву жедел жәрдем шақырыңыз.
4. Жараны ұстамаңыз, шаймаңыз, одан бөгде заттарды алып тастаңыз.
5. Егер жараның беті ластанған болса, онда оның жиектері жараның бағытында тазалануы керек, зақымданудың айналасында антисептик қолданылады, мысалы, йод, хлоргексидин, сутегі асқын тотығы, йод жараның ішіне енбеуі керек.

Қан кетудің төрт негізгі түрі

Көзге байланысты қан кетудің келесі негізгі түрлері бөлінеді:

1. Артериялардан қан кету үлкен қауіп туғызады, өйткені қан массасының айтарлықтай жоғалуы тез жүреді. Сонымен қатар, қаны қызыл, пульсирленген субұрпақ түрінде болады.
2. Егер жәбірленушіге жедел көмек көрсетілмесе, тамырдан қан кету де қауіпті. Бұған жарақаттанған ыдыстан баяу ағып жатқан қара қанның пайда болуы дәлел бола алады.
 - ☐ Капиллярлық қан жоғалту көбінесе айтарлықтай қауіп төндірмейді. Ол тері бетінің кішкентай зақымдануымен жиі байқалады.
 - ☐ Ішкі (паренхималық) - онымен қан адам денесінің қуысына түседі. Уақытша мойындамаған жағдайда бұл өте қауіпті. Көбінесе ішкі ағзалардың, соның ішінде паренхиманың зақымдалуымен байқалады. Қан ағып кетпейтіндіктен, оны негізінен жиі тыныс алу, әлсіздік және өңсіздік сияқты белгілерге орнатуға болады.

1. Артериялық қан кету кезіндегі алғашқы көмек

Зақымдалған артерияны қанның уақытша тоқтап қалуы үшін дереу оның жанынан өтетін сүйекке басу керек.

Артерияларды қысу әдістері:

1. Каротид артериясы - жәбірленушінің мойнының артына алақанды басыңыз және екінші қолдың саусақтарын артерияға басыңыз.
2. Бракиальды артерияға оңай қол жеткізуге болады, оны гумерге қарсы басу керек.
3. Субклавиялық артериядан қан тоқтату өте қиын. Мұны істеу үшін жәбірленушінің қолын артқа тартып, мойын сүйегінің артындағы артерияны бірінші қабырғаға басыңыз.
4. Ахиллярлық артерияны қысу үшін саусақтарыңызбен мықтап басу керек, өйткені ол өте терең орналасқан.
5. Феморальды артерия өте үлкен, оны аналыққа жұдырықпен басу керек. Егер бұл орындалмаса, 2-3 минуттан кейін жәбірленуші қайтыс болуы мүмкін.
6. Поплитальды артерияны ұрпақты фоссаға басу керек, ол ерекше күш салуды қажет етпейді. Аяқтың артериясынан қан кету кезінде алғашқы көмек оларды қысып, аяқ-қолды қатты бүгіп, турникетті қолдана отырып жасалады. Егер аяқ-қолдың тамырларын саусақтармен қысу мүмкін болмаса, бұған дейін ішінен буынға тығыз дәке ролигін орналастырғаннан кейін, қолды мүмкіндігінше майыстыру керек.

Егер қан ағуды жалғастыра берсе, турникет қолданылуы керек. Мұны тез арада қамтамасыз ету керек, өйткені қан өте қарқынды ағып кетеді.

Турникетті қыста жарты сағатқа дейін және жазда бір сағатқа дейін сақтауға болады. Егер дәрігер көрсетілген уақыт ішінде келмеген болса, турникетті ақырын шығарып, қан айналымы қалпына келгенше күтіңіз. Содан кейін оны қайтадан қолданыңыз. Бұл жағдайда зақымдалған аяқтың импульсі сезілмеуі керек. Сонда қан тоқтайды.

Егер турникет дұрыс қолданылмаса, қан кетуден гөрі қауіпті екенін есте ұстаған жөн.

Егер арнайы тартқыш болмаса, оны сүлгімен, белбеу, таңғыш сияқты материалдармен ауыстыруға болады. Олар таяқпен бұралып, бекітілмеуі үшін бекітіледі. Аяқ киім, жіңішке арқан

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 16 беті

және ұқсас материалдар пайдаланылмауы керек.

2. Венадан қан кетуге көмектесу

Мұндай қан жоғалту терең зақымданумен жүреді. Веноздық қан кетуге алғашқы көмек дереу жасалады. Жарақаттанған тамырлар ауаны сорып алады, өйткені олардағы қысым атмосфераға қарағанда төмен. Сонымен қатар, ауа көпіршіктері әртүрлі органдардағы тамырларды бітеп тастауы мүмкін, бұл жәбірленушінің өліміне әкелуі мүмкін.

Көмек көрсеткен кезде жараны жууға болмайды, кірден және қан ұйығыштарынан тазарту керек. Сіз келесі әрекеттерді орындауыңыз керек:

- дымқыл шүберекпен тазалаңыз,
- зарарсыз тампонмен жабыңыз,
- содан кейін жараның бетін стерильді таңғыштың бірнеше қабатымен жабыңыз,
- оған қысым жасамайтын таңғышты қойыңыз,
- бұл таңғышты мықтап байлау керек
- таңғыш арқылы қан ағып жатқанда, майлықтарды үстіне қойып, мықтап байлаңыз,
- аяқ-қолды көтеріп, оны осы күйде қалдырыңыз.

Таңғышты дұрыс қолдану үшін сізге:

1. Қолды байлаған кезде, иілу керек.
2. Егер аяғы таңылған болса, оны тізеде де бүгу керек.
3. Таңғышты жартылай қолданған кезде алдыңғы бұрылысын жабыңыз.
4. Таңдалған аяқтың орны таңылуға дейін сол күйінде қалуы керек.

3. Капиллярлық қан кету кезіндегі алғашқы көмек

Ол көбінесе өздігінен тоқтайды. Мінезі - жараның бүкіл бетінен қанның баяу ағуы. Дегенмен, айтарлықтай қан жоғалтуымен бірге ауыр жарақаттар бар. Ең үлкен қауіп ішкі капиллярлық қан кету болып табылады.

Капиллярлардан қан кетудің негізгі себептері:

- Қан аурулары, оның коагуляциясының бұзылуымен бірге жүреді.
- Әр түрлі жарақаттар.
- Қан тамырлары аурулары (ісіктер, терінің іріңді қабынуы, капиллярларға әсер етеді).
- Неоплазмалар, атеросклероз, ревматоидты артрит сияқты қан тамырларының қабырғаларына әсер ететін жалпы аурулар.
- Гормоналды бұзылулар.

Көбінесе капиллярлық қан кету үлкен қан жоғалтуға әкелмейді, оның қауіптілігі патогендік микробтармен инфекцияға байланысты.

Аяқтың капиллярларынан қан кетуіне медициналық көмек көрсету кезінде келесі әрекеттерді орындау қажет:

1. Зақымдалған аяқ-қолды жүректің аймағынан жоғары көтеріңіз, бұл қан жоғалтуды азайтуға көмектеседі.
2. Кішкентай жарақаттар үшін жараның айналасындағы теріні антисептиктермен емдеу керек. Бактерицидті патч бар жоғарғы.
3. Егер қан күшті ағып кетсе, қысыммен таңу керек.
4. Өте күшті қан кету кезінде аяқтың жарасын мүмкіндігінше бүгу керек. Егер бұл көмектеспесе, турникетті қолданыңыз.
5. Жарақатқа суық жағыңыз, бұл қан жоғалтуды тоқтатуға және ауырсынуды азайтуға көмектеседі.

Мұрынның көптеген капиллярларынан қан кету, бұл өте жиі кездесетін жағдай, сіз де көмектесе аласыз. Мұның себебі суық тигенде қан тамырларының қабырғаларының әлсіреуі болуы мүмкін. Оған гипертониялық криз, мұрынның жарақаттары және басқа да жағымсыз факторлар әсер етуі мүмкін. Алдымен пациентті сендіру керек, өйткені адам мазасызданып жатқанда, оның жүрегі жиі соғып тұрады, бұл қан кетудің жоғарылауына ықпал етеді.

Мұрынға көмек көрсету кезеңдері:

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 17 беті

1. Мұрынның қанаттарын саусақтарыңызбен қысу керек, бұл қан тамырларын қысып, қан тоқтатуға көмектеседі. Науқастың басын сәл алға және артқа еңкейту керек, өйткені қан жоғалту қарқындылығын бақылау мүмкін болмайды.
2. Суықтың салдарынан тамырлар тарылып кетуі үшін мұрын көпіріне мұз немесе салқын зат салыңыз. Бұл қан кетуді азайтуға көмектеседі.
3. Егер қан кету жалғасса, мұрын жолдарында бұрын 3% сутегі асқынымен суланған бүктелген құбырлы бинт бөліктерін енгізу керек. Бұл тампондардың ұштарын сыртынан қалдырыңыз және бинтпен бекітіңіз.
4. Қан тоқтатқаннан кейін алты сағаттан соң, тампондарды абайлап алыңыз, олардың ұштарын сүртіңіз, нәтижесінде пайда болған тромбты жыртып алмауға тырысыңыз.
5. Қанды тезірек тоқтату үшін науқасқа қан тамырларының қабырғаларын нығайтатын дәрі-дәрмек беру керек - кальций препараттары, Аскорутин, Рутин.
6. Егер қан жоғалту жалғасса, науқасқа гемостатикалық дәрі-дәрмектер беру керек (Дицинон, Викасол), жедел түрде отоларингологпен кеңесу керек немесе жедел жәрдем шақыру керек.

4. Ішкі қан кету кезіндегі алғашқы көмек

Мұндай қан кету ішкі ағзаларға ауру немесе жарақат әкелуі мүмкін. Бұл өте зиянды, өйткені қан жоғалтуды бақылау мүмкін емес. Сонымен қатар, онымен ауырсыну қауіпті емес, сондықтан ішкі қан кету ұзақ уақытқа байқалмай қалуы мүмкін. Науқастың жағдайы күрт нашарлағанда ғана олар бұған назар аударады.

Қан кетудің ең қауіптісі - бұл паренхималық мүшелерден қанның ағуы, оларда әдетте қуысы жоқ, және артериялық-веноздық желі жақсы дамыған. Оларға өкпе, ұйқы безі және бауыр сияқты органдар кіреді.

Бұл органдардың зақымдануы қатты қан кетуіне әкелуі мүмкін. Ол іс жүзінде өздігінен тоқтай алмайды, өйткені бұл мүшелердің тамырлары ұлпаларда орналасады және олар түсіп кетеді. Сондықтан паренхималық мүшелерден қан кетуге алғашқы көмек дереу жасалады. Қан жоғалтудың бұл түрінің себептері жарақаттар, туберкулез, жұқпалы аурулар, ісіктердің ыдырауы болып табылады.

Ішкі мүшелерден қан кету жалпы субъективті белгілер мен объективті белгілердің біртіндеп пайда болуымен бірге жүруі мүмкін, атап айтқанда:

- әлсіздік
- өзін жайсыз сезіну
- бас айналу
- ессіздік
- бәріне қызығушылықтың болмауы
- ұйқышылық
- қысымның төмендеуі
- балқу
- жиі импульс.

Ішкі мүшелерден қан кету кезіндегі алғашқы медициналық көмектің негізгі міндеті - науқасты шұғыл госпитализациялау. Жедел жәрдем келгенге дейін:

- Науқасты жатқызыңыз, тыныштықты қамтамасыз етіңіз.
- Асқазанға немесе кеудеге суық жағыңыз, болжалды қан кету көзінің орналасқан жеріне байланысты.
- Сіз гемостатикалық препараттарды енгізе аласыз (Аминокапро қышқылы, Викасол).

Қысымның күрт төмендеуімен паренхималық қан кету жағдайында науқастың аяқтарын жүрек аймағынан жоғары отыздан қырық сантиметрге көтеру керек. Тыныс алуды және жүрек соғысын үнемі қадағалаңыз. Қажет болса, реанимация жасаңыз. Науқасқа ауырсынуды басатын немесе басқа дәрі-дәрмектерді қабылдауға болмайды. Тағам немесе су бермеңіз, аузыңызды сумен шайыңыз.

Қан кетудің әртүрлі түрлеріне жедел және дұрыс алғашқы көмек көрсету кезінде болжам

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 18 беті

қолайлы, жедел медициналық көмек зардап шегушіні тезірек қалпына келтіруге ықпал етеді.

Жедел қан жоғалту дегеніміз не?

Жедел қан кету - зақымдалған тамырлардың қабырғалары арқылы қан кету нәтижесінде ағзаның тез қайтарылмайтын қан жоғалуы.

Кеме қабырғасының тұтастығын бұзу:

1. травматикалық - жыртып, кесіп немесе жаншып,
2. жарақат емес - ауырсыну фокусының (туберкулез, қатерлі ісік, ойық жара және т.б.) қатысуымен ойық жара (эрозия).

Әдетте, өлімге әкелетін қан кетудің себебі жарақат болып табылады. Жәбірленушінің жағдайының ауырлығы жоғалған қанның мөлшеріне ғана емес, сонымен бірге дененің қан жоғалту жылдамдығына да байланысты. Қан жоғалту кезіндегі дененің бастапқы күйі де маңызды - ол әлсіреген немесе сау болған ба. Науқастың жасы үлкен мәнге ие - мысалы, қарт адамдар мен балаларға бұл жағдайға төзу қиынырақ.

Қан кету: сыртқы және ішкі

Қан ішкі және сыртқы болып бөлінеді.

Ішкі қан кету - бұзылған эктопиялық жүктілікпен, бауырдың, көкбауырдың, асқазан-ішек жолдарының люменіне және т.б.

Сыртқы қан кету - үлкен тамырлардың жарақаттары, ашық сүйектердің сынуы және жұмсақ тіндердің зақымдануы үшін.

Егер ішкі қан кету, егер ол кенеттен пайда болса және науқастың ауруымен туындаса, бірақ біз оны құтқарушы ретінде білмейміз, біз пациенттің сыртқы өзгерістерімен ғана анықтай аламыз, атап айтқанда:

- оның беті терісі бозарған,
- маңдайыма суық тер
- қан кету аймағында өткір ауырсыну (біз оны сырттан көрмейміз),
- температура күрт көтерілуі немесе күрт түсуі мүмкін,
- бұлдыр көріністер және көздің алдындағы қара дақтардың шағымдары,
- тинит.

Қауіпті белгі - бұл аяудың пайда болуы (оттегі ашығуының жоғарылауының белгісі) - бұл қан кету көп мөлшерде болып, зат қауіпті болады. Алаңдаудан кейін есін жоғалту және пульстің жоғалуы мүмкін.

Ішкі қан кету кезінде жедел медициналық көмек қажет емес. Медициналық білімі жоқ және медициналық мекемеден тыс жерде құтқарушы науқастың дұрыс тасымалдануын ғана қамтамасыз етеді. Тасымалдау кезінде және жедел жәрдемді күту кезінде пациент жартылай отыру керек, толық тынығуды қамтамасыз ету керек және ұсынылған қан кететін жерге суық компресс немесе мұз жағу ұсынылады (бұл тоқтамаса, қан кетуді баяулатады).

Қан кетуге алғашқы көмек - жалпы ережелер

Еске салайық, біз төтенше жағдайларды қарастырамыз, сондықтан сіз жәбірленушіге жақындатпастан бұрын, ең алдымен өзінді құтқарушы ретінде қорғауың керек. Мұны істеу үшін тез, бірақ мұқият жәбірленушінің орналасқан жерін тексеріңіз. Көбінесе жарақаттың себебі және соның салдарынан қан кету жақын жерде болуы мүмкін. Тек қауіпті емес екендігіңізге сенімді бола отырып, жәбірленушіге барыңыз.

Қан кетуге алғашқы көмек көрсетудің жалпы ережелері:

- Қажет болған жағдайда - зардап шеккен адамды қауіпті аймақтан шығару немесе алып тастау қажетрезеңке қолғап, маска және т.б.
- Қанның едәуір жоғалуымен зардап шегушіні жатқызыңызегер мүмкін болса, аяғыңызды көтеріңіз (алайда бұл ішкі қан кету бар науқастарға қатысты емес, біз жоғарыда ішкі қан кету бар дененің жағдайын сипаттадық).
- Жедел жәрдем шақырғанды ұмытпаңыз. Егер сіз өзіңіз қоңырау шалмасаңыз, бірақ басқа біреуді мұны сұрасаңыз, жедел жәрдемнің шынымен шақырылғанына көз жеткізіңіз.

QONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 19 беті

Стресстік жағдайларда адамдар кейде жоғалып кетеді және уәделерін орындамайды. Бір рет қоңырау шалғаннан гөрі бір уақытта бірнеше рет қоңырау шалған дұрыс.

- Жараны ұстамаңыз. Қолдарыңызбен де, қолғаптарыңызбен де, басқа заттармен де, жаралар тот, құм болса, жууға болмайды (бұл қан кетуді күшейтеді және одан да көп зиян келтіреді).

- Жарадан әйнек бөліктері мен зақымдайтын материалдарды алып тастауға қатаң тыйым салынады., егер сіз тек бір түрден қорқатын болсаңыз және осының бәрін тез арада жойып, адамға көмектескіңіз келсе де. Шын мәнінде, зақымдайтын материал қан кетуді сақтай алады. Олар қазірдің өзінде жараланған, қан кету түрінде жауап бар, бірақ егер сіз затқа қол тигізсеңіз, орын ауыстыру жаңа зиян келтіреді және нәтижесінде қан жоғалту мөлшері артады.

- Жалғыз нәрсе қол тигізуге болады - жараның айналасындағы аймақегер ол ластанған болса, жарадан қатты бағытта.

Артериялық қан кету кезіндегі алғашқы көмек

Негізгі ерекшеліктері - шашырататын, пульсирленген жарқын қызыл қан (Артерияларда импульс тексерілетіні таңқаларлық емес) - қан осылай ағып кетеді. Кейбір авторлар «қан бұрқақты ұрады, сықырлайды» дейді.

Артериялар бұлшықет тінінің терең қабаттарына енетін болғандықтан, қан кетудің алдын алу үшін көбірек қолдану керек. Бұл сыртқы қан кетулердің ең қауіптісі.

Ең алдымен - жедел жәрдем шақыру керек. Веноздағыдай біз де зақымдалған аяқ-қолды жоғары көтереміз. Біз тек турникетті немесе бұрауды қолданамыз, тек жараларды 3-4 см-ге толтырыңыз. Төтенше жағдайда сіз артерияны саусақтарыңызбен, мылжың нүктесіндегі жараның үстінен басуға болады. Феморальды, поплитальды, ульнарлы және бракиальды артериялардан қан кету кезінде, ең бүгілген аяқ-қолды көтерілген күйде бекіту мүмкін.

Гемостатикалық турникетті қолданудың негізгі ережелері

Жоғарғы және төменгі аяқтардан қан кетуді тоқтату үшін турникет қолданылады.

Бекіту техникасы:

- Турникетті ортасында күшпен созу, аяқтың айналасына бірнеше рет оралған, жарадан 3-4 см жоғары (артериялық қан кету).

- Жалаң теріге турникет қолданбаңыз, жұмсақ төсемді (мата, майлықтар, сүлгілер және т.б.) турникетті қолдану орнына қою керек.

- Әрине қажет қондырғының уақытын белгілеңіз, бұл ақпаратты жазып алыңыз және бекітіңіз. Іс жүзінде, уақытты турникеттің жанында тікелей жәбірленушіге жазу оңай болады. Бұл өте маңызды сәт, өйткені егер біз турникетті асып кететін болсақ, онда экстрималды жағдайда қан ағымын әкелетін оттегісіз некрозға дейін асқынулар пайда болады, кейіннен ампутация жасалады.

- Жылы айларда максималды қондырғы қолдану уақыты - 2 сағат, суықта - 1 сағат.

Қатты қысылмаған турникет тек тамырларды қысады (артериялық қан кетуді күшейтеді). Артерияларды қысу үшін турникетті мүмкіндігінше қатайту керек.

Қанды қалай тоқтатуға болады?

Егер жара терең болмаса немесе үлкен болмаса, онда аяқтың максималды бүгілуі көмектеседі.

Екінші әдіс - артерияларды саусақпен басу, олардың әрқайсысының денеде өзіндік орны бар, онда тамыр тікелей тері астына орналасқан. 2-суретте артериялардың әрқайсысы үшін осы нүктелер көрсетілген.

Артерияны қысу үшін жеткілікті күш қолдану керек екенін есте ұстаған жөн. Көбінесе бұл қанды бірнеше минутқа тоқтатады, бірақ егер сізде жеткілікті күш болса, онда уақыт артуы мүмкін.

5.5. Оқыту және оқыту әдістері (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

5.6. Әдебиет. Соңғы бетте

5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер:

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 20 беті

1. Жарақаттанушы жеңіл көлік астында жатыр, есі анық. Білектің ашық сынығы анықталады, жарақаттан атқылап ал қызыл қан ағуда. Сіздің алғашқы көмегіңіз:
 - A. -қан кетуді тоқтату
 - B. -айналадағылардың көмегімен көліктің астынан жарақаттанушыны алып шығу
 - C. -жедел жәрдем көлігін күте отырып, жарақаттанушыны бақылап отыру
 - D. -жедел жәрдем көлігі келгенше, жарақаттанушының анамнезін жинау
 - E. -мүсәтір спиртін иіскету
2. Егер ... жгут салу дұрыс деп саналады.
 - A. -артерияның жгуттан төмен деңгейінде пульстің тоқтауы байқалса
 - B. -тері қабаты көгеруі байқалса
 - C. -жгут салынған жерден төмен деңгейде терінің сезімталдығы жоғалса
 - D. -жгуттан төмен деңгейде терінің жергілікті қызуы жоғарыласса
 - E. -тері қабатының қызаруы байқалса
3. Салынған жгуттың қыс мерзімінде барынша тұру ұзақтығы:
 - A. -30 минут
 - B. -60 минут
 - C. -2 сағат
 - D. -3 сағат
 - E. -5 сағат
4. Тромболитикалық дәрі-дәрмекке ... кіреді.
 - A. варфарин
 - B. гепарин
 - C. тиклопедин
 - D. аналгин
 - E. промедол
5. Қан кетуді уақытша тоқтату әдістеріне жатады:
 - A. -жарақаттан жоғары жгут салу
 - B. -жарақаттанған жердегі қантамырды байлау
 - C. -қанның ұю қабілетін жоғарылататын препараттарды енгізу
 - D. -қантамырға тігіс салу
 - E. -диатермокоагуляция
6. Қан кетуді біржолата тоқтату әдістеріне жатады:
 - A. -қантамырға тігіс салу
 - B. -қысып тұратын таңғыш салу
 - C. -жарақаттан жоғары жгут салу
 - D. -жарақаттанған қантамырды саусақпен басу
 - E. -жарақаттанған аяқты немесе қолды буыннан барынша бүгу
7. Госпитальға дейінгі кезеңде көмек көрсету барысында, мұрыннан қан кетуді тоқтатудың дұрыс тәсілі:
 - A. -мұрын қуысының алдыңғы тампонадасы және жәбірленушінің басын алға ию
 - B. -мұрын қанаттарын мұрын төмпешігіне қарай қысып, жәбірленушіні басып, артқа қарай шалқайту
 - C. -мұрын тұсына мұздай басып, науқастың басын артқа қарай шалқайту
 - D. -мұрын қуысының артқы тампонадасы
 - E. -працевидті таңғыш салу
8. Құлағынан қан кеткен жәбірленушіге көмек көрсету кезінде ... тыйым салынады.
 - A. -сыртқы есіту жолын тампонадалауға
 - B. -емдеу мекемесіне тасымалдауға
 - C. -таңғыш салуға
 - D. -құлаққа мақта немесе дәке таңғышын қоюға

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 21 беті

- Е. -құлаққа мақта қойып таңғыш салуға
9. Ауыз қуысынан қан кеткен науқасқа көмек көрсету кезінде ... тыйым салынады.
- ыстық шәй немесе кофе беруге
 - қан кету орнына дәке оптағышын қоюға
 - емдеу мекемесіне тасымалдауға
 - басын алға иіп отырғызуға
 - ауыз қуысын тығыз тампондалауға
10. Салынған жгуттың жаз мерзімінде барынша тұру ұзақтығы:
- 60 минут
 - 2 сағат
 - 30 минут
 - 3 сағат
 - 5 сағат

Ситуациялық есеп:

Мұрын көпіріне жұдырықпен соғу нәтижесінде қанның көп бөлінуі басталды.
Науқас мазасыз, қанды түкіреді, оны ішінара жұтады.

Тапсырма:

- Науқастың төтенше жағдайын анықтаңыз.
- Дәрігерге дейінгі көмек алгоритмін жасаңыз.
- Мұрыннан қан кетуді тоқтату техникасын көрсетіңіз.

5- сабақ

5. 1. Дәрістің тақырыбы: Күйік шалған жағдайда шұғыл мейіргерлік күтім.

5. 2. Сабақтың мақсаты:

- Қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету.
- Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету.

5. 3. Пәннің міндеттері:

Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету әрекеттерін орындау, өзінің рөлдерін, құқықтары мен лимиттерін түсіну, нормативтік – құқықтық актілерге және шұғыл көмек көрсету кезінде ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес өзінің іс-әрекеті мен әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті өзіне алуы, мейіркелік күтімнің сапасын жақсарту үшін кәсіби қызметке шұғыл көмек көрсету кезінде басқару ережелерін ұстану.

5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

- 3 дәрежелі күйікте көрсетілетін көмек?
- 4 дәрежелі күйік?

Күйік деп ыстық сұйықтықтар, қышқыл-сілті, жалынның шарпуы, сәулелі ыстық, қатты ысыған заттар, электр тоғы немесе электромагниттік радиацияның әсерімен теріге және одан төмен жатқан адам денесінің ұлпаларына жасалған зиянды әрекетті айтады. 50°C температураға шалдыққан теріні 5 минуттан кейін күйік шалады.

Күйіктің себептері:

жоғары температураның, химиялық заттардың, электр тоғы мен радиактивті сәуленің әсерінен ағза мен ұлпалардың зақымдалуы. Осыған сәйкес күйік термикалық, химиялық, электірлік және сәулелік болып бөлінеді.

Күйіктің ауырлығы оның таралу алаңымен және дененің зақымдану тереңдігімен анықталады. Күйік тарала түскен сайын ол адам өмірі үшін қауіпті бола түседі. Дененің үстінгі 1/3 бөлігі күйген жағдайда көбінесе өлімге әкеліп соқтырады.

Термикалық күйік денеге жалын, қайнаған су, жанып тұрған және ыстық суықтық пен газ, қызған және балқыған металлдар, напалмдардың тікелей әсерінен пайда болады. Зақымданудың ауырлығы әсер еткен температураның жоғарғылығына, әсер етудің ұзақтылығына,

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 22 беті

зақымданудың көлемі мен жайылуына байланысты. Қатты күйіктер әсіресе жалын мен қысымда тұрған будың әсерінен пайда болады. Аяқ-қол, көз, бет, дененің басқа мүшелеріне қарағанда жиі күйікке ұшырайды.

➤ Химиялық күйіктер денеге жинақталған қышқылдардың (тұз, күкірт, азот, сірке, карбол) және сілтілердің (күйдіргіш калий мен күйдіргіш натрий, мүсәтір спирті, сөндірімеген әк), фосфордың, магнийдың және ауыр металлдардың кейбір тұздарының (ляпис, хлорлы мырыш және т. б.) әсерінен пайда болады.

➤ Сәулелік күйік ядролық жарылыстың жарық сәулесінен, рентген мен күн сәулесінен пайда болады. Сәулелік күйіктің сырттай алғашқы белгілері зақымдау дәрежесіне сәйкес келмейді, зақымдау дәрежесі біршама кейінірек анықталады.

Күйіктердің жіктелуі

1-ші дәрежедегі күйікте терінің беті күйеді мұнда тері қатты қызырып, домбығып ауырсынады, ашиды. 3-4 күннен соң тері қотырланып сауыға бастайды.

2-ші дәрежедегі күйікте қызарған тері күлдірейді, сары суға толған көпіршіктер пайда болады. Бұл дәрежеде терімен қоса май ұлпасы күйеді. Май ұлпасында тамырлар, жүйке талшықтары, шаштың талшықтары орналасқан, олар да күйікке шалдығуы мүмкін. Егер зақымданған жерге микробтар түспесе, онда бір аптадан соң терінің қабаттары орнына келеді, тек күйген жерде тыртықша қалады.

3-ші дәрежедегі күйікте бұлшық еттер, тереңгі ұлпалар зақымдалады, олар жансызданады, өліеттенеді (некроз). Күйген терінің түсі қызыл-қоңыр немесе қара-қоңыр, сезгіштік қабілетінен айырылады. Мұндай күйіктер ұзаққа созылады. Тыртық қалады.

4-ші дәрежедегі күйікте тек тері ғана емес, бұлшық ет, сіңір, сүйек зақымданады, олар күлге айналады. Күйіктің ауырлығы тек зақымдануының тереңдігі емес, сондай-ақ зақымдану алаңына да байланысты, ол дененің күйген бетінің алаңың пайызбен көрсетіледі.

Алғашқы көмек: Дереву жедел жәрдем шақырыңыз, егер күйік:

- * Тыныс алуды қиындатса;
- * Дененің бір бөлігін ғана алмаса;
- * Бас, мойын, қол білезіктерін, табан немесе жыныс мүшелерінде болса;
- * Балала немесе кәрі адамда болса.

Күйік химиялық заттардан, жарылыстан немесе электр тогының әсерінен болса.

Салқындату шағын күйіктер кезінде күлдіреудің алдын алады және қатты күйіктер кезінде тіндердің зақымдалуын азайтады.

- Бірінші және екінші дәрежелі сүйіктер кезінде жараны салқын сумен салқындатыңыз, тірақ мұзбен емес.

- Оны таза дымқыл сулықпен жабыңыз.

- Ісіну пайда болғанша, зардап шегушінің сақинасын, сағатын және басқа да заттарын шешіңіз.

Тыйым салынады:

- Күйген жерге зарарсыздандырылған немесе таза тампон- таңғыштардан басқа заттарды тигізбеңіз.

- Мақтаны пайдалануға және күйген жерге жабысқан киімді тартуға, күйік күлдіреулерді ашуға.

- Үшінші дәрежелі күйік кезінде жараны тазалауға (мұндай күйік кезінде зардап шегушіні мүмкіндігінше жылдам дәрігерге жеткізіңіз).

- қандай да бір кремдерді, мазьді, сепкіштерді, тіс пастасын жағуға.

Алғашқы көмек көрсетілерде

- Адам күйіп қалғанда ең бірінші атқарылатын шаралар: күйік дәрежесін, күйдіру көздерін анықтау қажет. Күйік дәрежесі адамның көңіл-күйіне, қиналуына, денсаулығының нәшарлауына, жараның көлемі мен тереңдігіне байланысты белгілі болады.
- Алғашқы медициналық көмек көрсетілер алдында күйдіру көзін анықтап, оған себеп болған

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 23 беті

заттарды дереу жойғаннан соң, адамнан күннің көзін көлеңкелейді. Киімі жанып жатса, сумен сөндіреді, күйген адамды кез келген қалың матаға орайды. Көбінесе, киімі күйген адамдар оттан қашамын деп жүгіріп, жел киіміндегі оттың одан әрі жануына себеп болып, адам одан сайын қатты күйеді. Осы есте болсын. Жалпы, күйген жердің киімін жұлмаламай, ептеп кесіп алады.

- Күйікте киім матасы теріге жабысып қалса, оны қайшымен тықырлап қырқып тастайды. Адам денесі химиялық заттардан күйіп қалса, дененің күйген жерін суық сумен 15-20 минут бойы жуады. Қышқыл, сілтіге күйгенде ас содасы ерітіндісіне (стақан суға 1 шай қасық), немесе спирт, марганец қышқылды калий ерітіндісіне (марганцовка) малынған таңғышты орап тастайды. Күйіктің екінші, үшінші, төртінші дәрежесінде науқасты ауруханаға жатқызады, әртүрлі антибиотиктер және глюкоза тәрізді дәрілерді егеді, қан құяды. Бұл кезде күйік шалған адамға дәрумені мол, құнарлы сұйық тамақтар берілуге тиісті.

5.5. Оқыту және оқыту әдістері (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

5.6. Әдебиет. Соңғы бетте

5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер :

1. Күйіп қалған жәбірленушіге бірінші көмек көрсету кезінде тыйым салынатын іс-әрекеттер:

- A. -күйіп қалған тері беткейін өртенген киім қалдықтарынан тазарту
- B. -киімді қайшымен зақымданған аймақты қырқып алу
- C. -жәбірленушіге тұзды, сілтілі сұйық ішкізу
- D. -күйген жара бетіне контурлы таңғыш салу
- E. -жәбірленушіні емдеу мекемесіне тасымалдау

2. Жол бойында от жағу үшін балалар бензин қолданды. Кенет біреуінің киімі өртене бастады. Бет, мойын, алдыңғы көкірек және іш аймағының ауырсынуы мазалайды. Тынысы жиі, беткей. Тамыр соғысы жиі, әлсіз. Көзі жасаурап, жарыққа қарау кезінде ауырсыну байқалады. Күйік шалған аймақ қызарған, көптеген сулы, қою-қоңыр түсті көпіршіктер байқалады. Күйік шалғаннан кейінгі дәрігерге дейінгі көмек көрсетуге болатын іс-әрекет:

- A. -күйік шалған шетінен киімді қайшымен қиып алу
- B. -күйген көйлекті шешу
- C. -күйік шалған жерді спиртпен сүрту
- D. -күйген көпіршікті тесу және алып тастау
- E. -күйік шалған жерді вазелинмен немесе басқа маймен сүрту

3. Алғашқы медициналық көмек көлеміне ... кіреді.

- A. -сыртқы қан кетуді уақытша тоқтату
- B. -қан және қан алмастырғыштарды құю
- C. -жараны біріншілік хирургиялық өңдеу
- D. -қан тамырды ұзына бойы тігу
- E. -қан тамырға тігіс салу

4. күйік дәрежесіне қарай нешеге бөлінеді?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

5. Бірінші дәрежелі күйік:

- A. күйікте терінің беті күйеді мұнда тері қатты қызарып, домбығып ауырсынады, ашиды. 3-4 күннен соң тері қотырланып сауыға бастайды.
- B. күйікте қызарған тері күлдіреді, сары суға толған көпіршіктер пайда болады. Бұл дәрежеде терімен қоса май ұлпасы күйеді.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 24 беті

- С. күйікте бұлшық еттер, тереңгі ұлпалар зақымдалады, олар жансызданады, өліеттенеді (некроз). Күйген терінің түсі қызыл-қоңыр немесе қара-қоңыр, сезгіштік қабілетінен айырылады. Мұндай күйіктер ұзаққа созылады. Тыртық қалады.
- Д. күйікте тек тері ғана емес, бұлшық ет, сіңір, сүйек зақымданады, олар күлге айналады. Күйіктің ауырлығы тек зақымдануының тереңдігі емес, сондай-ақ зақымдану алаңына да байланысты, ол дененің күйген бетінің алаңың пайызбен көрсетіледі.
- Е. Май ұлпасында тамырлар, жүйке талшықтары, шаштың талшықтары орналасқан, олар да күйікке шалдығуы мүмкін. Егер зақымданған жерге микробтар түспесе, онда бір аптадан соң терінің қабаттары орнына келеді, тек күйген жерде тыртықша қалады.

6. Екінші дәрежелі күйік:

- А. күйікте терінің беті күйеді мұнда тері қатты қызарып, домбығып ауырсынады, ашиды. 3-4 күннен соң тері қотырланып сауыға бастайды.
- В. күйікте қызарған тері күлдіреді, сары суға толған көпіршіктер пайда болады. Бұл дәрежеде терімен қоса май ұлпасы күйеді.
- С. күйікте бұлшық еттер, тереңгі ұлпалар зақымдалады, олар жансызданады, өліеттенеді (некроз). Күйген терінің түсі қызыл-қоңыр немесе қара-қоңыр, сезгіштік қабілетінен айырылады. Мұндай күйіктер ұзаққа созылады. Тыртық қалады.
- Д. күйікте тек тері ғана емес, бұлшық ет, сіңір, сүйек зақымданады, олар күлге айналады. Күйіктің ауырлығы тек зақымдануының тереңдігі емес, сондай-ақ зақымдану алаңына да байланысты, ол дененің күйген бетінің алаңың пайызбен көрсетіледі.
- Е. Май ұлпасында тамырлар, жүйке талшықтары, шаштың талшықтары орналасқан, олар да күйікке шалдығуы мүмкін. Егер зақымданған жерге микробтар түспесе, онда бір аптадан соң терінің қабаттары орнына келеді, тек күйген жерде тыртықша қалады.

7. Үшінші дәрежелі күйік:

- А. күйікте терінің беті күйеді мұнда тері қатты қызарып, домбығып ауырсынады, ашиды. 3-4 күннен соң тері қотырланып сауыға бастайды.
- В. күйікте қызарған тері күлдіреді, сары суға толған көпіршіктер пайда болады. Бұл дәрежеде терімен қоса май ұлпасы күйеді.
- С. күйікте бұлшық еттер, тереңгі ұлпалар зақымдалады, олар жансызданады, өліеттенеді (некроз). Күйген терінің түсі қызыл-қоңыр немесе қара-қоңыр, сезгіштік қабілетінен айырылады. Мұндай күйіктер ұзаққа созылады. Тыртық қалады.
- Д. күйікте тек тері ғана емес, бұлшық ет, сіңір, сүйек зақымданады, олар күлге айналады. Күйіктің ауырлығы тек зақымдануының тереңдігі емес, сондай-ақ зақымдану алаңына да байланысты, ол дененің күйген бетінің алаңың пайызбен көрсетіледі.
- Е. Май ұлпасында тамырлар, жүйке талшықтары, шаштың талшықтары орналасқан, олар да күйікке шалдығуы мүмкін. Егер зақымданған жерге микробтар түспесе, онда бір аптадан соң терінің қабаттары орнына келеді, тек күйген жерде тыртықша қалады.

8. Төртінші дәрежелі күйік:

- А. күйікте терінің беті күйеді мұнда тері қатты қызарып, домбығып ауырсынады, ашиды. 3-4 күннен соң тері қотырланып сауыға бастайды.
- В. күйікте қызарған тері күлдіреді, сары суға толған көпіршіктер пайда болады. Бұл дәрежеде терімен қоса май ұлпасы күйеді.
- С. күйікте бұлшық еттер, тереңгі ұлпалар зақымдалады, олар жансызданады, өліеттенеді (некроз). Күйген терінің түсі қызыл-қоңыр немесе қара-қоңыр, сезгіштік қабілетінен айырылады. Мұндай күйіктер ұзаққа созылады. Тыртық қалады.
- Д. күйікте тек тері ғана емес, бұлшық ет, сіңір, сүйек зақымданады, олар күлге айналады. Күйіктің ауырлығы тек зақымдануының тереңдігі емес, сондай-ақ зақымдану алаңына да байланысты, ол дененің күйген бетінің алаңың пайызбен көрсетіледі.
- Е. Май ұлпасында тамырлар, жүйке талшықтары, шаштың талшықтары орналасқан, олар да күйікке шалдығуы мүмкін. Егер зақымданған жерге микробтар түспесе, онда бір аптадан

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 25 беті

соң терінің қабаттары орнына келеді, тек күйген жерде тыртықша қалады.

9. Теріге улы зат түскен кезде ... қажет.

- A. зақымданған аймақты ағын сумен жуу
- B. асептикалық таңғыш салу
- C. ылғалды сүлгімен сүрту
- D. теріні спиртке малынған тампонмен сүрту
- E. зақымдалған аймақты асептикалық ерітінделермен жуу

10. Химиялық күйіктер дегеніміз не?

- A. денеге жинақталған қышқылдардың (тұз, күкірт, азот, сірке, карбол) және сілтілердің (күйдіргіш калий мен күйдіргіш натрий, мүсәтір спирті, сөндірімеген әк), фосфордың, магнийдың және ауыр металлдардың кейбір тұздарының (ляпис, хлорлы мырыш және т. б.) әсерінен пайда болады.
- B. ядролық жарылыстың жарық сәулесінен, рентген мен күн сәулесінен пайда болады. Сәулелік күйіктің сырттай алғашқы белгілері зақымдау дәрежесіне сәйкес келмейді, зақымдау дәрежесі біршама кейінірек анықталады.
- C. денеге жалын, қайнаған су, жанып тұрған және ыстық суықтық пен газ, қызған және балқыған металлдар, напалмдардың тікелей әсерінен пайда болады.
- D. күйікте қызарған тері күлдіреді, сары суға толған көпіршіктер пайда болады. Бұл дәрежеде терімен қоса май ұлпасы күйеді.
- E. күйікте бұлшық еттер, тереңгі ұлпалар зақымдалады, олар жансызданады, өліеттенеді (некроз). Күйген терінің түсі қызыл-қоңыр немесе қара-қоңыр, сезгіштік қабілетінен айырылады. Мұндай күйіктер ұзаққа созылады. Тыртық қалады.

Ситуациялық есеп:

Өрт салдарынан баланың киімі жанып кетті. Жалын сөндірілді. Тексеру кезінде: жағдайы ауыр, тежелген, қатыссыз, импульс жиі, қан қысымы төмендейді, тыныс алу таяз. Бет терісінде мөлдір мазмұны бар көпіршіктер, ашылған көпіршіктер, күйдірілген тері аймақтары бар.

Тапсырма:

1. Науқастың төтенше жағдайын анықтаңыз.
2. Дәрігерге дейінгі көмек алгоритмін жасаңыз.
3. Импульсті санау және қан қысымын өлшеу техникасын көрсетіңіз.

6-сабақ

5.1. Дәрістің тақырыбы: Жедел тыныс жетіспеушілігі. Коникотомия.

5. 2. Сабақтың мақсаты:

- Қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету.
- Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету.

5. 3. Пәннің міндеттері:

Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету әрекеттерін орындау, өзінің рөлдерін, құқықтары мен лимиттерін түсіну, нормативтік – құқықтық актілерге және шұғыл көмек көрсету кезінде ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес өзінің іс-әрекеті мен әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті өзіне алуы, мейірбикелік күтімнің сапасын жақсарту үшін кәсіби қызметке шұғыл көмек көрсету кезінде басқару ережелерін ұстану.

5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

1. Жедел тыныс жетіспеушілігі?
2. Коникотомия, трахеостомия

Тыныс алу процесінің кез келген бұзылуымен жедел тыныс жетіспеушілігі сияқты патология дамуы мүмкін. Реанимация сапалы және уақтылы көмек көрсету үшін оның пайда болу себебін анықтауды талап етеді. Тыныс алу проблемасының өткірлігінің тән белгісі - тыныс алу процесін

QO'NTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «O'ntustik Qazaqstan medicina akademiasy» AQ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 26 беті

жүргізуге барынша күш салудың өзі қалаған нәтижеге әкелмейтіндігі - дене артық көмірқышқыл газынан құтыла алмайды және тіндерді қажетті мөлшерде қанықтыра алмайды. оттегі. Патологияның адекватты терапиясы үшін оның себебін анықтау маңызды.

Кез келген мамандықтың дәрігері науқаста ЖРЖ кездесуі мүмкін, себебі оның себептері өте әртүрлі. Оларды мамандар бронх-өкпелік, жүйке-бұлшықеттік, центрогендік, торако-диафрагматикалық деп бөледі.

Тыныс алу жолдарының өткізгіштігінің бұзылуы фонында дамиды жедел бронх-өкпелік тыныс жетіспеушілігінің ең кең тобы. Мұның себебі болуы мүмкін:

- демікпе ұстамасы;
- странгуляциялық асфиксия, трахеяның, жүйке діңінің және мойын тамырларының механикалық қысылуынан туындайтын;
- бронх шырышының гиперсекрециясы;
- өкпенің созылмалы ауруларына тән альвеола-капиллярлық мембраналардың қалындауы нәтижесіндегі оттегінің диффузиясының қиындауы;
- ларингоспазм;
- өкпе тінінің серпімділігінің бұзылуы;
- тыныс түтіктеріне, трахеяға және бронхтарға бөгде заттардың түсуі;
- альвеолярлы тіннің ұлтты зақымдануы.

Егер орталық генезистің себептерін қарастыратын болсақ, онда олар мидың тыныс алу орталығының бұзылуымен біріктіріледі.

Орталық генездің ЖРФ негізі тыныс алу орталығының белсенділігін тежеу болып табылады, ол өз кезегінде келесі себептермен туындауы мүмкін:

- инсульт;
- улану;
- дәрілік заттардың артық дозалануы, барбитураттар, басқа препараттар;
- ісік тәрізді түзілістің қысылуы;
- ми жарақаты;
- электр жарақаты.

Жедел тыныс жеткіліксіздігі жүйке-бұлшықет өткізгіштігінің бұзылуынан және тыныс алу бұлшықеттерінің салдануынан туындауы мүмкін, олар жиі кездеседі:

- ботулизм;
- миастения грависі;
- бұлшықет босаңсытқыштарының артық дозалануы;
- полиомиелит;
- сіреспе.

Кеуде-диафрагматикалық жедел респираторлық жетіспеушілік тобына біріктірілген себептер кеуде қуысының, диафрагманың, өкпенің, плевраның қозғалғыштығының бұзылуынан туындайды, гемоторакспен, қабырғаның сынуымен, пневмоторакспен, кеуде қуысының жарақаттарымен, экссудативті плеврамен байқалады. Сондай-ақ ODNпозаның экстремалды дәрежесімен дамуы мүмкін.

Көмекей мен кеңірдек стенозы олардың тарылуымен, соның нәтижесінде төменгі ауа жолдарына ауа өтпей, демалудың жеткіліксіздігімен сипатталады. Көмекей мен кеңірдек стенозының көріністері және емдік шаралары бірдей болғандықтан оларды бірге қарастырады.

Көмекейдің жедел стенозының себептері болуы мүмкін:

- Көмекейдің жедел не созылмалы қабынулық үрдістер (ісіктік, инфльтратты, флегмонозды, абсцессті ларингит, созылмалы ісіктік-полипті ларингиттің асқынуы)
- Көмекейдің механикалық, термиялық және химиялық жарақаттары;
- Көмекейдің туа біткен ақаулары;
- Көмекейдегі бөтен зат;

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы		044-80/11 ()
Әдістемелік нұсқаулық		64 беттің 27 беті

- Жедел инфекциялық аурулар (дифтерия, скарлатина, тиф, малярия, корь)
- Көмекейдің ісінуімен дамидын аллергиялық реакция;
- Басқа аурулар (туберкулез, сифилис, жүйелік аурулар)

Емдік шаралар стеноздың стадиясына байланысты жүргізіледі. Компенсациялы және субкомпенсациялы стадияда медикаментозды емдеу жүргізуге болады. Көмекейдің ісінуінде дегидратациялы терапия, антигистаминді, кортикостероидты препараттарды тағайындайды. Көмекейдің қабынуында антибиотикотерапия мен қабынуға қарсы заттарды қолданады. Ө. Жоғары әсерге медикаментозды дестенизерлеу – антигистаминді, кортикостероидты және дегидратационды препараттардың комбинациясын қолдану. Стеноздың декомпенсация стадиясында жедел трахеостомия, ал асфиксия стадиясында жедел коникотомия

Коникотомия (анат. conus [elasticus] эластикалық конус + греч. tomēразрез, кесу; синоним кониотомия) — сақина және қалқанша шеміршектерінің арасынан көмекейді ортасынан тілу (кесу). Ө. Көрсеткіштері: Тыныс алудың бұзылысымен дамыған көмекейдің стеноздары (қабынулық, аллергиялық, ісіктік). Бұл жағдайда тыныс жиілеп, демалу мен демшығару қиындап, шулы болып шығады. Тыныс алуда мойын, иық және кеуде бұлшықеттері қатысады.

Коникотомияны пациенттің отырған не жатқан қалпында жүргізеді.

Алдымен пальпациямен сақинатәрізді шеміршегінің доғасын және Коникотомияны пациенттің отырған не жатқан қалпында жүргізеді.

Алдымен пальпациямен сақинатәрізді шеміршегінің доғасын және қалқанша шеміршегінің төменгі жиегін табады

Мойынның орта сызығына сақина тәрізді шеміршек доғасының үстіне скальпельды тік орналастырып, бірдегенде көмекейді 1, Мойынның орта сызығына сақина тәрізді шеміршек доғасының үстіне скальпельды тік орналастырып, бірдегенде көмекейді 1, 5 см тереңдікте тілік жасайды. Скальпельды алмай тілікті жоғарыға қарай бірнеше миллиметрге созады.

Скальпельды алғасын, тілікке алдымен Труссо кеңейткішін, кейін трахеотомиялық түтік орнатады Скальпельды алғасын, тілікке алдымен Труссо кеңейткішін, кейін трахеотомиялық түтік орнатады

5.5. Оқыту және оқыту әдістері (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

5.6. Әдебиет. Соңғы бетте

5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер :

1. Көмір қышқыл газбен улану кезінде ауруханаға дейінгі көрсетілетін біріншілік көмек:

- A. -оксигенотерапия
- B. -коникотомия жасау
- C. -унитиолды енгізу
- D. -асказанды жуу
- E. -трахеяның интубациясы

2. Геймлих әдісін қолданады:

- A. -тыныс жолдарында бөгде зат болған кезде
- B. -тырысулар кезінде
- C. -бас миы ісінген кезде
- D. -мұрын қуысында бөгде зат болғанда
- E. -түрлі жарақаттану кезінде

3. Науқастың тыныс жолдарында бөгде зат анықталғанда мейірбикенің іс әрекеті:

- A. -Геймлих әдісін қолдану
- B. -коникотомия жасау
- C. -Сафардың 3 кезеңнен тұратын әдісін қолдану
- D. -мамандандырылған бригаданы шақыру

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы		044-80/11 ()
Әдістемелік нұсқаулық		64 беттің 28 беті

- Е. -науқасты ауруханаға жатқызу
4. Ларингоспазм, тұншығудың ... түрінде дамиды.
- асфиксиялық
 - шынайы
 - синкопальді
 - барлық
 - ылғалды
5. Өкпені жасанды желдендіру үшін ... қажетті шарт болып табылады.
- ауыз қуысын тексеру және тазалау
 - ауа өткізгіш түтікшесін қою
 - тек арнайыланған дәрігердің болуы
 - «ауыз-бетперде-ауыз» әдісін қолдану
 - екі реаниматордың болуы
6. Бронх демікпесінің ұстамасы кезіндегі шұғыл медициналық көмек ... болады.
- сальбутамол
 - папаверин
 - либексин
 - тусупрекс
 - анальгин
7. Ларингоспазм, тұншығудың ... түрінде дамиды.
- асфиксиялық
 - шынайы
 - синкопальді
 - барлық
 - ылғалды
8. сақина және қалқанша шеміршектерінің арасынан көмекейді ортасынан тілу (кесу).
- Коникотомия
 - Геймлих әдісі
 - Ларингит
 - Интубация
 - Сафардың 3тік әдісі
9. Анафилактикалық шок кезінде алғашқы дәрігерге дейінгі көмектегі жедел жәрдемде мына дәрілерді енгізу болып табылады:
- адреналиндер
 - глюкокортикостероидтар
 - антигистаминді дәрілер
 - сары су
 - глюкоза
10. Гараж шатырынан құлағаннан соң науқаста оң балтыр сүйегінің сынығы байқалады. Балтыр сүйегінің сынығы кезінде жедел көмек:
- жансыздандыру, көліктік иммобилизациялау
 - жансыздандыру, жараны біріншілік хирургиялық өңдеу
 - жансыздандыру, сынықты салу
 - асептикалық таңғыш салу
 - шокқа қарсы терапия, асептикалық таңғыш салу

Ситуациялық есеп

Мектеп асханасында 6-сынып оқушысы асығыс тамақтану және сөйлесу кезінде конвульсиялық жөтел, тыныс алудың қиындауы пайда болды. Ол көмей аймағындағы ауырсынуға алаңдайды. Науқас абдырап қалды, қиын сөйлейді, қорқыныш сезінеді. Бет цианотикалық. Дауыстың

QAZAQSTAN RESPUBLIKASY QAZAQSTAN MEDICINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 29 беті

қарлығуы. Конвульсиялық жөтел шабуылдары және тыныс алу қиындықтарымен шулы тыныс алу мезгіл-мезгіл қайталанады.

Тапсырма:

1. Науқастың төтенше жағдайын анықтаңыз.
2. Дәрігерге дейінгі көмек алгоритмін жасаңыз.
3. Механикалық желдету (желдеткіш) техникасын көрсетіңіз.

7-сабақ

5.1. Дәрістің тақырыбы: Жедел жүрек жетіспеушілігі кезіндегі шұғыл мейіргерлік күтім.

5. 2. Сабақтың мақсаты:

- Қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету.
- Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету.

5. 3. Пәннің міндеттері:

Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету әрекеттерін орындау, өзінің рөлдерін, құқықтары мен лимиттерін түсіну, нормативтік – құқықтық актілерге және шұғыл көмек көрсету кезінде ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес өзінің іс-әрекеті мен әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті өзіне алуы, мейірбикелік күтімнің сапасын жақсарту үшін кәсіби қызметке шұғыл көмек көрсету кезінде басқару ережелерін ұстану.

1.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

- 1) Жүрекке тікелей емес массаж?
- 2) Өкпені жасанды желдендіру?

Жедел жүрек-қантамыр жүйесінің жеткіліксіздігі-бұл ағзаның заталмасу қажеттілігіне жүрек шығарылымының төмендеуімен жүретін патологиялық жағдай. Бұл жағдайда жүрек органдар мен тіндерді қажет қан көлемімен қамтамасыз ете алмайды, яғни оттегі және энергетикалық заттармен қамтамасыз ете алмайды.

Жүрек жеткіліксіздігінің себептері

- Гипертониялық ауру
- Туа және жүре пайда болған жүрек ақауы
- Өкпе артериясы тромбоэмболия
- инфаркт миокарда
- миокардит
- кардиосклероз
- миокардиодистрофия.

Өкпе ісінуінің клиникасы

- Науқастың жағдайы ауыр
- Науқас қалпы мәжбүрлі (отырады).
- Инспираторлы еңтікпе, цианоз
- Ұстама тәрізді жөтел, қанды көпіршікті қақырық болуы мүмкін.
- Алғаш өкпеде қатқыл тыныс естілсе, сосын құрғақ сырылдар.
- Өкпе ісінуінің клиникасы

Жылдамдығына байланысты:

- моментальді (5-10 минут арасында дамиды),
- жедел (1 сағ көлемінде дамиды)
- созылмалы (1 күннен 2 күнге созылады).

Көмек

Науқасқа денесін жоғары қаратқан қалыпқа келтіреді, аяқтарын төмен түсіріп отырғызған қалып

QONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	044-80/11 ()	
Әдістемелік нұсқаулық	64 беттің 30 беті	

жақсы,себебі шет бөліктердің қанайналымын дұрыстап,КҚШ қантамыры қысымның төмендеуіне әкеледі.

Гипоксиямен күресу үшін проводят ингаляцию кислорода с пеногасителями.

Пеногаситель ретінде қолданылады: этил спирт, антифомсилана. Оттегі Боброва банкасы арқылы не наркоз аппараты ротаметр көмегімен жіберіледі,8-12 л/мин.

Миокард инфаркті

- Тәждік қантамырларының оттегіні дұрыс тасымалдамауы және жүректің бұлшықеттерінің қан жеткіліксіздігі нәтижесінде жүрек бұлшықетінде ишемиялық некроз аймағының пайда болуынан дамиды ауру.
- Тәж артериясының атеросклерозы-инфаркт дамуының ең жиі себебі.Тәж қантамырларында атеросклероздық табақшалардың пайда болуы қантамырдың тарылуына алып келеді,оның нәтижесінде миокард бөлігі қанайналымының нашарлауына әкеледі.

Миокард инфарктінің клиникасы

- Негізгі симптомдардың бірі –интенсивті ауырсыну синдромы болып табылады.
- Жүрек аймағында,кеуде клеткасының сол жақ бөлігінде,төс артында жедел өрістейтін ауырсыну п/б,үз 30 минут асады.
- Ауырсыну сипаты әртүрлі:давящий, сжимающий, колющий, жгучий,
- Кейде айқын вегетативті реакциялар байқалады (тершеңдік, тері жабындыларының бозғылттығы,өлімнен қорқу).
- АҚҚ жоғары,ұалыпты не төмендеген болады.Жүрек ритм бұзылысы байқалады (топтық экстрасистола, пароксизмальная тахикардия, фибрилляция желудочков сердца).

Реанимациялық шаралар жүргізу:

-жүрекке тікелей емес массаж

-ӨЖЖ

-медикаментозды ем:Ауырсынуды басу– наркотикалық және наркотикалық емес анальгетиктер:фентанил 0,05 мг,морфин.

-Нитраттар – нитроглицерин,нитросорбит,сустан.

-Антиагреганттар:ацетилсалицил қышқылы

-Антикоагулянттар:гепарин 10 000 ЕД,варфарин.

-Тромболитиктер:стрептокиназа 1 000 000 Д.фибринолизин

-Бетта адреноблокаторлар:промедол 2% 20 мг,пропранолол,карведилол

Жүрек массажының мақсаты - жәбірленушінің денесіндегі қан айналымын жасанды түрде ұстап тұру және жүректің қалыпты жиырылу жиілігін қалпына келтіру.

Қан айналымы, яғни қанның қан тамырлары жүйесі арқылы қозғалуы қанның дененің барлық мүшелері мен тіндеріне оттегін жеткізуі үшін қажет. Сондықтан қанды жасанды тыныс алу арқылы оттегімен байыту керек. Осылайша, жүрек массажымен бір уақытта жасанды тыныс алу керек.

Массаж кезінде жүректің қалыпты табиғи жиырылуын, яғни оның тәуелсіз жұмысын қалпына келтіру жүрек бұлшықетінің (миокард) механикалық тітіркенуі нәтижесінде пайда болады.

Жүректің жанама массажы нәтижесінде пайда болатын артериялардағы қысым салыстырмалы түрде жоғары мәнге жетеді - 10–13 кПа (80–100 мм рт.ст.) және қанның зардап шеккен дененің барлық мүшелері мен тіндеріне түсуі үшін жеткілікті Бұл жүректің массажын (және жасанды тыныс) жүргізген кезде дененің өмірін сақтайды.

Жүрек массажына дайындық жасанды тыныс алуға дайындық болып табылады, өйткені жүректі массаж жасанды тыныс алумен бірге жүргізілуі керек.

Массаж жасау үшін жәбірленушіні арқасына қатты бетке жатқызу керек (орындық, еден немесе төтенше жағдайларда оның артына тақта қою керек). Сондай-ақ, оның кеудесін ашып, тыныс алатын киім-кешектерін босату керек.

Жүрек массажын жасау кезінде қамқоршы жәбірленушінің екі жағына көтеріліп, оның үстінен

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 31 беті

сәл немесе одан да көп бейімділік болуы мүмкін жағдайды алады.

Қысым орнын анықтап алғаннан кейін (ол жұмсақ ұшынан екі саусақ болуы керек) қолды алақанның астыңғы бөлігін үстіне қойып, екінші қолын үстіңгі жағына оң жақ бұрышпен қойып, жәбірленушінің кеудесіне аздап көмектесуі керек. бүкіл дененің қисайуы.

Қамқоршының қолдары мен білектері толықтай созылуы керек. Екі қолдың саусақтарын жақындату керек және жәбірленушінің кеудесіне тигізбеу керек. Стернумның төменгі бөлігі 3-4, ал толық адамдарда 5-6 см-ге төмендейтін етіп басуды жылдам итеру арқылы жасау керек. Қысым көбірек қозғалмалы стернумның төменгі бөлігіне шоғырлануы керек. Стернумның жоғарғы бөлігінде, сондай-ақ төменгі қабырғалардың ұштарында қысымнан аулақ болу керек, өйткені бұл олардың сынуына әкелуі мүмкін. Кеуде қуысының шетінен төмен қарай басуға болмайды (жұмсақ тіндерге), өйткені осында орналасқан мүшелерді, әсіресе бауырды зақымдауға болады. Стернумдағы қысымды (итеруді) секундына 1 рет немесе жеткілікті қан ағымын қалыптастыру үшін жиі қайталау керек. Жылдам итергеннен кейін қолдың жағдайы шамамен 0,5 сек өзгермеуі керек. Осыдан кейін сіз қолыңызды сәл түзетіп, босаңсытуыңыз керек, оларды стернумнан шығармайсыз.

Балаларда массаж бір секундта 2 рет басу арқылы жасалады.

Зардап шеккен адамның қанын оттегімен байыту үшін жүрек массажымен қатар «ауыздан ауызға» (немесе «ауыздан мұрынға») әдісін қолданып жасанды тыныс алу керек.

Егер екі көмекші болса, онда олардың бірі жасанды тыныс алуы керек, ал екіншісі - жүрек массажы. Олардың әрқайсысына кез-келген 5-10 минут сайын бір-бірін алмастырып, жасанды тыныс алуды және жүрек массажын жасау ұсынылады. Көмек көрсету тәртібі келесідей болуы керек: бір терең инъекциядан кейін кеудеге бес қысым жасалады, егер ол инъекциядан кейін жәбірленушінің кеудесінде қалады қозғалыссыз (және бұл үрленген ауаның жеткіліксіз мөлшерін көрсетуі мүмкін), екі рет терең соққы жасағаннан кейін 15 қысым жасағаннан кейін, әртүрлі тәртіпте көмек көрсету қажет. Шабыт кезінде сіз стерженьді баспаңыз.

Егер көмек берушіде көмекші болмаса және жасанды тыныс алуды және жүрекке сыртқы массаж жасайтын болса, онда бұл операцияларды келесі ретпен ауыстыру қажет: жәбірленушінің аузына немесе мұрнына екі рет терең соққы жасағаннан кейін, медициналық көмекші кеудеге 15 рет басады, содан кейін тағы екі терең соққы жасайды жүрек массажы үшін 15 қысымды қайталайды және т.б.

5.5. Оқыту және оқыту әдістері (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

5.6. Әдебиет. Соңғы бетте

5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер :

1. Қарыншалық фибрилляция кезіндегі алғашқы көмек:

- A. -электрлік дефибрилляция
- B. -лидокаинді көктамырға енгізу
- C. -калий хлориді, кальций хлориді, атропинді енгізу
- D. -жүректің жабық массажын жасау
- E. -амиодаронды көк тамырға енгізу

2. Нормотермия жағдайында клиникалық өлімнің ұзақтығы ... минут.

- A. -5
- B. -7
- C. -25-30
- D. -8-10
- E. -20

3. Жаңа туылған нәрестеге жүрекке жабық массаж жүргізу кезіндегі кеуде клеткасының басу тереңдігі ... см.

- A. -1,5-2

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 32 беті

- B. -4-6
- C. -5-6
- D. -7-8
- E. -3

4. Жүрек тоқтаған кезде ... қолданылады.

- A. -адреналин
- B. -кардиамин
- C. -дроперидол
- D. -фуросемид
- E. -димедрол

5. Жіті миокард инфарктысында ауырсыну синдромын басу үшін ... қолданылады.

- A. -промедол
- B. -аспирин
- C. -но-шпа
- D. -атропин
- E. -бетта- блокатор

6. Стенокардия ұстамасы кезіндегі жедел көмекте ... беру керек.

- A. -тіл астына нитроглицерин
- B. -ингаляциялық жолмен астмопент
- C. -тері астына димедрол
- D. -ішке преднизолон
- E. -көк тамырға атропин

7. Жүрекке тікелей емес массаж жасаудың міндетті шарты:

- A. -қолдың, семсер тәрізді өсіндінің төске жалғанған жерінен көлденең 2 саусақ жоғары тұруы
- B. -көкірек сарайының астында жұмсақ заттың болуы
- C. -екі реаниматордың болуы
- D. -жауырын астында валиктің болуы
- E. -қолдың кеуде сарайының сол жағында болуы

8. Жүректің кенеттен тоқтап қалуы кезінде көмек көрсету барысында бірінші кезекте ... керек.

- A. -тіршілік белгілері (пульсі, тынысы) бар, жоғын тексеру
- B. -прекордиальді соққы жасау
- C. -жүрекке тікелей емес массаж жасауға кірісу
- D. -өкпені жасанды желдендіруге кірісу
- E. -дене жаракатының бар, жоғын тексеру

9. Укус қышқылын ішкен науқасқа ауруханаға дейінгі алғашқы дәрігерлік көмек көрсету:

- A. ауырсынуды басу, соңынан асқазанды зонд арқылы көп мөлшерлі сумен жуу
- B. спазмолитиктер енгізу
- C. асқазанды зонд арқылы көп мөлшерлі 2%-ды ас содасымен жуу
- D. асқазанды зонд арқылы жумай, көп мөлшерде сілтілік ерітінді ішкізу
- E. сұйықтық ішкеннен соң құсық шақыру

10. Жарақаттанушы жеңіл көлік астында жатыр, есі анық. Білектің ашық сынығы анықталады, жарақаттан атқылап ал қызыл қан ағуда. Сіздің алғашқы көмегіңіз:

- A. қан кетуді тоқтату
- B. айналадағылардың көмегімен көліктің астынан жарақаттанушыны алып шығу
- C. жедел жәрдем көлігін күте отырып, жарақаттанушыны бақылап отыру
- D. жедел жәрдем көлігі келгенше, жарақаттанушының анамнезін жинау
- E. мүсәтір спиртін иіскету

Ситуациялық есеп:

1.«Миокартың жіті инфарктысы» диагнозбен науқас мониторлы бақылауда, ЭКГ – да бірең –

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы		044-80/11 ()
Әдістемелік нұсқаулық		64 беттің 33 беті

сараң экстрасистолия кезінде жиілігі минутына 360 дейін майда тісшелер кенет пайда болды. Науқас ес – түссіз, ұйқы артериясында пульс анықталмайды, тынысы тоқтаған. Көз қарашығы жәймен кеңейді. Арефлексия.

Тапсырма:

1. Диагноз қойыңыз.
2. Қажетті іс – шараларды және олардың кезектілігін анықтаңыз.

8-сабақ

5.1. Дәрістің тақырыбы: Гипертониялық криз кезіндегі шұғыл мейіргерлік күтім.

5.2. Сабақтың мақсаты:

- Қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету.
- Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету.

5. 3. Пәннің міндеттері:

Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету әрекеттерін орындау, өзінің рөлдерін, құқықтары мен лимиттерін түсіну, нормативтік – құқықтық актілерге және шұғыл көмек көрсету кезінде ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес өзінің іс-әрекеті мен әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті өзіне алуы, мейірбикелік күтімнің сапасын жақсарту үшін кәсіби қызметке шұғыл көмек көрсету кезінде басқару ережелерін ұстану.

1.5. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

- 1) Гипертониялық криз кезіндегі шұғыл мейіргерлік күтім.
- 2) Асқынбаған гипертензивті криздегі шұғыл мейіргерлік күтім?

Гипертониялық криз – вегетативті бұзылыстар негізіндегі ми мен жүрек-қан тамырлар жүйесінің патологиялық өзгерістері мен шағымдармен қатар жүретін артериялық қысымның кенеттен жоғарылауы.

Гипертониялық криздің клиникалық көрінісі нысана-органның зақымдалуымен байланысты, бұл жағдайда организм басқа органдардың зақымдалуының алдын алу үшін артериялық қысымды тез арада түсіруге тырысады. Түрлері:

- Тамырлық- жалпы перифериялық қарсыласудың жоғарлауының нәтижесінде вазомоторлы (нейрогуморальды әсер) және базальды натрийдың ұсталуы артериолалар тонусының жоғарлауына әкеледі
- артериолалардың вазомоторлы және базальді тонусының нәтижесінде жалпы перифериялық қарсы тұрудың жоғарлауы;
- Кардиальды – жүрек лақтырысының жоғарлауының нәтижесінде миокардтың жиырылғыштығы, жүректің жиырылу жиілігі, циркуляциялық қан көлемінің жоғарлауына әкеледі.
- Көлемдік- тамыр ішілік сұйықтық көлемінің ұлғаюына әкеледі.

Гипертензиялық криз белгілері:

- Гипертониялық криз артериялық қысымның кез келген дәрежесінде немесе симптоматикалық артериялық гипертензия кезінде дамуы мүмкін. Кей кезде гипертониялық криз дені сау адамда да пайда болуы мүмкін. Криздік жағдайға себепкер факторлар:

- Шектен тыс жүктемелер;
- Ауа райы өзгерісі;
- Кофе, алкогольді сусындарды көп пайдалану;
- Гормональды бұзылыстар;
- Бұрын қабылдаған гипотензивті препараттарды қабылдауды тоқтату;
- Ми (инсульт), жүрек (миокард инфарктісі, стенокардия ұстамасы), бүйрек аурулары.
- Бірнеше минут немесе 1-3 сағатта кенеттен пайда болуы;
- Артериялық қан қысымы деңгейі индивидуалды түрде жоғары (бір науқаста ол деңгей – 240/120, басқасында – 130/90). Ол бастапқы артериялық қысымның деңгейіне байланысты. Егер

QAZAQSTAN QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 34 беті

пациенттің қан қысымы әрдайым төмен болса, оның сәл көтерілуінің өзі гипертониялық криз тудыруы мүмкін.

- Жүрек жағынан шағымдардың болуы (жүрек тұсы ауруы, жүрек соғысы);
- Ми жағынан шағымдардың болуы (бас айналуы, бас ауруы, көрудің әр түрлі бұзылыстары);
- Вегетативті нерв жүйесі жағынан шағымдардың болуы (діріл, тоңу, терлеу, басқа қан құйылу сезімі, ауа жетпеу сезімі және т.б.)

Бірінші типті гипертониялық криз нейровегетативті көріністерімен сипатталады. Криз ұзақтығы бірнеше минуттан, бірнеше минутқа дейін созылуы мүмкін. Науқаста бет гиперемиясы, теріде қызыл дақтар, терлегіштік байқалады. Сырттай науқастар қозғыш, мазасыз, бас ауруына, дене қызуына, дененің барлық аумағындағы дерілдер, көз алдындағы тұманға шағымданады.

Біріншілік типті кризде науқаста көбінесе систолиялық қан қысымы көтеріліп, гиперкинетикалық қан айналым түрі байқалады.

Екіншілік гипертониялық криз бірнеше сағаттан бастап, бірнеше күнге дейін созылуы мүмкін. Науқастар әлсіз, тежелген (вялый). Бас ауруына, бас айналуына, әлсіздікке шағымданады. Ауыр түрде гипертониялық энцефалопатия дамиды. Гипертониялық энцефалопатияда бастың қатты ауруы, көрудің бұзылуы соқырлыққа дейін жетуі мүмкін, лоқсу, құсу, естің бұзылуы комаға дейін жетуі мүмкін.

Екінші типті криз кезінде қан айналымның гипокинетикалық түрі көрініс береді.

- **Асқынбаған криз** – «нысана-мүшенің» зақымдалуысыз болады. Алайда бұл криз бәрібір науқас өміріне қауіп төндіреді. Артериялық қысымды бірнеше сағат ішінде төмендету керек.
- **Асқынған криз** – «нысана-мүшенің» зақымдалуымен жүреді. Нысана-мүшелер – осы ауру кезінде азды, көпті зақымдалатын мүшелер. Артериялық гипертонияда олар – жүрек, ми, қан тамырлары, бүйректер. Мұндай криз ауру өміріне қауіп тудырады және тез арада 1 сағаттың ішінде артериялық қысымды төмендетуді талап етеді. Бұл криздің ұзақ уақыт болуынан жүрек жағынан (миокард инфарктісі, жедел сол жақ қарынша жетіспеушілігі, тұрақты емес стенокардия, аритмия), қан тамырлар жағынан (қолқаның қабатталған аневризмасы, қан кетулер), ми жағынан (инсульт, транзиторлы ишемиялық шабуыл, жедел гипертониялық энцефалопатия), бүйрек жағынан (жедел бүйрек жетіспеушілігі) көптеген асқынулар болуы мүмкін.

Медициналық көмек көрсету тактикасы

Мақсаты: Өмірге маңызды функцияларды стабилизациялау.

Асқынбаған гипертонивті криз:

1. Науқас қалпы – басын жоғары көтеру
2. АҚ әрбір 15 минут сайын бағалау.
3. АҚ біртіндеп алдығыдан 15-25% төмендету
4. Пероральді гипотензивті дәрілік заттарды қолдану (бір препараттан бастау): нифедипин, каптоприл, пропранолол, бисопролол, метопролол).
5. Бас миының перифериялық тамыр қарсыласуды төмендету және стабилизациялау - винкамин 30 мг

Антигипертензивті терапияны парентеральді заттармен жүргізеді;

АҚ төмендету (15- 20% бастапқысынан алғашқы сағатта, кейін 2- 6 сағ 160 және 100 мм.сын.бағ. (пероральді заттарға көшуге болады).

5.5. Оқыту және оқыту әдістері (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

5.6. Әдебиет. Соңғы бетте

5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер :

1. Жүрек соғысы тоқтауының негізгі белгісі:

А. -ұйқы артериясында тамыр соғысынның болмауы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 35 беті

- В. -өздігінен тыныс алуының болмауы
 - С. -көз қарашығының ұлғайуы
 - Д. -есінің болмауы
 - Е. -білек артериясында тамыр соғысынның болмауы
2. Гипогликемиялық кома кезіндегі шұғыл көмек ... енгізу.
 - А. -глюкозаны көк тамырға
 - В. -инсулинді тері астына
 - С. -дибазолды көк тамырға
 - Д. -гепаринді көк тамырға
 - Е. -физиологиялық ерітіндіні көк тамырға
 3. Инфекциялық– токсикалық шокпен науқасты ...тасымалдау керек.
 - А. -артериалды қан қысымын қалпына келтіріп
 - В. -дене қызуы қалпына келтіріп
 - С. -тырысуға қарсы дәрі-дәрмекті енгізіп
 - Д. -кортикостероидты гормондарды енгізіп
 - Е. -антибиотиктерді енгізіп
 4. Сыныққа тән белгі:
 - А. -сүйек сықыры
 - В. -терінің көгеруі
 - С. -ісіну
 - Д. -аяқ-қол қозғалысының шектелуі
 - Е. -ауырсыну
 5. Мойын омыртқасы зақымданғанда транспорттық иммобилизация ретінде ... қолданылады.
 - А. -мақта-дөкелік Дельбе жағасы
 - В. -Крамер шендеуіші
 - С. -Дитерихса құрсауы
 - Д. -айқасқан байламы
 - Е. -«Тақия» байламы
 6. Бас сүйегінің негізі сынғандағы көрініс:
 - А. -қан кету, мұрыннан және құлақтан ликвордың ағуы
 - В. -қабақтың ісінуі
 - С. -тері асты эмфиземасы
 - Д. -көрудің қосарлануы
 - Е. -тепе-теңдіктің бұзылысы
 7. Ішкі қан кетудің негізгі белгілеріне ... тән.
 - А. -тері қабатының бозғылттығы
 - В. -дене қызуының жоғарылауы
 - С. -терінің қызаруы
 - Д. -брадикардия
 - Е. -артерияның қан қысымының жоғарылауы
 8. Жылан шаққан кезде бірінші кезекте ... керек.
 - А. -тістеген жерге суық басып, иммобилизациялау, жәбірленушіні емдеу мекемесіне тасымалдау
 - В. -жылан тістеген жерді тіліп, банканы қолдану арқылы уды сорып алып, тасымалдау
 - С. -уды сорып шығарып тастап, жәбірленушіні үйде қалдыру
 - Д. -екі үлкен саусақпен жылан тістеген жерді сығып тастау
 - Е. -жылан тістеген жерді тіліп, улы қанды сыртқа ағызып жіберу
 9. Кез-келген жастағы балаларда температураны түсіру үшін қолданылатын қауіпсіз дәрі ... болып табылады.
 - А. -парацетамол

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 36 беті

- B. -салицилаттар
- C. -анальгин
- D. -амидопирин
- E. -димедрол

10. Зақымданған адам арқасымен жатыр, көзі жұмулы, тынысы қиындаған, сирек, тері және шырышты қабықтары бозарыңқы, екі тізесі де зақымданған, көптеген кансыраған жаралар байқалады, екі тізесінің буындары сыртқа бұрылған, тамыр соғысы әлсіз пальпацияланады, жиі. Осы кезеңінде дәрігерге дейінгі бірінші кезектегі жасалынатын шара:

- A. бұлшық ет ішіне анальгетиктерді егу
- B. тері астынан анатоксин енгізу
- C. дәрі енгізу
- D. қолдағы затпен иммобилизациялау
- E. жатқан жайда ошақтан эвакуациялау

Ситуациялық есеп

Облыстық аурухананың терапия бөліміне 50 жастағы науқас желке аймағындағы қатты бас ауруы, құсу, көз алдында шыбындардың жыпылықтауы туралы шағымдармен түсті. Жағдайдың нашарлауы стресстік жағдаймен байланысты.

Объективті: жағдайы ауыр, қозған, бет терісі гиперемияланған, импульсі 100 уд. мин., **ритакты, кернеулі, қан қысымы 220/110 мм сын.бағ. ст.**

Тапсырма:

1. Науқастың жағдайын анықтаңыз және негіздеңіз.
2. М / с әрекет алгоритмін жасаңыз.
3. 2% дибазол ерітіндісін, 2 мл бұлшықет ішіне енгізу техникасын көрсетіңіз.

9-сабақ

5.1. Дәрістің тақырыбы: Аллергиялық реакциялар кезіндегі шұғыл мейіргерлік күтім.

Анафилактикалық шок.

5. 2. Сабақтың мақсаты:

- Қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету.
- Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету.

5. 3. Пәннің міндеттері:

Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету әрекеттерін орындау, өзінің рөлдерін, құқықтары мен лимиттерін түсіну, нормативтік – құқықтық актілерге және шұғыл көмек көрсету кезінде ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес өзінің іс-әрекеті мен әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті өзіне алуы, мейірбикелік күтімнің сапасын жақсарту үшін кәсіби қызметке шұғыл көмек көрсету кезінде басқару ережелерін ұстану.

1.6. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

- 1) Аллергиялық реакциялар
- 2) Анафилактикалық шок кезіндегі шұғыл көмек?

Аллергия – иммундық жауабының үлгісі, ол әр түрлі құрамдағы бөгде заттарға ағзаның жоғары ерекше сезімталдығының дамуынан пайда болады және осы заттармен аллергияны қоздырушы зат аллергиялар деп аталады. Аллергияның патогенезін, диагностикасын, алдын-алу және емін аллергология зерттейді.

Аллергиялық реакциялар түрлері:

– тері, теріасты шел қабаты және шырышты қабаттардың айқын ісінуімен мінезделетін жедел аллергиялық ауру

Квинке ісінуі көп жағдайда бетте, мойында және дененің жоғары бөлігінде, қол және аяқ басының сыртқы жағында кездеседі

Сирек жағдайда Квинке ісінуі ми қабықтарын, буындарды және ішкі мүшелерді зақымдайды.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 37 беті

Бет, алақанның сыртқы беті, мойын, аяқ басының сыртқы беті тіндерінің жедел дамитын ісінуі. Ісіну аймағында тері түсі бозғылттанады. Ісіну қышыну сезімсіз, бірнеше сағат немесе бірнеше күнде ізсіз жоғалады.

Ең қауіпті түрі – жұтқыншақ, көмей, кеңірдек ісінуі (әр төртінші науқаста). Кенеттен мазасыздық, тыныстың қиындауы дамиды, сана бұзылуы мүмкін. Жұмсақ таңдай және таңдай доғашықтары ісінеді, аңқа өзегі тарылады. Науқас тұншығудан қайтыс болуы мүмкін.

Ішкі мүшелердің Квинке ісінуі іштегі қатты ауру сезімімен, іш өту, құсумен көрінеді.

Шұғыл көмек

Көмей ісінуі кезінде шұғыл түрде тері астына 0,1%- 1,0 адреналин ерітіндісін енгізу қажет; Көктамырға немесе бұлшық етке антигистаминді дәрілер (димедрол, супрастин, тавегил) енгізіледі, гидрокортизон (125 мг) немесе преднизолон (60 — 90 мг)

Ылғалды оттегімен тыныс алдыру

Диуретиктер енгізу: фуросемид (к/т немесе б/е 1% ерітіндісі 1—2 мл), 15% маннит ерітіндісі (к/т ағызып немесе баяу тамшылатып 1,5 г/кг дене салмағына есебі бойынша)

Науқастың жағдайы нашарлай түссе шұғыл коникотомия жасау көрсетілген

Интенсивті терапия немесе реанимация бөліміне шұғыл тасымалдау

Тағамдық аллергия: - адамның тамаққа жоғары сезімталдығының көріністері, иммунды жүйедегі бұзылыстарға байланысты — белгілі тағамға қарсы ағзада антиденелер (реагиндер) және иммунды жасушалар өндірілуі

Тағамдық аллергия түрлері әр алуан, бірақ ең жиі кездесетіндері әртүрлі экзантемалар, нейродермит, есекжем, Квинке ісінуі.

Тағамдық аллергия абдоминальды және диспепсиялық синдромдармен көрінуі мүмкін, жиі – респираторлы аллергоз симптомдарымен, талмалық жағдай түріндегі жалпы реакциямен, шеткері қандағы өзгерістермен көрінуі мүмкін (тромбоцитопениялық және лейкопениялық реакциялар), бірлескен тері-респираторлы реакциялармен өтуі мүмкін, бұларға кең спектрлі тағамдық және өндірістік ингаляциялық аллергендерге полиаллергия тән.

Аллергия симптомдары өте тез немесе тағамды жегеннен кейін 2 сағат ішінде дамиды.

Шұғыл көмек:

- Себептік аллергенді алып тастау
- Гипоаллергенді емдәм
- Антигистаминді дәрілер (супрастин, тавегил) курспен 2 аптаға дейін 5-7 күннен кейін дәрілерді алмастыра отырып
- Антимедиаторлық әсерлі дәрілер (интал 100 – 150 мг/кг тәулігіне ішке, задитен 0,025 мг/кг тәулігіне курспен 1,5 айдан 6 айға дейін)

Созылмалы аллергодерматоздар кезінде гистаглобулин қолданады, тек ремиссия кезеңінде тағайындалады, сонымен қатар аллергоглобулин (қорғаныш антиаллергиялық заттары бар гамма-глобулин) қолданылады.

Анафилактикалық шок - организмге аллерген енген жағдайда бірден дамитын аллергиялық реакция нәтижесінде пайда болатын өмірге қауіпті патологиялық процесс және қан айналымы, тыныс алу, орталық жүйке жүйесінің ауыр бұзылыстарымен сипатталады.

Мұндай кезде ауру кенеттен басталады. Күлдіреуіктердің пішіні мен көлемі әр түрлі, түсі ашық қызғылт, ортасы ақ. Көп жағдайда күлдіреуік бірнеше сағаттан кейін ешқандай із қалдырмай өзінен-өзі басылады. Кейде ауру ұзаққа созылып, науқастың қызуы көтеріліп, мазасы кетеді. Көмейдің кілегей қабығында бөртпе болғанда адам жөтеліп, тұншығады. Емді дәрігер тағайындайды. Ауырған адамға сүт, өсімдік тағамдары беріледі, әсіресе, аллергия тудыратын тағамдарды, ащы және сүрленген тағамдарды жеуге болмайды. Қышыманы басу үшін салқын компресс, жылы ванна қолданады, теріге спирттік ерітінділер (қырмызыгүл, 2%-тік салицил, арақ, т.б.) жағады. Тамақтың немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болған Есекжемде ең алдымен клизмамен ішті тазалап, көп мөлшерде су ішкізеді

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 38 беті

Торпидтік кезеңді 3 дәрежеге бөледі:

I дәрежелі шок. Компенсирленген, вазоконстрикция басым. Жалпы жағдайы ауыр, тері жабындары бозарған, еріннің, тырнақ фалангаларының цианозы, тыныс алуы беткей, гипотермия белгілері, орталық жүйке жүйесі жағынан әлсіздік, реакциясы баяулаған, қарашықтардың тарылуы. Кардиоваскулярлы белгілері: артериалдық қысым біраз төмендеген немесе қалыпты, тамыр соғысы баяулаған.

II дәрежелі шок. Субкомпенсирленген, вазодилляция басым. Жағдайы өте ауыр, цианоз өршиді (кең жайылған цианоз), тыныс алуы жиі, беткейлі, гипотермия, шөлдеу, олигоанурия. Церебралды синдром: есеңгіреген, қарашықтары кеңейген, жарыққа реакциясы баяулаған. Кардиоваскулярлы синдром: жүрек тондары тұйықталған, гипотония, тахикардия, экстрасистолия. Қанда метоболикалық ацидоз, гипокалиемия, гипоксия.

III дәрежелі шок. Декомпенсирленген, вазотония басым. Жағдайы өте ауыр, таралған цианоз, гипотермия, тыныс алуы беткей, жиі Чейн-Стокс тынысы түрінде, анурия. Церебралды синдром: есі жоқ, адинамия, қарашықтары кеңейген, жарыққа реакциясы жоқ, сезімталдық жойылған. Кардиоваскулярлы синдром: тамыр соғысы анықталмайды немесе жіп тәрізді, систоликалық артериалдық қысым 50 ммсымбағ-нан төмен, жүрек тондары тұйық, аритмия. Қанда айқын метоболикалық ацидоз, ауыр гипоксемия.

Анафилактикалық шоктың емдеу алгоритмі

Шұғыл көмек:

1. Науқасты Тренделенбург қалпына келтіру: аяқ басын көтерген күйде, басын бүйіріне қаратып, тілін артқа кетуінің алдын алу үшін, асфиксия, құсық массалары мен аспирация болдырмау үшін төменгі жақты алға тарту, таза ауаның келуін қаматамасыз ету. Оксигенотерапия жүргізу.

2. Ағзаға аллергиялендердің ары қарай түсуін тоқтату:

а) аллергиялендерді парентеральды енгізу:

— аллергиялен енгізген жердің жоғарғы бөлігіне артерияны қыспайтын етіп, 30 минутқа жгут салу (әр 10 минут сайын жгутты бір-екі минутқа босатып отыру қажет);

— «крест тәрізді» инъекция орнына (шағу) 0,18 % эпинефрин ертіндісін 0,5 мл (мүмкіндігінше к\т-ға– гипоперфузия!) 5,0 мл изотониялық ертінді натрий хлориді 5,0 мл және мұз қояды (бірінші емдік тағайындау!).

б) аллергияленді медикаменттерді мұрын қуысына тамшылату және конъюктиваны сумен жуу керек.

в) аллергиялендерді пероральды қабылдағанда науқастың жағдайы көтерсе асқазанды жуу керек.

Шокқа қарсы іс-шаралар:

а) бұлшық етке тез арада егу:

— 0,18 % эпинефрин ертіндісі 0,3 – 0,5 мл (1,0 мл-ден аспау керек). Эпинефринді қайталап енгізу аралығы 5 - 20 минут, АҚ бақылау;

— антигистаминді препараттар: 1% дифенгидрамин ертіндісі 1,0 мл-ден аспау керек (өршіген үрдісті ары қарай болдырмау). Пипольфен қабылдауға қарсы көрсеткіш айқын гипотензивті әсер!

б) инфузионды терапия 0,9% натрий хлориді ертіндісі 1 литрден аз болмау керек. Қан тамыр ішілік көлемді қайта қалпына келтіру үшін. Алғашқы 10 минут ішінде гемодинамика тұрақтылығы жойылғанда шоктың ауырлығына байланысты қайталап коллоидты ерітінді (пентакрахмал) 1-4 мл/кг/мин енгіземіз. Инфузионды терапия жылдамдығы және көлемі АҚ жоғарылауымен, ЦВД жоғарылауымен және науқастың жағдайының жақсаруымен анықталады. Аллергияға қарсы ем: к\тамырға преднизолон 90-150 мг струйно.

5.5. Оқыту және оқыту әдістері (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

5.6. Әдебиет. Соңғы бетте

5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер :

1.Инфекциялық– токсикалық шокпен науқасты ...тасымалдау керек.

А. -артериалды қан қысымын қалпына келтіріп

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 39 беті

- В. -дене қызуы қалпына келтіріп
 - С. -тырысуға қарсы дәрі-дәрмекті енгізіп
 - Д. -кортикостероидты гормондарды енгізіп
 - Е. -антибиотиктерді енгізіп
2. Тез ағымды анафилактикалық шоктың түрінде мейірбикенің іс-әрекеті:
- А. -көк тамырға адреналинді енгізу
 - В. -бұрауды инъекция орнынан жоғары салу
 - С. -бұлшық етке димедролды енгізу
 - Д. -инекция жасалған жердің айналасына адреналинді енгізу
 - Е. -өкпені жасанды желдету
3. Ылғалдандырылған оттегіні мұрын катетерімен берудің ұзақтығы...минут.
- А. -40-60
 - В. -10-20
 - С. -20-30
 - Д. -30-40
 - Е. -60-80
4. Анафилактикалық шок кезінде алғашқы дәрігерге дейінгі көмектегі жедел жәрдемде мына дәрілерді енгізу болып табылады:
- А. -адреналиндер
 - В. -глюкокортикостероидтар
 - С. -антигистаминді дәрілер
 - Д. -сары су
 - Е. -глюкоза
5. Эпилепсиялық ұстама кезінде бірінші кезекте:
- А. -асфиксияны болдырмау
 - В. -объективті тексеру жүргізу
 - С. -тілді тістеп қалмауды қадағалау
 - Д. -тырысуды болдырмау
 - Е. -тыныштандыратын дәріні енгізу
6. Бүйрек ұстамасы кезіндегі жедел көмек
- А. -но-шпаны енгізу
 - В. -преднизолонды енгізу
 - С. -дибазолды енгізу
 - Д. -лазиксті енгізу
 - Е. -кетоналды енгізу
7. Улану түрлеріне байланыссыз, психозды басу үшін ... енгізеді.
- А. -нейролептиктер
 - В. -анальгетиктер
 - С. -кортикостероидтар
 - Д. -инсулин
 - Е. -антигистаминдер
8. Уксус қышқылын ішкен науқасқа ауруханаға дейінгі алғашқы дәрігерлік көмек көрсету:
- А. -ауырсынуды басу, соңынан асқазанды зонд арқылы көп мөлшерлі сумен жуу
 - В. -спазмолитиктер енгізу
 - С. -асқазанды зонд арқылы көп мөлшерлі 2%-ды ас содасымен жуу
 - Д. -асқазанды зонд арқылы жумай, көп мөлшерде сілтілік ерітінді ішкізу
 - Е. -сұйықтық ішкеннен соң құсық шақыру
9. Жарақаттанушы жеңіл көлік астында жатыр, есі анық. Білектің ашық сынығы анықталады, жарақаттан атқылап ал қызыл қан ағуда. Сіздің алғашқы көмегіңіз:
- А. -қан кетуді тоқтату

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 40 беті

- В. -айналадағылардың көмегімен көліктің астынан жарақаттанушыны алып шығу
- С. -жедел жәрдем көлігін күте отырып, жарақаттанушыны бақылап отыру
- Д. -жедел жәрдем көлігі келгенше, жарақаттанушының анамнезін жинау
- Е. -мүсәтір спиртіні иіскету

10. Өкпеден қан кеткенде шұғыл көмек:

- А. -аминокапрон қышқылы, дицинон
- В. -гепарин, дибазол
- С. -ацетилсалицил қышқылы, реопирин
- Д. -супрастин, пипольфен
- Е. -анальгин, димедрол

Ситуациялық есеп

Науқас тісті жұлу мақсатында стоматологиялық емхананың хирургиялық кабинетінің тіс дәрігеріне жүгінді. Анамнезден науқастың пенициллин инъекциясына аллергиялық реакциясы болғандығы анықталды.

Науқасқа 2% новокаин ерітіндісімен анестезия жасалды. 3-5 минуттан кейін науқастың жағдайы нашарлады.

Объективті деректер: айқын бозару, цианоз, қатты тер, тахикардия, қан қысымы күрт төмендеді; қышу сезімі, бет терісінің қышуы, қорқыныш сезімі, төс сүйегінің артындағы ауырлық сезімі және тыныс алудың қиындауы пайда болды.

Тапсырма:

1. Науқастың төтенше жағдайын анықтаңыз.
2. Жедел жәрдем алгоритмін жасаңыз.
3. Қан қысымын өлшеу техникасын көрсетіңіз.

10- сабақ

5.1. Дәрістің тақырыбы: Естен тану және коллапс кезіндегі шұғыл мейіргерлік күтім.

5.2. Сабақтың мақсаты:

- Қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету.
- Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету.

5.3. Пәннің міндеттері:

Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету әрекеттерін орындау, өзінің рөлдерін, құқықтары мен лимиттерін түсіну, нормативтік – құқықтық актілерге және шұғыл көмек көрсету кезінде ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес өзінің іс-әрекеті мен әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті өзіне алуы, мейірбикелік күтімнің сапасын жақсарту үшін кәсіби қызметке шұғыл көмек көрсету кезінде басқару ережелерін ұстану.

5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

1. Коллапс
2. Естен тану кезіндегі шұғыл көмек?

Естен тану (синкопе) – жедел тамыр жетіспеушілік, бас миының өтпелі ишемиясынан туындатқан кенеттен қысқа мерзімге есін жоғалтумен сипатталады.

Себептері:

- Қарыншалық тахикардия
- Аорталды стеноз
- Вазовагальды (артериалды гипотензия, ыстық бөлмеде болу, қорқу, психоэмоционалдық жағдайлар, ауырсыну синдромы)
- Ортостатикалық гипотензия - горизонталды жағдайдан тез тік жағдайға ауысқанда кездеседі. Себептері: ұзақ төсек режимі, дене температурасының жоғарылауы, қоршаған ортаның температурасының жоғарылауы, жүктілік, ағзаның тез дегидратациясы, ОЖЖ ісіктері)

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы		044-80/11 ()
Әдістемелік нұсқаулық		64 беттің 41 беті

· Жағдайлық естен тану (зәр бөлуде, дефекация актінде, ж.өтелу ұстамасында ж.т.б.)

Себепші факторлар: қорқу, үрей, қаннан қорқу, интенсивті ауырсыну синдромы, алкоголь қолдану, ұйқы қанбау, ыстық бөлмеде болу.

Клиникалық белгілері: Естен тану бірнеше секундтан 3 – 5 минутқа созылады.

Әлсіздік, көз алдында қарауыту, құлағында шу, жүрек айну, ауа жетпеу сезімі.

Қарағанда: терісі боз, салқын тер, әлсіз тамыр соққысы, гипотония, беткей сирек тыныс.

Жедел жәрдем:

- Науқасты көлденен, жастықсыз жатқызып, керуеттың аяқ бөлігін көтеру
- Қысып тұрған киімдерін босату
- Таза ауамен қамтамасыз ету
- Науқастың бетіне және кеудесіне су бүркіп, суық суға батырылған алақандармен (сүлгімен) бетінен шапалақтау.
- науқастың мұрнына мүсәтір спирті сіңген мақтаны иіскету.

АҚ төмендеген жағдайда:

Мезатона 1% раствор 0,5 - 1 мл в/м немесе т/а

Брадикардияда: атропин 0,1% - 0,5 – 1мл т/а

Коллапс- Коллапс жедел тамырлық жеткіліксіздігі, тамыр тонусының төмендеуімен, бас ми гипоксия белгілерімен және организмнің өмірге маңызды қызметтерінің төмендеуімен сипатталатын ауру.

Коллапс кез келген жағдайда әр түрлі инфекция (вирус, бактерия), улану (әсіресе сусызданумен байқалатын) гипер және гипогликемиялық комалар, бүйрек үсті безі қызметі жеткіліксіздігінен, пневмония, әртүрлі аурудың, уланудың терминальды сатысында пайда болады.

Коллапс кезінде АҚҚ төмендейді.

Клиникалық көрінісі. Науқастың жалпы жағдайы ауырлайды, бозарады, суық тер басады, еріннің көгеруі, дене температурасы төмендейді, есі кейде сопорозды күйде, кей жағдайда естен тану байқалады, тынысы жиілейді, тахикардия, жүректе күшейген шапалақ тондарын, веналық қан қысымы төмендейді, АҚҚ төмендейді осыдан аурудың ауырлық дәрежесін анықтауға болады.

Жедел жәрдем:

- Науқасты көлденен, жастықсыз жатқызып, керуеттың аяқ бөлігін көтеру
- Қысып тұрған киімдерін босату
- Таза ауамен қамтамасыз ету
- Науқасты жылыту: айналасына ыстық мұйық қою
- Мезатон 1% раствор 0,5 - 1 мл в/м немесе т/а (адреномиметик – тамырларды тарылтады) Ауруханаға жеткізу.

5.5. Оқыту және оқыту әдістері (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

5.6. Әдебиет. Соңғы бетте

5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер :

1. 28 жастағы науқас А. үйінде ауыр жағдайда табылды. Шағымдары: басының самай бөлігінің қатты ауырсынуы, басы айналуы, жүрек айнуы, құсуы, еңтігіп ауа жетіспеуі. Науқастың айтуы бойынша осы жағдай жұмыс орнындағы от жағатын жүйенің ақаулары салдарынан кейін дамығанын айтады. Науқаста дамыған шұғыл жағдайды анықтаңыз:

- көмір қышқыл газымен улану
- алкоголь сурағатымен улану
- гипертония
- гипотония
- тамақпен улану

2. Көшеден табылған науқас ессіз жағдайда. Ауызынан арақтың иісі шығады, бұлшықет тонусы төмендеген. Сөзге жауап қайтармайды. Бірінші кезектегі көмек:

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 42 беті

- A. -асқазанды шаю керек
 - B. -оксигенотерапия жасау
 - C. -антидот енгізу
 - D. -дезинтоксикационды терапия
 - E. -жасанды дем беру
3. Қанды көрген кезде науқас талып қалғанда орындалатын іс әрекет:
- A. -мүсәтір спиртті мақтаны иіскеуге беру
 - B. -басын көтеріп жатқызу
 - C. -науқасты горизонтальды жатқызу
 - D. -таза ауамен қамтамасыз ету
 - E. -тілдің астына нитроглицеринді салу
4. 30 жастағы әйел жерде ессіз жатыр. Тері қабаты сұр, цианозды. Жағы тырысқан, басы артқа шалқайған. Аяқ- қолы жартылай бүгілген, бұлшық еті тырысқан. Көз қарашығы екі жақтан кеңейген, жарыққа әсері жоқ. Қарағаннан кейін бірнеше секундтан соң, екі жақты бет бұлшық еті және аяқ-қолдың дірілі байқалады. Ауыздан қызғылт көпіршік ақты. Болжамды диагноз:
- A. -қояншық ұстамасы
 - B. -агональді жағдай
 - C. -клиникалық өлім
 - D. -истерия ұстамасы
 - E. -кома
5. Естен танған науқасқа жәрдем көрсеткенде...қалыпын беру керек.
- A. -аяқты көтерумен горизонтальды
 - B. -аяқтар бастан төмендеген
 - C. -жартылай отыру
 - D. -вертикальды
 - E. -горизонтальды
6. Зақымданған адам жерде отыр, жағдайы орташа, сирағының ортасындағы жараны көрсетеді. Жарасы терең, беттері тегіс емес, онда жер түйіршіктері және киім үзіктері көрінеді. Жарадан қошқыл түсті қан ағады. Бірінші кезектегі жасалынатын шара:
- A. жараны біріншілік өңдеу
 - B. қан қысымын өлшеу
 - C. жатқан жайда ошақтан эвакуациялау
 - D. асептикалық басатын таңғыш салу
 - E. бұлшық ет ішіне анальгетиктерді егу
7. Зақымданған адам арқасымен жатыр, көзі жұмулы, тынысы қиындаған, сирек, тері және шырышты қабықтары бозарыңқы, екі тізесі де зақымданған, көптеген кансыраған жаралар байқалады, екі тізесінің буындары сыртқа бұрылған, тамыр соғысы әлсіз пальпацияланады, жиі. Кенет көз алдыңызда жаралы адамның тынысы тоқтады. Дәрігерге дейінгі жасалынатын шара:
- A. жүрек- өкпе реанимациясын жүргізу
 - B. қолда затпен иммобилизациялау
 - C. бұлшық ет ішіне анальгетиктерді егу
 - D. тері астынан анатоксин енгізу
 - E. жатқан жайда ошақтан эвакуациялау
- 8.28 жастағы науқас А. үйінде ауыр жағдайда табылды. Шағымдары: басының самай бөлігінің қатты ауырсынуы, басы айналуы, жүрек айнуы, құсуы, енгігіп ауа жетіспеуі. Науқастың айтуы бойынша осы жағдай жұмыс орнындағы от жағатын жүйенің ақаулары салдарынан кейін дамығанын айтады. Емдік шараларды бірінші кезекте бастауға болады:
- A. науқасты таза ауаға шығару
 - B. өкпені жасанды желдендіру
 - C. науқасты тасымалдау

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 43 беті

- D. науқасты ауруханаға жатқызу
- E. өкпе-жүрек реанимациясын жүргізу

9.Егер электр тоғының сымы жерде жатқанда, электрмен жарақаттанған науқасқа қорғаныс құралдарынсыз ... жақындауға болады.

- A. табанды жерден алмай, жылжып
- B. жүгіріп
- C. тез жүріп
- D. үлкен адыммен, секіріп
- E. қадамдап жүріп

10.Зардап шегуші қозғалыссыз, сыртқы жағдайға назар аудармайды. Тынысы және білек артериясының тамыр соғысы жоқ. Ұйқы артериясында тамыр соғысы әлсіз байқалады. Жоғарғы тыныс жолдарын ашу мақсатында.Сафардың үштік әдісін қолдана отырып, тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін бірінші кезекте... .

- A. астыңғы жағын алға жылжытып аузын ашу керек
- B. басын биіктетіп ұстау керек
- C. басын артқа шалқайту керек
- D. жәбірленушінің ауыз қуысын қарап, тазалау керек
- E. ауа өткізгіш түтікше қою керек

Ситуациялық есеп

12 жастағы қызда тамырдан қан алу кезінде бозару, тершендік, оқушылардың кеңеюі байқалады. Содан кейін сананың жоғалуы.

Тапсырма:

1. Науқастың төтенше жағдайын анықтаңыз.
2. Дәрігерге дейінгі көмек алгоритмін жасаңыз.
3. Тері астына инъекция техникасын көрсетіңіз.

11-сабақ

5.1. Дәрістің тақырыбы: Ми қанайналымының жедел бұзылыстарында көмек көрсетудің принциптері.

5. 2. Сабақтың мақсаты:

- Қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету.
- Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету.

5. 3. Пәннің міндеттері:

Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету әрекеттерін орындау, өзінің рөлдерін, құқықтары мен лимиттерін түсіну, нормативтік – құқықтық актілерге және шұғыл көмек көрсету кезінде ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес өзінің іс-әрекеті мен әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті өзіне алуы, мейірбикелік күтімнің сапасын жақсарту үшін кәсіби қызметке шұғыл көмек көрсету кезінде басқару ережелерін ұстану.

5.4.Тақырыптың негізгі сұрақтары.

1. Ми қан айналым бұзылысы
2. Ишемия кезіндегі алғашқы көмек?

Ми қан айналымы бұзылуының екі түрі бар:

Ишемиялық – қан тамырының бітелуі. Көп жағдайда бұл жүректен шыққан тромб немесе атеросклеротикалық түйнек. Қан тамырындағы жарықшақ жабылып, қан түспеген соң, қорек жетпеген бас миының бөлігі өліп қалады.

Геморрагиялық – қан тамырының жарылуы. Соның салдарынан бас миына қан кетіп, бұл да бас миының бір бөлігінің өліп қалуына алып келеді.

Екі жағдайда да ауру үлкен қауіп төндіреді. Сондықтан шұғыл түрде дәрігерге жүгініп, жедел

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 44 беті

жәрдем шақыру керек.

Ми қан айналымы бұзылуының себептері: Бұл қауіпті аурудың себебі өте көп боулы мүмкін. Соның ішінде денсаулығында мынандай кінәраты бар адамдар қауіп жоғары топқа кіреді:

- A. гипертония;
- B. жүректің ишемиялық ауруы;
- C. қант диабеті;
- D. атеросклероз;
- E. артық салмақ.

Сонымен қатар науқастың үнемі күйзелісте болуы да ми қан айналымының бұзылуына әкеліп соғады.

Диагностикалық мүмкіндіктер

Цереброваскулярлық бұзылысты емдеу жәбірленушіге қандай диагноз қойылатынына байланысты. Патологияның өткір түрінде адамға шұғыл көмек көрсетіледі, содан кейін ол тексеріледі. Диагностика келесі зерттеулерді қамтиды:

1. Холестерин, глюкоза үшін қан сынағы.
2. Коагулограмма.
3. Қан қысымының өзгеруін күнделікті бақылау,
4. MMSE шкаласы арқылы нейропсихологиялық тестілеу.
5. Жатыр мойны аймағының рентгенографиясы, өйткені остеохондроз созылмалы немесе жедел цереброваскулярлық бұзылыстарды тудыруы мүмкін.
6. Төбе түбін зерттеу.
7. МРТ немесе КТ. Ұсынылған зерттеулер жүйке жүйесінің, қан тамырларының проблемалық аймақтарын табуға көмектеседі. Қабаттарда тек қатты емес, жұмсақ тіндер де қарастырылады. Томография ми құрылымдарының зақымдалуын ерте кезеңде анықтауға мүмкіндік береді.
8. Ми тамырларының ангиографиясы.
9. Контрастты затпен доплерографиялық ультрадыбыстық. Зерттеу қан ағымы баяулаған аймақтарды анықтайды.
10. ЭКГ. Мұндай зерттеу міндетті емес.
11. Энцефалография (өткізгіштікпен анықталады жүйке импульстары).

Цереброваскулярлық бұзылыс белгілері анықталса, дереу дәрігерге қаралу керек. Ол ағзаның жұмысын қалыпқа келтіру, мүгедектікке жол бермеу және өмір сүру сапасын жақсарту үшін ем тағайындайды.

Жәбірленушіге алғашқы көмек

Жедел жағдайдың дамуы кезінде ми қан айналымы бұзылған жағдайда зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету керек. Бұл неғұрлым тезірек жасалса, қалпына келтіру мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады.

Алдымен қан айналымының бұзылуының жедел екенін анықтау керек. Ол үшін жәбірленушіден күлімсіреп, екі қолын алға көтеріп, атын айтуын сұраңыз. Инсульт болған жағдайда ол мұны істей алмайды. Содан кейін болжамды диагнозды нақтылау үшін жедел жәрдем шақырылады.

Дәрігерлер келгенге дейін ауаны қамтамасыз ету үшін адамнан барлық тар киімдерді шешіп алу керек. Адам көлденең күйде болуы керек. Науқастың импульсін және тыныс алуын үнемі бақылау маңызды. Дәрігерлер келгенге дейін адамға таблетка беруге болмайды, себебі оның жағдайы одан да нашарлап, диагноз қою қиынға соғады.

5.5. Оқыту және оқыту әдістері (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

5.6. Әдебиет. Соңғы бетте

5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер :

1. 28 жастағы науқас А. үйінде ауыр жағдайда табылды. Шағымдары: басының самай бөлігінің

QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 45 беті

қатты ауырсынуы, басы айналуы, жүрек айнуы, құсуы, еңтігіп ауа жетіспеуі. Науқастың айтуы бойынша осы жағдай жұмыс орнындағы от жағатын жүйенің ақаулары салдарынан кейін дамығанын айтады. Науқаста дамыған шұғыл жағдайды анықтаңыз:

- A. -көмір қышқыл газымен улану
 - B. -алкоголь сурағатымен улану
 - C. -гипертония
 - D. -гипотония
 - E. -тамақпен улану
2. Ішке қан кету белгісіне...тән.
- A. -терінің бозаруы
 - B. -АҚҚ көтерілуі
 - C. -терінің қызаруы
 - D. -брадикардия
 - E. -экспираторлы еңтігу
3. Гематома – бұл...жиналуы.
- A. -қанның тіндерде
 - B. -қанның плевра қуысында
 - C. -қанның перикард қуысында
 - D. -қанның буын арасында
 - E. -қанның ішперде қуысында
4. Асқазаннан қан кетуге...тән.
- A. -кофе тәрізді құсу
 - B. -қан аралас құсу
 - C. -ауыздан көпіршікті қан шығу
 - D. -іштің тұйықталу дыбысы
 - E. -өтті құсық
5. Тромболитикалық дәрі-дәрмекке ... кіреді.
- A. варфарин
 - B. гепарин
 - C. тиклопедин
 - D. аналгин
 - E. промедол
6. Кеуде клеткасы қысылған науқасты...керек.
- A. -ішімен жатқызып, ауруды басатын дәрілер енгізу
 - B. -арқасымен жатқызып, ауруды басатын дәрілер енгізу
 - C. -вертикалды қалыпта отырғызу
 - D. -ауруды басатын дәрілер енгізу
 - E. -жартылай отыру қалпын беріп, ауруды басатын дәрілер енгізу
7. Жіті іш синдромында ... керек.
- A. -ішке мұз қойып, жедел ауруханаға жатқызу
 - B. -ауырсынуды басатын дәрі енгізу
 - C. -асқазанды жуу
 - D. -тазалау клизмасын жасау
 - E. -наркотикалық анальгетиктер енгізу
8. Естен танған науқасқа жәрдем көрсеткенде...қалыпын беру керек.
- A. -аяқты көтерумен горизонтальды
 - B. -аяқтар бастан төмендеген
 - C. -жартылай отыру
 - D. -вертикалды
 - E. -горизонтальды

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 46 беті

9. Ашық пневмоторакста... қойылады.

- A. -окклюзиялық байлам
- B. -фиксирленген байлам
- C. -қысып байлау
- D. -Дезо байламы
- E. -Вельпо байламы

10. Тіс дәрігері қабылдауына 57 жастағы ер кісі келді, бөлмеде кенеттен тұншығу ұстамасы басталды. Стол шетіне сүйеніп орындыққа отырды, беті – цианозды, үрейлі, кеудесі – бочка тәрізді. Экспираторлы енгізу, алыстан естілетін құрғақ, ысқырықты сырылдар. Осы жағдайда қолданылатын дәрі:

- A. -сальбутамол
- B. -папаверин
- C. -либексин
- D. -тусупрекс
- E. -анальгин

Ситуациялық есеп

Ес-түссіз 60 жастағы ер адамды үйге шақыру. Әйелінің айтуынша, есінен танудан бірнеше сағат бұрын ол қатты бас ауруы, бас айналу, жүрек айну, құсу туралы шағымданды. Бір күн бұрын алкогольді ішетін мереке болды. Анамнезінде-гипертония, жүйелі түрде емделмеген.

Объективті: байланыссыз, сөйлеу жоқ. Бет гиперемиясы, оқушылар екі жағынан да кеңейген, тең, жарыққа реакция жоқ, психомоторлы қозу. Тозақ 280/120 мм сын.бағ. ст., импульс минутына 120 соққы, тыныс шулы, терең, апноэ кезеңдері 5-10 секундқа дейін.

Тапсырма:

1. Науқаста дамыған төтенше жағдайды анықтаңыз.
2. Жедел жәрдем алгоритмін жасаңыз және әр кезеңді негіздеңіз
3. Көктамыр ішіне реактивті енгізу техникасын көрсетіңіз.

12-сабақ

5.1. Дәрістің тақырыбы: Қайғылы оқиғалар: электрожарақат, суға бату, странгуляциялық асфиксия, қызып кету, суық өтіп кету кезіндегі мейіргерлік күтім.

5. 2. Сабақтың мақсаты:

- Қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету.
- Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету.

5. 3. Пәннің міндеттері:

Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету әрекеттерін орындау, өзінің рөлдерін, құқықтары мен лимиттерін түсіну, нормативтік – құқықтық актілерге және шұғыл көмек көрсету кезінде ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес өзінің іс-әрекеті мен әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті өзіне алуы, мейірбикелік күтімнің сапасын жақсарту үшін кәсіби қызметке шұғыл көмек көрсету кезінде басқару ережелерін ұстану.

1.7. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

- 1) Суық өту кезіндегі шұғыл көмек?
- 2) Асфиксия түрлері?

Асфиксия – ағзада көмірқышқыл құрамы көбеюінен, оттегі жетіспеушілігімен сипатталатын жағдай

Оның себептері аурулар, уланулар (токсикалық асфиксия) және механикалық кедергілер
Механикалық асфиксия: Жіті өкпе тынысы, қанайналым және ми функциясы бұзылыстары;

Бірнеше минутқа созылған асфиксиялық жағдай өлімге әкеледі;

Асфиксия 5-6 минутқа созылады;

Жүрек бұлшық еттерде жіті оттегі жеткіліксіздігінен жүрек жиырылуы әлсірейді;

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы		044-80/11 ()
Әдістемелік нұсқаулық		64 беттің 47 беті

Өкпеден айдалатын қан бұзылысынан беттегі вена қанға толықсып, басқада ағзаларда қан айдалуы бұзылады

Асфиксияның жіктелуі 1. Жаншылудан болатын асфиксия

а) странгуляциялық (асылу, ілмекке, колмен буындыру)

б) компрессиялық (кеуде және іштің қысылуы)

2. Жабылудан болған асфиксия

а) обтурациялық (ауыз және мұрын жабу, ірі бөгде заттармен тыныс жолдарының бітелуі)

б) аспирациялық (себілетін заттармен, сұйық заттармен аспирация)

в) Тұншығу

Шектеулі жабық кеңістіктегі асфиксия

Асылу (странгуляциялық асфиксия)

Дененің барлық немесе жартылай дене салмағының ауырлық әсерінен мойынның ілмекпен қысылуы

Мойындағы ілмектің орналасуына байланысты толық, толық емес (түрегеп тұрғанда, тізе бүіп отырғанда) мойынға ілмектің орналасуына байланысты ауаның өкпеге жетіспеуі, тамырлардың, мойын нерв бағаналарының қысылуы

Ұйқы артерия қысылуы, мидағы оттегі жетіспеушілігіне әкелсе, мойылдырық көктамыр қысылуы бассүйегі ішінен қанның кері қайтуы бұзылып қысым жоғарлауына әкеледі. Бірнеше секундта ми қанға толып, 3-4 минутта ісіну дамиды. Нәтижесінде – естен тану, құрысу, еріксіз зәр шығару және дефекация болады

Асылу кезінде странгуляциялық жұлге із қалады

Алғашқы көмек

Тыныс жолдары өткізгіштігін жақсарту. Зардап шегушіні көтеріп тұрып мойынды ілмектен босату. Арқанды қиғаштап, мойынның жоғарғы бөлігінен кесіп алу. Ауыз қуысын сілекей, көбіктен тазалау (егер жұлын зақымданбаса)

Егер тыныс, жүрек соғысы сақталған құрысу болса науқасты жанымен жатқызу

Егер айқын құрысу басталған жағдайда тілін шайнау, қосымша жарақаттың алдын алу мақсатында денесін еденге басып ұстау, басын сүйеу. Құрысу ұзақтығы 5-6 минут созылады. Мойын тамырлары қысылуынан дамыған ми ісігі себептерін емдегеннен кейін өздігінше қайтады

Клиникалық өлім белгілері пайда болған кезде жүрек-реанимациясын бастау

Өкпені жасанды желдендіру, кеңірдек интубациясы.

Құрысу кезінде 2-4 мл реланиум немесе седуксен 2-4 мл 10-20 мл физиологиялық ертіндімен араластырып көктамырға енгізу.

Патогенетикалық ем (спазмолитиктер, диуретиктер, сода ертіндісі).

Суға бату

Бұл жабық тыныс жолдарына қандай бір сұйықтық енуіне байланысты дамитын механикалық асфиксияның бір түрі.

Суға бату ортасы судан басқа (тұзды немесе тұщы) батпақ, нефть, бояу, май, өндірістегі әртүрлі сұйықтықтар (пиво,).

Алғашқы көмек

Суға батудың бозғылт типінде бірден жүрек-өкпе реанимациясын бастаған жөн;

Суға батудың көк типінде тез тыныс жолдары-нан суды шығару. Науқасты құтқарушының бүгілген санына ішімен жатқызып, кеуде тұсы бүйір бетінен қысып, ұрғылап, (15-30 сек) қайта арқасымен жатқызу;

Ауыз қуысын сорғышпен тазалау (АДР-10), егер айқын ларингоспазм болса трахеостомия немесе коникотомия жасау. ЖӨР жасау;

Суға батқан науқастарда тыныс қимылы көрінсе, өкпе желденуі қалпына келді деп айтуға келмейді, сондықтан ӨЖЖ жалғастыру қажет.

Қалтырау болса құрғақ жылы одеялмен орау, грелка қою.

Электрожарақат

QONTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 48 беті

Тұрақты токты қабылдау шегі, денеге енуі 5-10 миллиампер (мА), ал тұрмыста қолданатын ауыспалы токтың қабылдау шегі (60 Гц) -1-10 мА.

0,05-0,1 ампер (А) күші бар ток адам өліміне әкеледі. Төменгі вольтті күйіктер жиі тұрмыста, ал жоғары вольтты күйіктер жиі өндірістерде кездеседі. Төменгі кернеулі электр тогы қарсылығы төмен жолдармен жүріп әсері тіндерге төмен, ал жоғарғы кернеулі ток қысқа жолдармен таралып, ауыр зақымдар тудырады

Электр тогы өткеннен кейін 2-3 минуттан кейін жүрек фибрилляциясы, жыпылықтағыш аритмия, коронарлы қантамырлар спазмы, тыныс бұлшық еттері, кеңірдек спазмы- асфиксияға алып келеді. Жалпы тоникалық тырысулар болады. Есін жоғалтады (қысқа уақыт немесе терең және ұзақ), цианоз, гипотония, сирек қантамыр спазмына байланысты артериалды қысым жоғарылайды. Жоғарыдағы белгілер жалған өлімге әкеледі (мнимая смерть). Күйіктің IV дәрежесін ажыратады. Ортасы шұңқырланған кішкентай некроз, қабыршақтардың жыртылуы оның шеттерінің буылтықтануы, кең көлемді IV дәрежелі күйікте күлдену болады.

Алғашқы көмек:

Зардап шегушіден электр ток көзін алып тастау.

Тоғы бар сымды арнайы ағаш сапты күрекпен, балтамен және басқа кесетін заттармен сымды кесіп тастау немесе науқасты киімінен ұстап суырып алу. Көмек көрсетуші өзін электр тогынан қорғау үшін: қолын құрғақ матамен орап, тақтайдың үстіне, резина қолғап кию, кілемшенің немесе ток өткізбейтін заттың үстінде тұрып өзін жерден бөлектеуі қажет.

Науқасты арқасына жатқызып, жалған өлім (мнимая смерть) кезінде ӨЖЖ және жүрекке жанама массаж жасау. 10% аммиак ерітіндісін иіскетуге, 1-2 мл кордиамин ертіндісін енгізу. Науқасты зеңбілмен тасымалдау.

Ыстық өту–сыртқы жылу факторлары әсерінен дамиды ағзаның жалпы ысуымен көрінетін патологиялық жағдай. Ыстық өту- температурасы мен ылғалдылығы жоғары бөлмеде ұзақ отыру, ыстық жерде ұзақ жүру, қапырық және ауа кірмейтін бөлмелерде физикалық жүктеме жасау, балаларды жылы көрпеге орау, қапырық бөлмеде ұстау әсерін тигізеді.

Науқастарда жалпы әлсіздік, бас ауыру, бас айналуы, құлағы шуылдау, ұйқышылдық, шөлдеу, дене қызуы 40-44° С дейін көтеріледі. Ауыр түрінде тынысы бәсеңдейді, тыныс Чейн – Стокс, АҚК төмендейді. Науқақта есеңгіреу, есін жоғалту, тырысу комаға түседі. Кейде сандырақтау, психомоторлы қозу, емшек жасындағы балаларда диспепсиялық көрініс (құсық, іші өтуі), дамиды. Ыстық және күн өтуі кезіндегі жедел көмек алгоритмі

Науқасты жылдам салқын бөлмеге шығару, таза ауаның кіруіне жағдай жасау.

Киімдерін шешу, суық су ішкізу, басына суық компресс (шап, қолтық аймақтарына) қою.

Сұйықтық жоғалтқанда, 300-500 мл натрий хлориді ерітіндісін көк тамырға енгізеді.

Тырысу және қозу кезінде бұлшық етке 2-4 мл седуксен енгізу.

Ауруханаға тасымалдау.

5.5. Оқыту және оқыту әдістері (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

5.6. Әдебиет. Соңғы бетте

5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер :

1. Суға батудағы жедел жәрдем:

- А. -асқазаннан суды шығару, өкпеге жасанды тыныс беру, жүрекке тікелей емес массаж
- В. -тыныс аналептиктері, өкпеге жасанды тыныс беру, жүрекке тікелей емес массаж
- С. -тыныс аналептиктері, асқазаннан суды шығару, өкпеге жасанды тыныс беру
- Д. -тыныс аналептиктері, наркотикалық анальгетиктер, жүрекке тікелей емес массаж
- Е. -асқазаннан суды шығару, наркотикалық анальгетиктер, өкпеге жасанды тыныс беру

2. Үсік кезінде бірінші дәрігерге дейінгі көмек көрсету барысында ... тыйым салынады.

- А. -үсік шалған жерді қармен ысқылауға
- В. -жылуды біртіндеп 40°С жоғарылатып пайдалануға

QAZAQSTAN RESPUBLIKASY QAZAQSTAN MEDICINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 49 беті

- C. -су киімдерін құрғақ киімдермен алмастыруға
- D. -аяқ-қолдарын белсенді жылытуға
- E. -ыстық шәй беруге

3. Тоңып қалған жәбірленушіге бірінші медициналық көмек көрсету кезінде ... дұрыс іс-әрекет деп саналады.

- A. -ваннада судың температурасын 20 °C –тан бастап біртіндеп жоғарылата отырып жылыту
- B. -ішінде 40 °C-тан жоғары температурадағы су бар жылытқыш қалтаны қою арқылы жылыту
- C. -жәбірленушінің үсіп қалған жерлерін қармен ысқылау
- D. -қыздыру мақсатында алкогольді ұсыну
- E. -жәбірленушінің үсіп қалған жерлерін спиртпен ысқылау

4. Электрожарақат кезінде иммобилизация ... жағдайда жасалады.

- A. -сынық болған
- B. -электробелгі болған
- C. -құрыспа ұстамасы болған
- D. -естен танған
- E. -жүрек тоқтап қалған

5. Жылу немесе күн сәулесінің соққысы кезінде, бірінші дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсетудің негізгі элементі:

- A. -жәбірленушіні суыту
- B. -ыстықты түсіретін дәрілер тағайындау
- C. -алкогольді сусындарды ұсыну
- D. -жәбірленушіні жылыту
- E. -асқазанды жуу

6. Суға батқан жәбірленуші, құтқарып алған соң, ес-түссіз жатса, ... тасымалдау керек.

- A. -ішімен жатқызып, зембілдің аяқ жағын көтеріп
- B. -арқасымен жатқызып, басын көтеріп
- C. -арқасымен жатқызып, зембілдің бас жағын төмен түсіріп
- D. -ішімен жатқызып, зембілді горизонтальді күйде ұстап
- E. -арқасымен жатқызып, зембілдің аяқ жағын көтеріп

7. Гараж шатырынан құлағаннан соң науқаста оң балтыр сүйегінің сынығы байқалады. Балтыр сүйегінің сынығы кезінде жедел көмек:

- A. -жансыздандыру, көліктік иммобилизациялау
- B. -жансыздандыру, жараны біріншілік хирургиялық өңдеу
- C. -жансыздандыру, сынықты салу
- D. -асептикалық таңғыш салу
- E. -шокқа қарсы терапия, асептикалық таңғыш салу

8. Электр сымы құлаған кезде электр тогымен зақымдалды. Есі жоғалған. Көкірек қуысы қозғалыссыз. Ұйқы артериясының соғысы тез, әлсіз. Оң қолының саусақтары күйген. Осы зардап шегушіге бірінші кезекте жүргізіледі:

- A. -электр тогының әсерін тоқтату
- B. -жүректің сыртқы массажы
- C. -жүрек тұсындағы соққы
- D. -өкпені жасанды желдендіру
- E. -жарақатты тазалау

9. Егер электр тогының сымы жерде жатқанда, электрмен жарақаттанған науқасқа қорғаныс құралдарынсыз ... жақындауға болады.

- A. -табанды жерден алмай, жылжып
- B. -жүгіріп
- C. -тез жүріп

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы		044-80/11 ()
Әдістемелік нұсқаулық		64 беттің 50 беті

D. -үлкен адыммен, секіріп

E. -қадамдап жүріп

10. Кеуде клеткасы қысылған науқасты...керек.

A. ішімен жатқызып, ауруды басатын дәрілер енгізу

B. арқасымен жатқызып, ауруды басатын дәрілер енгізу

C. вертикалды қалыпта отырғызу

D. ауруды басатын дәрілер енгізу

E. жартылай отыру қалпын беріп, ауруды басатын дәрілер енгізу

Ситуациялық есеп-1

Электр тоғымен соққы алған ер кісінің денесі туысқандарына жеткізілді. Жалпы қарағанда – терісі мұздай, боз, арқасында және төменгі аяқ – қолдарының беткейінде көгілдір дақтар анықталды. Тыныс алуы және ұйқы артерияларында пульсациясы жоқ, көз қарашығы кеңейген, фотореакциясы жоқ. Белоглазов симптомы оң мәнді.

Тапсырма:

1. Сіздің диагнозыңыз.

2. Сіздің ары қарай жүргізетін іс – шараларыңыз.

Ситуациялық есеп-2

Өзенге батып кетіп, жапа шеккен адамды «жедел жәрдем» бригадасы жеткізді. Бригада реанимациялық іс – шараларды сәтті жүргізген. Науқастың санасы анық қозғыш, қойылған сұрақтарға дұрыс жауап қайтарады. Тері қабаты бозарған. Тынысы терең, жиі, жөтел, шырышты қақырықтың бөлінуі. өкпеде қатаң тыныс, өкпенің барлық алаңында аз мөлшерде ылғалды және құрғақ сырылдар естіледі, ТАЖ минутына 28 рет. Жүрек тондары тұйықталған, тахикардия минутына 108 рет, АҚ 140/90 мм.сп.бб. Қан талдауында – гипонатриемия және басқа да электролиттердің төмендегені анықталды, гипопроотеинемия, бос гемоглобин, қан плазмасының осмотық қысымы төмендеген, ал несеп талдауында – гемоглобинурия.

Тапсырма:

1. Сіздің диагнозыңыз?

2. Қарқынды терапия бойынша сіздің шараларыңыз?

13-сабақ

5.1. Дәрістің тақырыбы: Аурудың ауыр түрімен ауыратын балаларға және олардың отбасыларына шұғыл көмек.

5. 2. Сабақтың мақсаты:

- Қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету.

- Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету.

5. 3. Пәннің міндеттері:

Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету әрекеттерін орындау, өзінің рөлдерін, құқықтары мен лимиттерін түсіну, нормативтік – құқықтық актілерге және шұғыл көмек көрсету кезінде ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес өзінің іс-әрекеті мен әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті өзіне алуы, мейірбикелік күтімнің сапасын жақсарту үшін кәсіби қызметке шұғыл көмек көрсету кезінде басқару ережелерін ұстану.

5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

1) Тағамнан улану кезінде көрсетілетін шұғыл көмек?

2) Демікпе кезіндегі шұғыл көмек?

Бала уланған кезде ата-ана оған қалай тез және тиімді көмек көрсету керектігін білуі керек. Ең жиі кездесетіні – **тағамнан улану**. Ол құрамында токсиндер немесе қоздырғыштар бар сапасыз өнімдерді пайдаланудан туындайды. Өнімдер жануар немесе өсімдік текті болуы мүмкін.

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 51 беті

Мысалы, саңырауқұлақтар, улы өсімдіктер, бұзылған тағамдар. Бұл мақалада кетудің себептері, белгілері, сондай-ақ осы ауруды емдеу, алғашқы көмек көрсету әдістері талқыланады.

Бала уланған кезде дер кезінде және тиімді көмек көрсету үшін белгілі бір алгоритмді нақты орындау керек. Тамақтан улану әдетте ішек инфекциясынан туындайды. Ол вирустар мен бактериялар тудыратын аурулардың үлкен тобын қамтиды. Басқаларға қарағанда сальмонеллез, дизентерия, кампилобактериоз, эшерихиоз, иерсиниоз сияқты инфекциялар жиі кездеседі. Ішекинфекциялар пациенттерге жасына қарамастан әсер етеді. Кішкентай баланың улану фактісімен жиі күресуге тура келеді.

Көп жағдайда балаларда кетуді өңдеу әдістерінің барлық түрлерінен кейін де қауіпті қасиеттерін сақтайтын улы саңырауқұлақтар тудыруы мүмкін. Сонымен қатар, улы өсімдіктер тіпті олармен немесе шырындарымен байланыста болса да, улануды тудырады.

Бала уланған жағдайда не істеу керектігін әрқашан білу маңызды. Бұл жағдайда ішек инфекциясына не себеп болғанын түсіну керек. Көбінесе балалар «лас қол ауруының» құрбаны болады. Бұл инфекцияны жұқтырудың ең оңай жолы - лас заттар немесе қолдар.

Эшерихиоз деп аталатын ішек таяқшасы қоздыратын ауру ашытылған сүт өнімдері - йогурт, айранға байланысты пайда болады. Стафилококктар жылы мезгілде торттар мен кремдерде белсенді түрде таралады, бұл тамақ инфекциясына да әкелуі мүмкін.

Сальмонеллез қоздырғыштары адам ағзасына ластанған тағам арқылы енеді. Көбінесе бұл лас жасыл немесе көкөністер, жұмыртқалар, тауық еті, шұжықтар, пісірілген шұжықтар. Иерсинияны жемістер мен көкөністерді басып өтетін кеміргіштер таратады, содан кейін адам оларды мұқият жумай, жұқтырған..

Қауіпті - баланың ағзасына тыныс алу жолдары, ас қорыту жүйесі немесе тері арқылы түсуі мүмкін улы заттармен улану.

Улы заттарды сарапшылар үш санатқа бөледі. Бірінші класқа ең қауіпті қосылыстар кіреді. Бұл саңырауқұлақтар, өсімдіктер, өнеркәсіптік уланулар, тұрмыстық химия, ауылшаруашылық препараттары, жануарлардың улары және улы газдар.

Қауіпті қосылыстар екінші класқа жатады - алкоголь, дәрілік заттар, шартты түрде жеуге жарамды саңырауқұлақтар мен өсімдіктер.

Үшінші класқа шартты қауіпті қосылыстар, соның ішінде жеуге жарамды саңырауқұлақтар, пестицидтермен дұрыс өңделмеген жағдайда қалдықпен ластанған жерде өсіргенде улы болып кететін улы емес өсімдіктер.

Іштің ауыруы, құсу және диарея уланудың жалғыз белгісі емес. Симптомдар интоксикацияны тудырған улы затқа байланысты. Егер құсу пайда болса, бала уланған, мен не істеуім керек? Мұны әрбір ата-ана білуі керек.

Алғашқы қадам - жедел жәрдем шақыру. Есіңізде болсын, жедел жәрдем қызметі кез келген пациентке қоңырауға жауап беруі керек медициналық сақтандыру полисі немесе басқа құжаттары бар-жоғына қарамастан Ресей аумағы. 911 нөміріне қоңырау шалған кезде, сізге қажетті кеңес алуға болатын улануды бақылау орталығына қосылуыңыз мүмкін.

Балалардағы демікпе классификациясы бойынша аллергиялық және аллергиялық емес болуы мүмкін. Олардың себептері біршама ерекшеленеді, бірақ көріністері бірдей. Балалардағы бронх демікпесінің атопиялық түрі аллергеннің ағзаға енуіне байланысты пайда болады.

Аурудың аллергиялық емес түрі аллергияға ұқсас дамиды, бірақ тексеру кезінде қоздырғыш факторларды анықтау мүмкін емес. Негізгі себептердің ішінде суық ауаны ингаляциялауды, күшті физикалық күш салуды, сондай-ақ өткір иістерді ингаляциялауды ерекше атап өту керек.

Кәдімгі аспирин тудыратын астмаға ерекше назар аудару керек. Бұл дәрі-дәрмекті қабылдағаннан кейін денеде белгілі бір процестер белсендіріледі, бұл бронхтың люменінің тарылуына әкеледі. Көбінесе мұндай ауру асқазан мен ішектің патологиясымен бірге жүреді. Шабуылдардың көпшілігі ауыррақ.

Балалардағы астманың клиникалық белгілері бағаланатын бірнеше түрлі дәрежелері бар. Жеңіл түрі шиеленісудің қысқа болуымен сипатталады, уақтылы емдегенде болжам айтарлықтай

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 52 беті

қолайлы.

Орташа ауырлықта айтарлықтай айқын симптоматология бар. Күндізгі шабуылдар күн сайын, ал түнгі шабуылдар аптасына бірнеше рет қайталанады. Оның барысында 3-ші топтағы мүгедектік беріледі, әсіресе қосымша белгілер байқалса.

Ауыр демікпешабуылдардың күндіз-түні қайталануымен сипатталады. Баланың ұйқысы мен белсенділігі қатты бұзылады. Ингаляция және дем шығару айтарлықтай қиын. Аурудың ағымының болжамы қолайсыз. 2-3 топтағы мүгедектік беріледі.

Негізгі симптомдар

Балаңызға көмектесу үшін сіз балаларда астманың қалай дамидынын және оның қалай көрінетінін білуіңіз керек. Бұл шабуылды жою үшін өз бетіңізше не істей алатыныңызды және шұғыл көмек қажет болған кезде анықтауға мүмкіндік береді. Алғашқы белгілердің арасында мыналарды ажыратуға болады:

- ауа жетіспеушілігі сезімі;
- көбінесе түнде пайда болатын жөтел;
- кеуде аймағындағы қысу сезімі;
- аллергиямен байланысқаннан кейін тыныстың қарлығы.

Демікпенің айырықша ерекшелігі – аурудың дамуының бастапқы кезеңінде дәріні қолданғанда барлық белгілер өте тез жойылады. Шабуылдың басталуына дейін балалардың көпшілігі өзгереді. Олар тым тітіркендіргіш және мазасыз, не летаргиялық және ұйқышыл болады. Біраз уақыттан кейін балалардағы бронх демікпесінің басқа белгілері қосылады, атап айтқанда:

- тыныс алудың қиындауы;
- шулы, қарлығып тыныс алу;
- кеуде аймағындағы ауырлық;
- пароксизмальды жөтел.

Бала отыруға, қолына сүйеніп, иығын сәл көтергенде шабуыл жеңілдейді. Бронх демікпесінің ағымын қалай тануға болады, әр ата-ана білуі керек, өйткені ауру болсажиі шабуылдармен бірге жүреді, бұл ішкі органдардың оттегі ашығуына әкеледі. Бұл дамудың кешігуіне әкелуі мүмкін.

Алғашқы көмек

Демікпе ұстамасы бар балаға алғашқы көмек көрсету өте маңызды. Оны тыныштандыру өте маңызды, өйткені психологиялық фактор шабуылдың дамуында өте маңызды рөл атқарады. Баланың барлық тар киімдерін шешіп алу керек, бөлмеге таза ауа кіру үшін терезені ашыңыз.

Балаға ингалятор немесе небулайзер, сонымен қатар «Эуфиллин» препаратын беріңіз. Сонымен қатар, қолдар мен аяқтар үшін жылы ваннаны жасаған жөн. Егер осы шаралардың барлығы 30 минут ішінде шабуылды тоқтата алмаса, жедел жәрдем шақыру керек, себебі бұл тыныс алуды тоқтатуға әкелуі мүмкін. Балалардағы бронх демікпесіне шұғыл көмек көрсету алдын аладықауіпті асқынулардың дамуы.

5.5. Оқыту және оқыту әдістері (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

5.6. Әдебиет. Соңғы бетте

5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер :

1. Көмір қышқыл газбен улану кезінде ауруханаға дейінгі көрсетілетін біріншілік көмек:

- A. -оксигенотерапия
- B. -коникотомия жасау
- C. -унитиолды енгізу
- D. -асқазанды жуу
- E. -трахеяның интубациясы

2. Тағаммен улану кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету барысында, бірінші кезекте ...

- A. -асқазанды жуады

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 53 беті

- В. -парэнтеральді дегидратация жасайды
 - С. -емдеу мекемесіне тасымалдайды
 - Д. -тұзды, іш жүргізетін дәрілерді тағайындайды
 - Е. -дене қызуын төмендететін дәрілерді тағайындайды
3. Қышқылдармен және сілтілермен уланған кезде асқазанды ... жуады.
- А. -бөлме температурасындағы сумен
 - В. -мұздай сумен
 - С. -бейтараптандыратын ерітінділермен
 - Д. -жылы сумен
 - Е. -4-5 стақан суды қолдану арқылы аз мөлшерден бастап
4. Жіті улану кездерінде дәрігерге дейінгі бірінші көмек көрсетудің негізгі қағидаларына ... тән.
- А. -ағзадан у қалдықтарын шығару
 - В. -тазалау клизмаларын жасау
 - С. -парентеральді дегидротация қолдану
 - Д. -ауырсынуды басатын дәрілерді қолдану
 - Е. -активирленген көмірді қолдану
5. Теріге улы зат түскен кезде ... қажет.
- А. -зақымданған аймақты ағын сумен жуу
 - В. -асептикалық таңғыш салу
 - С. -ылғалды сүлгімен сүрту
 - Д. -теріні спиртке малынған тампонмен сүрту
 - Е. -зақымдалған аймақты асептикалық ерітінділермен жуу
6. Ауруханаға дейінгі кезеңде, бірінші медициналық көмек көрсету барысында көздің ... бөгде затты алуға болады.
- А. -төменгі және жоғарғы қабақ астындағы
 - В. -көз алмасына енген
 - С. -көздің мүйізді қабығына енген
 - Д. -көздің алдыңғы камерасында
 - Е. -көздің конъюнктивальді кеңістігіне енген
7. Тырысуды басу үшін ... қолданылады.
- А. -реланиум
 - В. -эуфиллин
 - С. -гормондар
 - Д. -атропин
 - Е. -адреналин
8. Улану түрлеріне байланыссыз, психозды басу үшін ... енгізеді.
- А. -нейролептиктер
 - В. -анальгетиктер
 - С. -кортикостероидтар
 - Д. -инсулин
 - Е. -антигистаминдер
9. Уксус қышқылын ішкен науқасқа ауруханаға дейінгі алғашқы дәрігерлік көмек көрсету:
- А. -ауырсынуды басу, соңынан асқазанды зонд арқылы көп мөлшерлі сумен жуу
 - В. -спазмолитиктер енгізу
 - С. -асқазанды зонд арқылы көп мөлшерлі 2%-ды ас содасымен жуу
 - Д. -асқазанды зонд арқылы жумай, көп мөлшерде сілтілік ерітінді ішкізу
 - Е. -сұйықтық ішкеннен соң құсық шақыру
10. Ішке қан кету белгісіне...тән.
- А. терінің бозаруы
 - В. АҚҚ көтерілуі

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 54 беті

- C. терінің қызаруы
- D. брадикардия
- E. экспираторлы еңтігу

Ситуациялық есеп

"5 жастағы бала ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілді. Ұйқышылдық, тремор, сандырақ, атаксия. Қатты сілекей, қатты тер бар, лакримация, оқушылар тарылған, жүрек айну, құсу, мол сулы диарея. Тыныс алу, жөтел. Импульс минутына 55, мезгіл-мезгіл пайда болады бұлшықеттердің дірілдеуі, әлсіз құрысулар".

Тапсырма:

1. Уланудың клиникалық көріністеріне сәйкес оның этиологиясын анықтаңыз?
2. Жедел жәрдем шараларын көрсету керек пе?

14-сабақ

5.1. Дәрістің тақырыбы: Уланулар. Диагностика және шұғыл мейіргерлік күтім.

5. 2. Сабақтың мақсаты:

- Қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету.
- Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету.

5. 3. Пәннің міндеттері:

Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету әрекеттерін орындау, өзінің рөлдерін, құқықтары мен лимиттерін түсіну, нормативтік – құқықтық актілерге және шұғыл көмек көрсету кезінде ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес өзінің іс-әрекеті мен әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті өзіне алуы, мейірбикелік күтімнің сапасын жақсарту үшін кәсіби қызметке шұғыл көмек көрсету кезінде басқару ережелерін ұстану.

5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

- 1) Жасанды детоксикация?
- 2) Уланулар кезіндегі шұғыл көмек?

Улану – бұл адам немесе жануарлар организміне экзогенді химиялық немесе т.б заттардың түсу әсерінен ағзаның физиологиялық қызметтерін бұзатын, өмірге қауіп тудыратын патологиялық процесстер жиынтығы. Уланудың түрлері:

- Тамақпен улану
- Алкоголь және дәрілік заттармен улану
- Улы химикаттармен улану
- Газбен улану
- Қышқыл және сілтілермен улану

Жануартекті (ет, балық, шұжық, балық және ет консервілері, сүт өнімдері) бұзылған тамақты қабылдағанда тамақтық улану – **тамақтық токсикоинфекция** болады. Ауруды тамақ құрамындағы микробтар тудырады. Ол микробтар көбінесе тамақты әзірлегенде және азық-түлікті дұрыс сақтамағанда түседі.

Тамақпен улану кезіндегі алғашқы көмек

1. Алғашқы көмек жедел азқазанды зонд арқылы жуу немесе жасанды құстыру мақсатында тіл түбірін тітіркенгенше көп жылы су (1,5—2 л) беру керек .
2. Асқазанды таза суға дейін шаю керек. Өзі құсқанша көп су беру керек.
3. Науқастың ішегінен улы тамақты жою үшін карболен беру керек.
4. Белгілі бір тамақ өнімін беруге тыйым салынады, бірақ көп су ішкізу тағайындалады

Алкоголь және дәрілік заттармен улану. Дәрілік заттармен улану көбінесе балаларда кездеседі, дәрілерді қол жететін оңай жерге қойғаннан балалар көп уланады. Ал ересектерде байқаусыз передозировкада, суицидтік іс-әрекет кезінде және наркомандарда кездеседі. Өте жиі ұйықтатқыш

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 55 беті

заттарды қолданғанда болады (барбамил, ноксирон, нембутал және т.б.). Алкогольды шектен тыс қабылдағанда өлімге әкелуі мүмкін. Алкоголь жүрекке, тамырларға, АІТ-ге, бауырға және бүйрекке әсер етеді.

Алкоголь және дәрілік заттармен улану кезінде алғашқы көмек

1. Дәрігерді шақыру
2. Қандай зат қанша көлемде қабылдағанын, қанша уақыт өткенін анықтау.
3. Асқазанды жуу, көп су ішкізу. Морфин, кодеинмен уланғанда марганцовка ерітіндісін көп ішкізу, Анальгинмен уланса лимон қышқылы ерітіндісін қолдану.

Егер дем алуы бұзылса жасанды дем беру.

Қан айналу және дем алу тоқтаса жүрекке тікелей емес массаж және жасанды дем беру.

Улы химикаттармен улану. Дем алғанда ауа арқылы Ингаляциялық және тамақ арқылы эндогенді жолмен ағзаға тиофос, хлорофос және т.б заттар көп жағдайда түсіп зиянды әсерін туғызып жатады.

Улы химикаттармен уланғанда алғашқы көмек

Бұл кезде дәрігерге хабарлау керек немесе жедел стационарға тасымалдау керек.

Жедел 6-8 тамшы 0,1% атропин ерітіндісін беру керек немесе 1-2 таблетка белладон беру керек .

Егер дем алуы бұзылса жасанды дем беру.

Егер асқазан ішек жолына улы зат түссе белсендірілген көмір қосылған сумен шаю.

Улы заттарды тері және шырышты қабаттардан су ағынымен жуу арқылы кетіру керек.

Газбен улану. Улы газбен улану көп жағдайда газбен жұмыс жасайтын өнеркәсіптерде және желдетілмейтін орындарда болып жатады.

Газбен уланғанда алғашқы көмек: Ең бірінші таза ауаға алып шығып қысатын киімдерін шешіп ыңғайлы жағдайға келтіру керек.

Тыныс алу жоғалса жасанды дем беру керек.

Өте ауыр түрде уланған адамдар тез арада госпитализацияланады, оларда өкпе немесе жүйке жүйесінде ауыр асқыныстар орын алуы мүмкін.

Қышқыл және сілтілермен улану: Концентрацияланған қышқыл немесе сілтілермен уланғанда бірінші кезекте ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, асқазан кейде кеңірдектің өте ауыр түрде кең көлемді күйі болады, содан кейін өмірлік маңызды органдармен сіңірілуі арқылы қауіп төндіреді.

Қышқыл және сілтілермен улану кезінде алғашқы көмек: Қышқылмен улану кезінде өңеш немесе асқазанның перфорация симптомдары болмаса, жуан зондпен магний оксиді (20 г на 1 л жидкости) қосылған 6-10 л жылы сумен шаю керек.

Сілтімен улану кезінде асқазанды лимон немесе сірке қышқылы ерітіндісі қосылған 6-10 л жылы сумен жуу керек. Асқазанды жуу уланудан кейін алғашқы 4 сағат ішінде жүргізілуі керек.

Жасанды детоксикация. Жасанды детоксикация әдістері бізге ағзадағы токсиндік улы заттарды азайтуға мүмкіндік береді, ал кейде қажет кезде бауыр және бүйректің қызметін алмастыра алады. Жасанды детоксикацияға Интра- және экстракорпоральды детоксикация, гемодилюция, қан ауыстырып құю, плазмаферез, лимфорея, гемодиализ, ішастарлық және ішектік диализ, гемосорбция, гемофльтрация, плазмосорбция, квантты гемотерапия және т.б әдістер жатады. Осы әдістердің ішінен кейбірі қазіргі уақытта клиникалық токсикологияда (гемосорбция, гемодиализ, гемофльтрация, энтеросорбция, плазмосорбция) кеңінен қолданылады

5.5. Оқыту және оқыту әдістері (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

5.6. Әдебиет. Соңғы бетте

5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер :

1. Көмір қышқыл газбен улану кезінде ауруханаға дейінгі көрсетілетін біріншілік көмек:

- A. -оксигенотерапия
- B. -коникотомия жасау
- C. -унитиолды енгізу

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 56 беті

- D. -асқазанды жуу
 E. -трахеяның интубациясы
2. Ересек науқастың асқазанын зонд тәсілімен нәтижелі жуу үшін ... кем емес су қажет.
 A. -10 литрден
 B. -5 литрден
 C. -2 литрден
 D. -15 литрден
 E. -500 мл-ден
3. 28 жастағы науқас А. үйінде ауыр жағдайда табылды. Шағымдары: басының самай бөлігінің қатты ауырсынуы, басы айналуы, жүрек айнуы, құсуы, еңтігіп ауа жетіспеуі. Науқастың айтуы бойынша осы жағдай жұмыс орнындағы от жағатын жүйенің ақаулары салдарынан кейін дамығанын айтады. Науқаста дамыған шұғыл жағдайды анықтаңыз:
 A. -көмір қышқыл газымен улану
 B. -алкоголь сурағатымен улану
 C. -гипертония
 D. -гипотония
 E. -тамақпен улану
4. Көшеден табылған науқас ессіз жағдайда. Ауызынан арақтың иісі шығады, бұлшықет тонусы төмендеген. Сөзге жауап қайтармайды. Бірінші кезектегі көмек:
 A. -асқазанды шаю керек
 B. -оксигенотерапия жасау
 C. -антидот енгізу
 D. -дезинтоксикационды терапия
 E. -жасанды дем беру
5. Улану түрлеріне байланыссыз, психозды басу үшін ... енгізеді.
 A. -нейролептиктер
 B. -анальгетиктер
 C. -кортикостероидтар
 D. -инсулин
 E. -антигистаминдер
6. Уксус қышқылын ішкен науқасқа ауруханаға дейінгі алғашқы дәрігерлік көмек көрсету:
 A. -ауырсынуды басу, соңынан асқазанды зонд арқылы көп мөлшерлі сумен жуу
 B. -спазмолитиктер енгізу
 C. -асқазанды зонд арқылы көп мөлшерлі 2%-ды ас содасымен жуу
 D. -асқазанды зонд арқылы жумай, көп мөлшерде сілтілік ерітінді ішкізу
 E. -сұйықтық ішкеннен соң құсық шақыру
7. Зақымданған адам арқасымен жатыр, көзі жұмулы, тынысы қиындаған, сирек, тері және шырышты қабықтары бозарыңқы, екі тізесі де зақымданған, көптеген кансыраған жаралар байқалады, екі тізесінің буындары сыртқа бұрылған, тамыр соғысы әлсіз пальпацияланады, жиі. Осы кезеңінде дәрігерге дейінгі бірінші кезектегі жасалынатын шара:
 A. -бұлшық ет ішіне анальгетиктерді егу
 B. -тері астынан анатоксин енгізу
 C. -дәрі енгізу
 D. -қолдағы затпен иммобилизациялау
 E. -жатқан жайда ошақтан эвакуациялау
8. Зақымданған адам арқасымен жатыр, тері және шырышты қабықтары бозарыңқы, маңдайы салқын, дымқыл, демі жиі, сол қолында, шынтақтан жоғарырақ киімі жыртылған, алқызыл түсті қан атқылап аққан жара көрінеді. Зақымданған қозған, тұруға тырысады, қолының қызметі бұзылмаған. Бірінші кезектегі жасалынатын шара:
 A. -иықтың төменгі бөлігінде артерияны саусақпен қысу

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 57 беті

- B. -жгут салуы
- C. -асептикалық таңғыш салуы
- D. -жатқан жайда ошақтан эвакуациялау
- E. -тасымалдау алдында ыстық тәтті су беріп, жылыту

9.Зақымданған адам жерде отыр, жағдайы орташа, сирағының ортасындағы жараны көрсетеді. Жарасы терең, беттері тегіс емес, онда жер түйіршіктері және киім үзіктері көрінеді. Жарадан қошқыл түсті қан ағады. Бірінші кезектегі жасалынатын шара:

- A. -жараны біріншілік өңдеу
- B. -қан қысымын өлшеу
- C. -жатқан жайда ошақтан эвакуациялау
- D. -асептикалық басатын таңғыш салу
- E. -бұлшық ет ішіне анальгетиктерді егу

10.Зақымданған адам арқасымен жатыр, көзі жұмулы, тынысы қиындаған, сирек, тері және шырышты қабықтары бозарыңқы, екі тізесі де зақымданған, көптеген кансыраған жаралар байқалады, екі тізесінің буындары сыртқа бұрылған, тамыр соғысы әлсіз пальпацияланады, жиі. Кенет көз алдыңызда жаралы адамның тынысы тоқтады. Дәрігерге дейінгі жасалынатын шара:

- A. -жүрек- өкпе реанимациясын жүргізу
- B. -қолда затпен иммобилизациялау
- C. -бұлшық ет ішіне анальгетиктерді егу
- D. -тері астынан анатоксин енгізу
- E. -жатқан жайда ошақтан эвакуациялау

Ситуациялық есеп:

"Аурухананың терапия бөліміне жасындағы ер адам жеткізілді

23 жаста. Кешке ол қателесіп бірнеше жұтым сұйықтық ішті

тән иісі бар, бірден аузында қатты ауырсыну мен жану сезімі пайда болды,

өңеш, әр жұтылу және құсу кезінде күшейетін асқазан

қозғалыс. Сананың қатты шатасуы, ауыздың шырышты қабаты, жұтқыншақ ісінген, гиперемияланған, тығыз некротикалық тіндердің болуы, сілекей ағып, сілекей жұтылмайды. Тыныс алу қиын, ауыр жөтел, афония, цианоз. Тозақ 100/60 мм сын.бағ. пальпация кезінде асқазан ауырады, бауыр үлкейеді. Зәр т атомдық шиіе түсі, ақуыз, лейкоциттер, эритроциттер".

Тапсырма:

1. Уланудың клиникалық көріністеріне сәйкес оның этиологиясын анықтаңыз?
2. Жедел жәрдем шараларын көрсету керек пе?

15-сабақ

5.1. Дәрістің тақырыбы: Төтенше жағдай кезінде шұғыл мейіргерлік күтімді көрсетуді ұйымдастыру.

5. 2. Сабақтың мақсаты:

- Қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету.
- Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету.

5. 3. Пәннің міндеттері:

Шұғыл мейіргерлік көмек көрсету әрекеттерін орындау, өзінің рөлдерін, құқықтары мен лимиттерін түсіну, нормативтік – құқықтық актілерге және шұғыл көмек көрсету кезінде ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес өзінің іс-әрекеті мен әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті өзіне алуы, мейірбикелік күтімнің сапасын жақсарту үшін кәсіби қызметке шұғыл көмек көрсету кезінде басқару ережелерін ұстану.

5.4.Тақырыптың негізгі сұрақтары.

1. Қан кету кезіндегі алғашқы көмек?

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 58 беті

2. Күю кезіндегі алғашқы көмек?

Төтенше жағдай - мемлекетке төнген түрлі қауіпке байланысты елбасы немесе парламент жариялайтын уақытша режим. Ол табиғат апаты, соғыс қаупі, техногендік апат, халық ішіндегі толқу, т.б. жағдайларда жарияланады

Табиғи сипаттағы төтенше жағдай – дүлей зілзала (жер сілкінісі, сел, көшкін, су тасқыны және басқалар), табиғи өрт, індеттер мен малдың жұқпалы аурулары, ауылшаруашылық өсімдіктерінің және ормандардың кеселдері мен зиянкестері арқылы зақымдануын туғызатын Төтенше жағдайлар. Рихтер шкаласымен есептелінеді.

Техногендік сипаттағы төтенше жағдай - өнеркәсіп, көлік авариялары және басқа да авариялар, өрт (жарылыс), күшті әсер ететін улы, радиоактивті және биологиялық жағынан қауіпті заттарды тарататын (тарату қаупі бар) авария, үйлер мен ғимараттардың кенеттен қирауы, бөгендердің бұзылуы, тіршілікті қамтамасыз ететін электр-энергетика және коммуникация жүйелеріндегі, тазарту құрылыстарындағы авария туғызған төтенше жағдай.

Суға батқан кездегі алғашқы медициналық және дәрігерге дейінгі көмек

Суға батушыны судан ессіз күйде алып шыққан кезде, алайда тыныс алуы мен тамырлардың соғысы қанағаттарлық болса оны аяқтарын 40-50о–қа етбетінен көтеріп, мүсәтір спиртіні иіскетуге береді, аяқ – қол мен кеуде клеткаларын ысқылайды.

Суға батқан кезде немесе құтқарғаннан кейін бірден

естің қысқа уақытқа жоғалуы күрделі асқынуларды ықтималдығы туралы елеулі ескертулер екендігін есте сақтаған жөн. Зардап шегушіні бүйірлей жатқызған күйде алып кетеді.

Зардап шегушіні жанталас немесе клиникалық өлім жағдайында алып шыққан кезде реанимация шараларын кезектілігі төмендегіше болуы тиіс.

Ауызды, мұрынның қуыстарын құмнан немесе балшықтан тазарту;

Тыныс жолдары мен асқазаннан суды шығару;

Жасанды тыныс алдыру;

Қан айналымын қолдау;

Жоғары тыныс жолдарын босату мынадай ретпен жүргізіледі. Ауыз қуысын тез қарап шығып дәкі салфеткасы оралған сұқ саусақпен алынбалы протезді алады, ауызды сілекейден, балшықтан тазартады. Бұдан кейін таңдай қуысының бөгде заттармен кептелгендігін анықтау үшін саусақты сақтықпен қозғалтады.

Тыныс жолдары мен асқазаннан су мен көбікті шығару, суға батушыны етбетінен жатқызып оны құтқарушы аяғын бүгілген тізесіне тірейді және кеуде клеткаларын қысады, алайда бұл кезеңге бар-жоғы бірнеше секунд қана жұмсалуға тиіс.

Алғашқы көмек кезіндегі жасанды тыныс алдыру «ауызға-ауыз», «мұрынға-ауыз» әдістерімен жүргізіледі. «Ауызға-ауыз» әдісімен жасанды тыныс алдыруды зардап шегушіні қатты жерге шалқалай жатқызудан бастайды. Бір қолды мойынның астына, екінші қолды зардап шегушінің маңдайына қойып оның басын қысады сөйтіп тыныс жолдарына ауаның еркін өтуі үшін жағдай жасалады.

Маңдайдағы алақанның саусақтарымен ауаның шықпауы үшін мұрынды жабады. Көмек көрсетуші өзінің ауызымен зардап шегушінің ауызын толығымен жауып оның тыныс жолдарына ауаны қаттырақ үрлейді, содан кейін зардап шегушінің шамалы ауа шығаруына мүмкіндік береді.

«Мұрыннан ауызға» әдісін ем – дом жасау тәжірибесі болмаған жағдайларда, зардап шегушінің жағы қатты қысылған немесе жарақаттанған кезде қолданған дұрыс. Бұл жағдайларда мұрын жолдары бос болуға тиіс. «Мұрыннан ауызға» әдісімен жасанды демалдыруды жүргізу үшін мына әрекеттерді жасайды. Маңдайдағы қолмен басты артқа қарай бұрайды, екі – үш қолмен төменгі жақты жоғары көтеріп ауызды жабады. Ауызды сонымен қатар үлкен саусақпен де жабуға болады. Ауызды зардап шегушінің мұрнына қойып оған ауа үрлейді. Балаға жасанды тыныс алдыру кезінде ерінмен ауыз бен мұрынды қатар қамтиды.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы		044-80/11 ()
Әдістемелік нұсқаулық		64 беттің 59 беті

Ауаны ересектермен салыстырғанда азырақ үрлейді . Балалардың тыныс алу жиілігі минутына 18-20-дан аспауы тиіс.

Құрсақ төңірегінің қампайуы асқазанға ауаның барғанын көрсетеді . Алақанмен сырқаттың басы мен мойын жағына қарай іштің төңірегін аударып алақанмен сақтықпен қысады .

Сильвестр әдісі жиі қолданылады . Зардап шегушіні шалқалай жатқызып , кеуде клеткаларының төменгі бөлігіне бүктелген төсенішпен төсем қояды . Егер жасанды тыныс алдыруды екі адам жүргізсе , онда олар зардап шегушінің кеуде клеткасының екі жағына тізерлей отырады . Олардың әрқайсысы бір қолымен зардап шегушінің қолын иығының ортасына дейін апарады , ал екінші жолдарын саусақтың ұшына жоғарырақ тастайды . Олар бір уақытта зардап шегушінің қолын көтереді және оның басының артына қарай созады . осы арқылы кеуде клеткасы кеңейіп , ауаның кіруіне жол ашады . Бұдан кейін екі – үш секундтан соң зардап шегушінің қолын кеуде клеткасына қойып оны қысады, сөйтіп ауаны шығарады .

Мұз астына түсіп кеткендерге құтқару көмегін көрсету жолдары

• Зардап шеккен адамға көмек берер алдында құтқарушылар төмендегі ережелерді ұстануы керек:

- - жағадан мұзға түспес бұрын баратын жолды анықтап алу қажет;
- - тік жардан, шығып тұрған балдыр мен қамыс маңынан, жылы өндіріс сулары су айдынына ағатын жерлерден су айдынының үстіне шығуға болмайды.
- - қар қалың жапқан жерлерден айналып өту (ол жерлерде мұз жұқа болады), өзенге құятын сағалардан, ағысы қатты жерлерден айналып өту қажет;
- - жағадан мұз үстіне абайлап шығу, себебі екеуінің арасында жарық болуы мүмкін.

Улы газбен уланғанда жасалынатын көмек

Улы газбен уланғанда улы газдың келуін тоқтатыңыз; жапа шегушіні таза ауаға шығарыңыз; жатқызыңыз, тыныштандырыңыз да таза ауамен дем алдырыңыз (газетпен желпіңіз, желдеткіш немесе кондиционер қосыңыз);

Егер зардап шегуші есінен танған болса, жүрегіне жабық массаж жасаңыз және жедел жәрдем келгенше немесе есін жиғанша жасанды демалдырыңыз. Есіңізде болсын, зардап шегушіні қауіпті аймақтан шығару кезінде, алдымен өзіңіздің қауіпсіздігіңізді, өзіңіз уланып қалмауды ойлаңыз. Ол үшін тез қимылдау керек және қол орамал немесе дәкемен мұрынды байлап алу керек.

Қан кету кезіндегі алғашқы көмек

1) дененің зақымданған бөлігін кеудеге қатысты алған- да — көтеріңкі калыпта ұстау (аяқ-қол жараланғанда венадан қан кеткен кезде жараға қысып тұратын таңғыш салғаннан кейін жастық оралған киім кою);

2) кішігірім қан кету кезінде қысып тұратын таңғыш көмегімен зақымданған жерде қан ағып жатқан тамырды басу (жараны йодтың спиртті ерітіндісімен тазартқаннан кейін қалың мақта салынады да, бинтпен оралады);

3) аяқ-қолды мейлінше шұғыл бұту немесе жазу қалпында тұрақтандыру (иық алды немесе балтыр, табан жараланғанда, шынтак немесе тізе буынын бұту немесе жазу аяқ-қол жарасына қатты қан кеткенде жгут салу мүмкін болмағанда, қолды арқаға мейлінше созып, ал аяқты ішке бүгіп, тұрақтандыру).

1. **Иық алды жарасы кезінде** — артерияны иықтың ішкі жағынан басады;

2. **Балтырдан қан кеткенде** — тізе асты артериясын басады (бас бармақпен тізе буынын алдыңғы жағын ұстап, ал қалған саусақпен тізе асты шұңқырындағы артерияны тауып, сүйекке басады);

3. **Сан жараланғанда** — сан артериясының шап астын- дағы жоғарғы жағын жұдырықпен басады;

4. **Бастағы** жарадан қан кеткенде — жара жактағы самай артериясын басады (артерия құлақтың жанынан өтеді, оны тамыр соғысы арқылы анықтайды);

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы		044-80/11 ()
Әдістемелік нұсқаулық		64 беттің 60 беті

5. **Беттен** кан кеткенде — жақ артериясын басады (ол мойыннан бет пішіндеріне қарай жүреді және жақтың төменгі шеті арқылы оның бұрышы мен иек арасында иіледі);

6. **Мойындағы** жара кезінде — жара жақтағы жә-не одан төмен ұйқы артериясын басады (трахея жағында);

7. **Иық үстіндегі**, иық буынына жакын немесе колтык айналасындағы жара кезінде бұғана асты артериясын бұғана астындағы шұңқырға (бірінші қабырғаға) басады, кейін аяқ-қолға бұрау немесе жгут салады.

Сыну кезінде алғашқы көмек

Сыну кезінде алғашқы көмектің көрсетуінде ең маңыздысы дер кезінде зақымдалған шектілікке дұрыс иммобилизация, толық тыныштықты қамту, қимылсыздығы жатады. Бұнымен: қатерлі сезінулерді әлсірету және жарақаттық шокті дамытуды ықтималдықтың кішірейтуі; сынулардың ашық күйінделер пайда болуды қауіп-қатер және жара инфекциясының дамытуын кішірейту; жұмсақ кездемелер және ішкі органдардың қосымша бұзылуларын пайда болуды қауіп-қатердің кішірейтуі; сынуларды бітіп кету үшін қолайлы жағдайлардың жасалуына қол жетіледі. Көлік иммобилизациясы дөңгелектер арқасында іске асады. Дөңгелектер қатты және ыңғайлы материалдардан жасалады. Әдетте алғашқы көмекті көрсету кезінде дөңгелектерді қол материалдардан – тақтадан, таяктан жасайды.

Күю кезіндегі алғашқы көмек

Күю – бұл жоғары температура әсерінен (жалын, ыстық бу, қайнаған су) немесе кейбір химиялық заттар (қышқыл, сілті) нәтижесінде дененің кездемесінің зақымдалуы. Күйіктің ерекше пішіні – сәулеге күю (күн, радиация, рентген). Күю 4 кезеңге бөлінеді: 1 кезең – қызару және зақымданған жердегі терінің ісуі; белгілері бірнеше күн аралығында өтеді; 2 кезең - 1 кезеңдегі көрсетілген белгілерден бөлек сұйықтықпен толтырылған көбіршіктер пайда болады; белгілері бір немесе бір жарым күнде басылады; 3-кезең - күйген беттік қабатты қаптаған, барлық терінің жансыздануы; бірнеше апта аралығында жазылады; 4 кезең - терінің жансыздануы және сүйекке дейінгі жұмсақ кездеменің зақымдануы; жазылу өте баяу жүреді. Егер жарақаттану өрт кезінде болса, онда күйген теріге құрғақ іріңдетпейтін таңғышты қояды. Күйген дерді тазалауға және көпіршіктерді жаруға тыйым салынады.

5.5. Оқыту және оқыту әдістері (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

5.6. Әдебиеттер:

1. Медведев А.С., Основы медицинской реабилитологии, 2010 г.
2. В.М. Мухин. Физическая реабилитация. Киев, Олимпийская литература. 2011 год.
3. Мамандандырылған медбикелік күтімді ұйымдастыру: мед. колледждер мен училищелерге арналған оқу құралы. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015.
3. Морозова, Г. И. Медбикелік іс негіздері М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.
4. Мухина, С. А. "Мейірбикелік іс негіздері" пәнінен практикалық басшылық: медициналық училищелер мен колледждерге арналған оқу құралы - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014.
5. Қаныбеков, А. Медбикенің іс-әрекеттері: оқулық бағдарлама. - Алматы : Эверо, 2014.
7. Қаныбеков, А. Медбикеге арналған нұсқаулар : оқулық Алматы : Эверо, 2014.
- 6. Қосымша әдебиеттер**
7. Нурманова, М. Ш. Сборник стандартов сестринских технологий по дисциплине "Основы сестринского дела" [- Қарағанды ЖК "Ақнұр", 2013.
8. Нурманова М. Ш. "Мейірбике ісі негіздері" пәні бойынша мейірбикелік технологиялар стандарттарының жинағы. - Қарағанды : ЖК "Ақ Нұр", 2012.
9. Дәулетбаев, Д. А. Мейірбике манипуляциясы алгоритмдері (стандарттары) : оқу құралы . - Алматы : ТОО "Эверо", 2011.
10. Нурманова, М. Ш. Сборник стандартов сестринских технологий по дисциплине "Основы сестринского дела": сборник - 2-е изд., испр.и доп. - Қарағанды : ЖК "АқНұр", 2013.
11. Общие сестринские технологии: практикум / С. Т. Сейдуманов [и др.]; - Алматы : Эверо, 2012

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-80/11 () 64 беттің 61 беті

5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер :

- Суға батудағы жедел жәрдем:
 - асқазаннан суды шығару, өкпеге жасанды тыныс беру, жүрекке тікелей емес массаж
 - тыныс аналептиктері, өкпеге жасанды тыныс беру, жүрекке тікелей емес массаж
 - тыныс аналептиктері, асқазаннан суды шығару, өкпеге жасанды тыныс беру
 - тыныс аналептиктері, наркотикалық анальгетиктер, жүрекке тікелей емес массаж
 - асқазаннан суды шығару, наркотикалық анальгетиктер, өкпеге жасанды тыныс беру
- Буынның соғылуы және созылуы кезінде бірінші кезекте ... қолданады.
 - буын аймағын қысып, таңып байлау және емдеу мекемесіне жеткізуді
 - жарақаттанған буын аймағына мұздай басуды және уқалауды
 - ауырсынуды басатын дәрілерді және иммобилизациясыз тасымалдауды
 - жарақаттанған буынды уқалауды және емдеу мекемесіне жеткізуді
 - жарақаттанған буын аймағына мұздай басуды және иммобилизациясыз тасымалдауды
- Сынық кезінде бірінші дәрігерге дейінгі көмек көрсету барысында ... болады.
 - ауырсынуды басатын дәрілерді, сонымен қатар наркотикалық дәрілерді қолдануға
 - қажет жағдайда сүйек сынықтарын үйлестіруге
 - жараланған жерден сыртқа шығып тұрған сүйек сынықтарын орнына салуға
 - жәбірленушіні иммобилизациясыз тасымалдауға
 - гипс таңғышын салуға
- Сынық кезінде бірінші көмек көрсету барысында ... тыйым салынады.
 - жарақаттанған жерден шығып тұрған сүйек сынықтарын алып тастауға
 - шокқа қарсы іс-шараларды жүргізуге
 - жарақаттанған жерден шығып тұрған сүйек сынықтарын асептикалық таңғышпен жабуға
 - тасымалдау иммобилизациясын жүргізуге
 - қажетті жағдайда жгут салуға
- Сыныққа тән белгі:
 - сүйек сықыры
 - терінің көгеруі
 - ісіну
 - аяқ-қол қозғалысының шектелуі
 - ауырсыну
- Зақымданған адам жерде отыр, жағдайы орташа, сирағының ортасындағы жараны көрсетеді. Жарасы терең, беттері тегіс емес, онда жер түйіршіктері және киім үзіктері көрінеді. Жарадан қошқыл түсті қан ағады. Бірінші кезектегі жасалынатын шара:
 - жараны біріншілік өңдеу
 - қан қысымын өлшеу
 - жатқан жайда ошақтан эвакуациялау
 - асептикалық басатын таңғыш салу
 - бұлшық ет ішіне анальгетиктерді егу
- Зақымданған адам арқасымен жатыр, көзі жұмулы, тынысы қиындаған, сирек, тері және шырышты қабықтары бозарыңқы, екі тізесі де зақымданған, көптеген кансыраған жаралар байқалады, екі тізесінің буындары сыртқа бұрылған, тамыр соғысы әлсіз пальпацияланады, жиі. Кенет көз алдыңызда жаралы адамның тынысы тоқтады. Дәрігерге дейінгі жасалынатын шара:
 - жүрек- өкпе реанимациясын жүргізу
 - қолда затпен иммобилизациялау
 - бұлшық ет ішіне анальгетиктерді егу
 - тері астынан анатоксин енгізу
 - жатқан жайда ошақтан эвакуациялау
- 28 жастағы науқас А. үйінде ауыр жағдайда табылды. Шағымдары: басының самай бөлігінің

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы		044-80/11 ()
Әдістемелік нұсқаулық		64 беттің 62 беті

қатты ауырсынуы, басы айналуы, жүрек айнуы, құсуы, еңтігіп ауа жетіспеуі. Науқастың айтуы бойынша осы жағдай жұмыс орнындағы от жағатын жүйенің ақаулары салдарынан кейін дамығанын айтады. Емдік шараларды бірінші кезекте бастауға болады:

- A. -науқасты таза ауаға шығару
- B. -өкпені жасанды желдендіру
- C. -науқасты тасымалдау
- D. -науқасты ауруханаға жатқызу
- E. -өкпе-жүрек реанимациясын жүргізу

9. Мойын омыртқасы зақымданғанда транспорттық иммобилизация ретінде ... қолданылады.

- A. -мақта-дәкелік Дельбе жағасы
- B. -Крамер шендеуіші
- C. -Дитерихса құрсауы
- D. -айқасқан байламы
- E. -«Тақия» байламы

10. Бас сүйегінің негізі сынғандағы көрініс:

- A. -қан кету, мұрыннан және құлақтан ликвордың ағуы
- B. -қабақтың ісінуі
- C. -тері асты эмфиземасы
- D. -көрудің қосарлануы
- E. -тепе-теңдіктің бұзылысы

Ситуациялық есеп

Науқас С. тән белгілерге шағымданады жүрек айну, құсу, іштің қатты ауыруы, қатты тер, сілекей ағу, диарея (көбінесе қанмен араласады), көру қабілетінің бұзылуы, шөлдеу. Назад 30 мин. бұрын саңырауқұлақтар.

Тапсырма:

1. Улану үшін шұғыл шұғыл көмек?
2. Асқазанды шаю қажет пе?

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы		044-80/11 ()
Әдістемелік нұсқаулық		64 беттің 63 беті

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы		044-80/11 ()
Әдістемелік нұсқаулық		64 беттің 64 беті