

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 1 беті

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
«Оңтүстік Қазақстан Медицина Академиясы» АҚ жанындағы
медицина колледжі

Аудиториялық сабактар кешені

Пән атауы: «Анатомия, физиология»

Мамандығы: 09120100 - «Емдеу ісі»

Біліктілігі: 4S09120101- «Фельдшер»

Оқу түрі: күндізгі

Оқудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай

Циклдар мен пәндер индексі: ЖКП 04

Курс: 1, 2 курс

Семестр: I, III семестр

Пән/модуль атауы: «Анатомия, физиология» (Анатомия)

Көрітынды бақылау түрі: емтихан

Барлық сагаттардың/кредиттердің жалпы жүктемесі KZ- 240 сағат/10 кредит

Аудиториялық – 60

Симуляциялық – 180

OÝTÚSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 2 беті

«Анатомия, физиология» модулі бойынша «Анатомия» пәні аудиториялық сабактар кешенін өзірлеген:

«Морфологиялық пәндер» кафедрасының оқытушысы: Мамышева Д.Т.

Мамандығы: 09120100 - «Емдеу ісі», Біліктілігі: 4S09120101 - «Фельдшер» мамандығы бойынша оку жұмыс жоспарының негізінде өзірленген

«Морфологиялық пәндер» кафедрасының мәжілісінде қаралды және бекітілді хаттама № 1 «27» 08 2024 ж.

Кафедра менгерушісі Ералхан А.Қ.



OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 3 беті

№1 Теория

1. Тақырыбы: Анатомия пәні және міндеттері. Адам эмбриогенезінің бастапқы сатылары. Остеология. Тірек-қимыл аппаратының жалпы анатомиясы. Сүйек ағза ретінде. Сүйектің құрылышы және дамуы. Қаңқаның дамуы мен құрылышындағы әлеуметтік және биологиялық факторлардың орны.

Краниология. Бассүйектің жалпы анатомиясы және топографиясы. Адам бассүйегінің дамуы. Бет сүйектері: жоғарғы және төменгі жақсүйектер, әлпетсүйегі, мұрын, таңдай, төменгі мұрын астаушасы, кенсірік, тіласты және көз жасы сүйектері.

2. Мақсаты: Анатомия пәнін мақсатын және анатомиялық әдістерін үйрету. Сүйектің құрылышы және сүйектің дамуы. Сүйек жіктелуі. Қаңқаға, сүйектерге түсінік беру. Омыртқа бағанасы. Иық белдеуі, бұғана, жауырын, төс, қабыргалар. Қолдың еркін бөлігінің сүйектерінің құрылышы және жамбас белдеуі, аяқтың еркін бөлігінің сүйектеріне сипаттама беру. Білім алушыларға сүйектердің диагнозін, метафиз, апофиздерін көрсетіп және табуды үйрету. Бас сүйекке: ми сауытына және бет сүйектеріне жалпы сипаттама беру. Адам бассүйегі құрылышының жаистық, жыныстық, типтік ерекшеліктерін білім алушыға түсіндіру.

3. Теория тезистері:

Анатомия – адамның пішінін, құрылышын, пайда болуын, дамуын зерттейтін ғылым. Анатомия дененің ағзалары мен бөліктерінің, пішінің, жеке ағзалардың, оның конструкциясын, микроскопиялық құрылышын зерттейді.

Анатомия міндеттеріне эволюция процесі кезінде негізгі даму кезеңдерін зерттеп, әр түрлі жас ерекшеліктеріне қарай ағзалардың ерекшеліктерін, сыртқы орта жағдайларындағы адам организмінің дамуын зерттейді. Негізгі анатомия зерттеу әдістері ретінде бақылау, денесін тексеру, ашу, жеке ағзаның және ағза топтарын бақылау (микроскопиялық анатомия), олардың ішкі құрылышын (микроскопиялық анатомия), Анатомиямен эмбриология, цитология, физиология, гистология тығыз байланысты. Анатомияның зерттеу объектісі – организм болып табылады. Организм жекелеген дара құрылымдардан – бірінғай тұтас болып біріккен ағзалар, тіндер және тіндік элементтерден тұрады. Организмнің құрылымдық бірлігі – клетка болып табылады. Клеткалардың бірігуі-тіндер. Тіндер шектес, дәнекер, бұлшықет, нерв тіні болып бөлінеді. Ағза - өзіне тән құрылышы мен қызметі бар тарихи қалыптасқан әр түрлі тіндер жүйесі. Ағза өзіне ғана тән пішіні, құрылышы, атқаратын қызметі, дамуы мен организмдегі орны бар біртұтас түзіліс болып табылады. Кейбір ағзалар өз кезегінде түрлі тіндерден тұратын, құрылымы жағынан ұқсас көптеген түзілістерден құралған. Организмде бірқатар функцияларды атқару үшін бір ағза жеткіліксіз болады. Сондықтан ағзалар жынытықтары – жүйелер пайда болады. Құрылышы мен дамуы бірдей емес жекелеген ағзалар мен ағзалар жүйелері де ортақ қызметті атқару үшін біріге алады. Әртекті ағзалардың мұндай функционалдық бірлестіктерін аппарат деп атайды. Адам организмінің бір қызметі – жердің тарту күшін дененің әрбір қозғалысын өзгерту. Қозғалыс қызметінен басқа тірек-қимыл аппараты дененің жерге тірегі қызметін де атқарады, сондықтан да оны тірек-қимыл аппараты деп атайды. Тірек –қозғалыс аппараты пассивтік және активтік бөліктерден тұрады.

Бас сүйектің эволюциясы:

- - ми капсуласы
- - сезім мүшелеріне арналған капсула
- - висцералды (бет) бас сүйегі-жақ аппаратының пайда болуымен байланысты.

Мидың бас сүйегі алғаш рет сүтқоректілерде висцералды, алғаш рет самай-төменгі жақ буыны пайда болады. Қатты аспан тек приматтарда ғана бар.

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 4 беті

Жануарлармен салыстырғанда, адам висцералды бас сүйегі алдыңғы-төменгі орынға ие және мөлшерде азаяды, дәлірек айтқанда, ми бөлімі артады.

Осылайша, бас сүйектің функционалдық белгісі бойынша ми мен бетке бөлінеді. Олардың арасындағы шекара сызықпен көз үсті жиектері арқылы - қаңқалы сүйектен - қаңқалы доғадан - сыртқы есту жолына дейін өтеді. Ми мен бет сүйегінің арасындағы ара қатынас жасынан өзгереді: жана туған 1:1, 25 жаста 2:1.

Ми бас сүйегінің топографиялық принципі бойынша екі бөлікке бөлінеді:

- - бас сүйектің жынытығы
- - бас сүйектің негізі

Олардың арасындағы шекара сызықпен: сыртқы қайрау шығынқы жерден - жоғарғы ойық сызығымен - сосцеви тәрізді өсіндінің негізі арқылы - самай сүйегінің қаңқалы өсіндісі бойынша - сыртқы есту жолының жоғарғы шеті бойынша - салбырап тарағы бойынша - сына тәрізді және қаңқалы сүйектің тігісі бойынша - алдыңғы сүйегінің қаңқалы өсіндісі бойынша - көз асты шеті бойынша - мұрыншай тігісіне дейін өтеді.

Сүйектің дамуы бойынша:

- - бастапқы-күмбезді және бет сүйегін қалыптастырады
- - қайталама-бас сүйектің негізін қалыптастырады.

Бас сүйектің күмбезі темен сүйегін құрайды; мандай, желкелі, самай сүйектерінің қабыршағын; сына тәрізді сүйектің үлкен қанаттарының аспалы бетін құрайды.

Өз құрылымы бойынша олар тегіс. Сыртынан қуыс үсті бар, ол сүйектермен қуыс асты кеңістігінің көмегімен жалғанады, бұл ретте қуыс ұшы жіктердің бойымен сүйектердің шеттері бойынша тығыз өседі. Күмбез сүйектерінің ішкі қабырғасының рөлі-қатты ми қабығын құрайды. Сүйектің өзі екі пластинкадан тұрады - сыртқы және ішкі жинақы сүйек, ал олардың арасында кеуекті зат. Кеуекті заттың ұшығында Вена жүйесі бар дипломоэ - кеуекті зат-дипломды веналар бар. Сыртқы сүйек пластинка ішкі қалың, ал ішкі жұқа және нәзік - шыны тәрізді пластинка.

4.Иллюстрациялық материалдар: слайдтар, муляждар, планшеттер, қаңқа (бас сүйек).

5.Әдебиет: № 1 қосымшаны қараныз.

6. Бақылау сұрақтары (көрі байланысы)

1. Анатомияның пәні және міндеттері
2. Анатомиялық зерттеулердің әдістері
3. Органдар және органдар жүйесі тұралы түсінік
4. Тіндердің түрлери
5. Сүйектерді зерттеу ғылыми
6. Краниология.
7. Бас сүйегінің жалпы сипаттамасы.
8. Бас сүйектің анатомиясы және топографиясы.
9. Адам бассүйегінің дамуы.
10. Бет сүйектері: жоғарғы және төменгі жақсүйектер
11. Әлпетсүйегі, мұрын, таңдай, төменгі мұрын астаушасы, кеңсірік, тіласты және көз жасы сүйектері.

№2 Теория

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 5 беті

- 1. Тақырыбы:** Артросиндесмология. Сүйектердің қосылыстары туралы түсінік. Қосылыстардың дамуы. Сүйек қосылыстарының түрлөрі. Бас, тұлға сүйектер мен қол-аяқ сүйектердің қосылыстары. Қосылыстардың жасқа, жынысқа байланысты ерекшіліктері.
- 2. Мақсаты:** Бас сүйектердің қосылысы, тұлға сүйектері мен қол-аяқ сүйектердің қосылыстары. Қосылыстардың жасқа, жынысқа байланысты ерекшіліктерімен таныстыру.
- 3. Теория тезистері:**

Буындардағы сүйектердің буындық беттерінің конфигурациясына байланысты келесі қозғалыстар болуы мүмкін: фронтальды біліктің айналасында майысу (flexio) және жазу (extensio) болуы мүмкін.

Cagittal біліктің айналасында (adductio) және кері (abductio) болуы мүмкін.

Бойлық біліктің айналасында айналуы мүмкін (ortatio). Барлық біліктердің айналасында қозғалыс айналмалы деп аталады (circumductio).

а) жалғанатын сүйектер арасындағы саңылау жоқ сүйек тінінің үздіксіз қосылыстары. Үздіксіз немесе фиброздық қосылыстардың (articulationes fibrosae) үш түрі бөлінеді, оларға тесу, синдесмоздар және жіктер жатады:

б) синдесмоз (syndesmosis) талшықтары жалғанатын сүйектердің үстінде біріктірілген сүйек ұлпасымен ұсынылған. Синдесмоздарға сүйек аралық жарғақ жатады (membranae interosseae) және байламы (ligamenta). Сүйек аралық тесіктер тұтікті сүйектердің диафиздері арасында орналасқан. Сары байламдар омыртқа бағанаасында болады (ligamenta flava).

в) тігісте (sutura) жалғасқан сүйектердің шеттері арасында дәнекер тінінің шағын қабаты бар. Тігістердің келесі түрлері бар: жалпақ (sutura plana), тісті (sutura serrata) және қабыршақты (sutura squamosa);

г) үзік қосылыстар (articulationes synoviales) немесе буындар. Буынның күрделі құрылышы бар, оның пайда болуына шеміршекпен жабылған сүйектердің буын беті, синовиальды сұйықтықпен буындық қуысы, буындық капсула және қосалқы түзілімдер (буындық дискілер, менискалар, буындық еріндер) қатысады.

Буындық беттер (facies articulares) ең жиі бір-біріне сәйкес келеді (мысалы, буындық басы және буындық ойық).

Буынды шеміршек (cartilago articularis) үш аймақтан тұрады: терең (zona profunda), аралық (zona intermedia) және үстіңгі (zona superficialis). Ең жиі буын шеміршегі гиалинді шеміршекті ұсынады және қалындығы 6 мм дейін.

Буынды қуыс (cavum articulare) синовиальды сұйықтықтың аз мөлшері (synovia) бар және синовиальды мембранамен шектелген буын қапшығы.

Буын қапшығы (capsula articularis) екі қабатқа ие: Ишкі – синовиальды мембрана (membrana synovialis) – сыртқы – фиброзды мембрана (membrana fibrosa). Кейде фиброзды мембрана байламдарды нығайтады, буын сөмкесін, – қапшық байламы (ligamentae capsularia). Қапшықтан тыс орналасқан байламдар қапшықтан тыс деп аталады (ligamentae extracapsularia), қапшық ішінде (ligamentae intracapsularia). Буындық беттері сәйкес келмейтін жерлерде синовиальды мембрана қатпарлар түзеді (plicae synovialis).

Буын ерні (labrum articulare) буын бетін толықтырады және терендетеді, оның ілген бетінің шетінде орналасқан.

Буынды дискілері және менискілері (disci et menisci articulares). Дискілер тұтас пластинкалармен ұсынылған. Дискілер және менискілер араласып қозғалыс кезінде буын беткейлері беттесіп буын құрайды.

Синовиальды сөмкелер (bursae synoviales) буынды капсуланың сыртқы мембранасының бөлінген жерінде синовиальды мембрананың қорытылуы болып табылады;

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 6 беті

д) симфиздер (*sympysis*) немесе жартылай құыстар өтпелі қосылыстарға жатады; оларда жалғанған сүйектердің аз жылжыу мүмкін. Бұл қосылыс жамбаста, омыртқа бағанаасында (омыртқа аралық симфиздер) және кеудеде (кеуде тұтқасының симфиздері) бар.

4. **Иллюстрациялық материалдар:** слайдтар, муляждар, планшеттер, плакаттар, қаңқа.
5. **Әдебиет:** № 1 қосымшаны қаранды.
6. **Бақылау сұрақтары (көрі байланысы):**
 1. Сүйектердің қосылыстарының түрлері.
 2. Қосылыстардың дамуы.
 3. Қосылыстардың жасқа, жынысқа байланысты ерекшеліктері қандай?
 4. Үзілісті және үздіксіз қосылыстарды ата?

№3 Теория

1. **Тақырыбы:** Миология. Бұлшықеттің онтогенезде дамуы. Бұлшықеттердің қосалқы аппараттары. Бұлшықет биомеханикасы. Бұлшықеттердің жіктелуі.
2. **Мақсаты:** Бұлшықеттің онтогенезде дамуын түсіндіру. Бұлшықеттердің қосалқы аппараттарымен таныстыру. Бұлшықет биомеханикасы. Бұлшықеттердің қалай жіктелетінін атап беру.

3. Теория тезистері:

Бұлшық ет немесе бұлшық ет (лат. *musculus*-бұлшықет)-ағзаның сүйектерімен бірге, қысқартуға қабілетті тірек-қымыл аппаратының бір бөлігі. Эр түрлі әрекеттерді орындауға арналған: дene қозғалысы, қалпын сақтау, дауыс байламдарын қысқарту, тыныс алу. Бұлшықет серпімді, икемді бұлшық ет тінінен тұрады, ол өз кезегінде миоцит жасушалары (бұлшық ет жасушалары). Бұлшықеттер жүйке импульстерінің әсерінен қысқара алады. Бұлшықеттерге қарқынды жұмыс немесе жүктеме кезінде көрінетін шаршау тән.

Бұлшықеттер кеңістіктегі дene бөліктерін өзгертуге мүмкіндік береді. Адам кез — келген қымылдарды орындауды — моргание немесе құлімсіреу сияқты қарапайым қымылдардан бастап, зергерлердің немесе спортшылардың байқағанымызды жұқа және жігерлі қымылдарға дейін-бұлшықет ұлпаларының қысқару қабілетінің арқасында. Үш негізгі топтан тұратын бұлшықеттердің дұрыс жұмыс істеуіне ағзаның қозғалуы ғана емес, сонымен қатар барлық физиологиялық процестердің жұмыс істеуі де байланысты. Барлық бұлшықет тіндерінің жұмысын жүйке жүйесі басқарады, ол олардың бас және жұлын миымен байланысын қамтамасыз етеді және химиялық энергияның механикалық түрленуін реттейді.

Адам денесінде 640 бұлшықет бар. Ең кішкентай құлақта орналасқан ең кішкентай сүйектерге бекітілген. Ең үлкені-үлкен жамбас бұлшық еті, олар аяқтың қозғалуына әкеледі. Ең күшті бұлшық ет — уылдырық және шайнайтын. Адамның ең ұзын бұлшық еті — портняжная — жамбас сүйегінің алдыңғы жоғарғы қанатынан басталады (жамбас сүйегінің алдыңғы-жоғарғы бөліктері), спирале тәрізді алдыңғы бүйір арқылы бұрылады және үлкен жілік сүйегінің бұдырылығына (сирақтың жоғарғы бөліктері) сінірмен бекітіледі.

Бұлшықет түрі әртүрлі. Көбінесе аяқ-қолдарға тән веретен тәрізді бұлшықеттер және кең бұлшықеттер кездеседі — олар дененің қабырғаларын құрайды. Егер бұлшықеттердің жалпы сінірі, ал басы екі немесе одан көп болса, онда олар екі, үш немесе төрт басты деп аталады.

Бұлшықеттер мен қаңқа адам дenesінің пішінін анықтайды. Белсенді өмір салты, тенденстірліген тамақтану және спортпен айналысу бұлшық еттердің дамуына және май тінінің көлемін азайтуға ықпал етеді. Жетекші ауыр атлеттердегі бұлшық ет массасы дene салмағының 55-67% құрайды.

4. **Иллюстрациялық материалдар:** слайдтар, ағзалар муляжі, плакаттар, планшеттер.

<p>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 7 беті

5. Әдебиет:

6. Бақылау сұрақтары (көрі байланысы)

1. Бұлшықеттердің түрлерін ата?
2. Бұлшықеттің онтогенезде дамуын түсіндір.
3. Бұлшықеттердің қандай қосалқы аппараттары бар?
4. Бұлшықет биомеханикасы.
5. Бұлшықеттердің жіктелуі.

№4 Теория

1. Тақырыбы: Спланхнология. Ишкі ағзалар туралы ілімге кіріспе. Асқорыту ағзаларына жалпы шолу. Ауыз қуысы, тіл, тістер. Сілекей бездері. Таңдай, жұтқыншақ, Өңеш, асқазан құрылышы, топографиясы, қызметтері. Ишектер топографиясы, бөліктегі, қабырғаларының құрылышы. Бауыр, ет қабы, үйқы безі, топографиясы, құрылышы, қызметі. Ишастар туралы түсінік. Иш астардың іш қуысындағы бөліктеге сай жолы /жүрісі/ мен топографиясы.

2. Мақсаты: Асқорыту жүйесіне түсінік беру, іш қуысының ағзаларының топографиясын беру. Білім алушыларға асқорыту жүйесінің анатомиялық құрылымын табуды үйрету. Ишкі ағзалардың, асқорыту жүйесінің құрылышын және қызметік ерекшеліктерімен таныстыру.

3. Теория тезистері:

Ишкі ағзалар viscera splanchna деп негізінен дene қуыстарында (кеуде, іш, жамбас астауында) орналасқан ағзаларды айтады. Оған асқорыту, тынысалу және несеп жыныс жүйелері жатады. Ишкі ағзалар зат алмасуға қатысады, тек көбею қызметін атқаратын жыныс ағзалары ғана оған жатпайды.

Асқорыту жүйесі, systema digestorium тағамды механикалық және химиялық жолмен өндеп, тамақтың өндөлген бөліктегін сініріп, қалған бөліктегін сыртқа бөліп шығаратын ағзалар кешені болып табылады. Адамның асқорыту жолының ұзындығы 8-10 м және ол ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, асқазан, жіңішке ішек және тоқ ішек деген бөлімдерге бөлінеді.

Жұтқыншақ, pharynx асқорыту тұтігі мен тынысалу жолдарының бір жағынан мұрын мен ауыз қуысы, екінші жағынан өңеш пен көмейдің арасындағы байланыстыруышы бөлік болып табылады. Ол бассүйек негізінен VI-VII мойын омыртқаларына дейін созылады. Жұтқыншақтың ішкі кеңістігін жұтқыншақ қуысы, cavitas pharyngis, құрайды. Жұтқыншақ мұрын мен ауыз қуыстары және көмейдің артында, шүйденің базилярлы бөлігінің және жоғарғы мойын омыртқаларының алдында орналасқан. Жұтқыншақтың алға қарай орналасқан ағзаларға сәйкес оны үш бөлікке бөледі: pars nasalis, pars oralis және pars laryngea. Жұтқыншақтың бассүйек негізінде жанаса жатқан жоғарғы қабырғасы – күмбез, fornix pharyngis деп аталады.

Асқазан Ventriculus (gaster) – асқорыту жолының қалтатәрізді кеңейген жері болып табылады. Асқазанда өңеш арқылы өткен тамақ жиналып, асқорытудың бірінші сатылары өтеді; тамақтың қатты бөліктегі сүйық немесе ботқатәрізді қоспаға айналады. Асқазанда алдыңғы қабырға мен артқы қабырғаны ажыратады.

Асқазанның жоғарғы және оңға қараған ойыс жиегі – кіші иіні, ал төмен және солға қараған дөненс жиегі – үлкен иіні, curvatura ventriculi major деп аталады. Кіші иінінде, кіреберістен гөрі шығаберіске жақындау жерде бұрыштық тілік, байқалады, ол жерде кіші иіннің екі бөлігі сүйір бұрыш, жасай түйіседі.

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 8 беті

Жіңішке ішек Intestinum tenue осыдан ішектің шырышты қабығының қабынуы басталып, өз жолында бірнеше қатар ілмектерізді иілімдер жасап, тоқ ішектің басталатын жерінде аяқталады. Ерекк мәйіттерінде жіңішке ішектің ұзындығы шамамен 7м, әйелдердікінде – 6,5м, ол дene ұзындығынан 4,1 есе асып түседі. Өлгеннен кейін бұлышықеттер босайтындықтан, мәйіттерде ішек тірі адамға қарағанда әр уақытта ұзындау келеді.

Тоқ ішек Intestinum crassum (жуан ішек) жіңішке ішектің шетінен артқы тесікке дейін созылып, мынадай бөліктеге болінеді: 1) құрттараңызда өсіндісі бар соқыр ішек; 2) жоғарылаған жиек ішек; 3) көлденең жиек ішек; 4) төмендеген жиек ішек; 5) сигматәрізді ішек; 6) тік ішек; Бауыр, hepar, көлемді безді ағза болып табылады (массасы 1500г-ға жуық). Бауырдың кызметі әр алуан. Ол ең алдымен шығару түтігі арқылы он екі елі ішекке келетін өт түзететін үлкен ас қорыту безі болып табылады. Бауырда екі бет көк жиекті ажыратылады. Жоғарғы немесе дәлірек айтқанда алғы-жоғарғы, көкеттік бет, facies diaphragmatica, жанасып жатқан көкеттің ойысына сәйкес дөңесті келеді; төменгі вицеральды беті, facies visceralis, төмен және артқа қараған және онда өзі жанасатын ішкі ағзаларынан пайда болатын бірқатар батыңқы жерлер бар. Жоғарғы және төменгі беттерді үшкір төменгі жиек, margo inferior, бөліп тұрады.

Бауырда екі үлесті ажыратады: он үлес, lobus hepatus dexter, және кішілеу сол үлес, lobus hepatus sinister, бұлар көкеттік бетте бір-бірінен бауырдың орактәрізді байламымен, lig.falciforme heratis, бөлінген. Бұл байламның бос жиегінде тығыз фиброзды тәж- бауырдың жұмыр байламы, lig.teres hepatis, жайғасқан, ол кіндіктен, umbilicus, бастап созылып, бітіп кеткен кіндік венасы, v.umbilicalis, болып табылады. Жұмыр байлам бауырдың төменгі жиегі арқылы иіліп өтіп, тілік, incisura ligamentum teretis, түзіп, бауырдың вицеральды бетіндегі сол жақ бойлық жүлгеге жайғасады, бұл жүлге бауырдың осы бетіндегі оның оң жақ және сол жақ үлестерінің шекарасы болып табылады. Жұмыр байлам осы жүлгениң алдыңғы бөлімін-fissura ligamenti teretis алып жатады. жүлгениң артқы бөлімінде жіңішке фиброзды тәж-ұрықтық кезеңде жұмыс істеген, бітелген веналық түтік, ductus venosus, түріндегі жұмыр байламының жалғасы жатады. жүлгениң бұл бөлімі веналық байламының саңылауы, fissura ligamenti venosi, деп аталады.

Үйқыбез, pancreas, аққазан артында region epigastrica-да артқы іш қабырғасында жатады, сол бөлігімен сол жақ қабырға астына еніп тұрады. Артқы жағынан төменгі құыс венаға, сол жақ бүйрек венасы мен қолқаға жанасып жатады. Үйқы безінің басы-сары pancreatic, ілмек тәрізді өсіндісі, processus uncinateus және денесімен, corpus pancreatic, құйрық, cauda pancreaticis, деп бөлінеді. Бездің басы он екі елі ішекпен қамтылып, I бел омыртқа мен II бел омыртқаның жоғарғы бөлігі деңгейінде орналасқан.

Ішастар, peritoneum, тұйық сірлі қап болып табылады, ол тек әйелдерде ғана жатыр түтігінің өте кішкентай іштік тесігі арқылы сыртқы орт амен қатынасады. Кез келген сірлі қап сияқты ішастар екі қабырғалық, peritoneum parietale, және вицералды, peritoneum жапырақшалардан тұрады. Біріншісі іш қабырғасын астарлайды, ал екінші жапырақша ішкі ағзаларды жауып, біраз жер бойы немесе түгелімен олардың сірлі қабығын түзеді. Екі жапырақша бір-бірімен тығыз жанасып жатады, ашылмаған іш құысындағы олардың арасында, ішастар құысы, деп аталатын тар саңылау ғана жатады, ондағы сұйықтық шамалы мөлшерде, сол арқылы олардың бетін ылғалдан, жылжыуын жеңілдетеді. Операция кезінде, немесе, мәйітті ашқанда, немесе зиянды (патологиялық) сұйықтық жиналғанда екі жапырақша ажырайды да, ішастар құысы азды-көпті көлемді құысқа айналады.

4. Иллюстрациялық материалдар: слайдтар, ағзалар муляжі, плакаттар.

5. Әдебиет: № 1 қосымшаны қарандыз.

6. Бақылау сұрақтары (көрі байланысы)

1. Ишкі ағзаларға анықтама беріңіз

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>	<p>№ 81-11-2024 28 беттің 9 беті</p>
<p>«Морфологиялық пәндер» кафедрасы</p>		
<p>«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені</p>		

2. Асқорыту жолының бөлімдерін атаңыз
3. Ішастар және оның туындыларына сипаттама беріңіз
4. Асқорыту жолының қабырғаларына сипаттама беріңіз.
5. Асқазанға сипаттама беріңіз
6. Жіңішке ішекке сипаттама беріңіз 7. Жуан ішекке сипаттама беріңіз
- 8 Бауырға сипаттама беріңіз
9. Ұйқыбезіне сипаттама беріңіз

№5 Теория

1. **Тақырыбы:** Тыныс алу ағзаларына жалпы шолу. Сыртқы мұрын. Мұрын қуысы. Көмей, кенірдек. Бронх: құрылышы. қызметтері. Өкпе құрылышы, қызметті, топографиясы, қызметі. Көкірек аралық. Өкпекап.
2. **Мақсаты:** Тыныс алу жүйесі ағзаларына жалпы сипаттама беру: сыртқы мұрынға, мұрын жанындағы қойнаулар, көмей, кенірдек, бронхтар, өкпе, өкпекап оның қойнаулары құрылышы және қызметі. Тыныс алу жүйесінің құрылыштық ерекшеліктерін, дамуын оқып білу.

3. Теория тезистері:

Тыныс алу жүйесі *systema respiratorium* - тыныс алу жолы және тыныс алу ағзалары деп бөлінеді. Тыныс алу жолдары өз кезінде жоғарғы тыныс жолдары (мұрын қуысы, мұрын жұтқыншақ, ауызжұтқыншақ) және төменгі (көмей, кенірдік, басты бронхтар және өкпешілік бронхтар). Тыныс алу жолдары өзінің қабырғасы шеміршек негізінен тұрады, ол ауаны жақсы өткізу үшін септігін тигізеді. Тыныс алу ағзаларына өкпе жатады, ол жерде газалмас болады.

Өкпенің дамуы 3 аптаның құрсақшілік дамуында бірінші ішекте эктодермалық текті өсінді пайда болады. Энтодермалық өсіндіде бүкіл тыныс алу жолдарынан шырыш қабығы дамиды. Спланхноплеврадан басты шеміршек дамиды, бронхтардың бұлшықеттері, дәнекер тін 5 аптада өсінді ұзарып, екі көпіршікке бөлінеді – бұл өкпе бүйректері. Оң өкпе бүйрекі үш бронхқа бөлінеді, сол-екі бронхқа бөлінеді. Оң жағынан өкпенің үш үлесі, сол жақтан - өкпенің екі үлесі пайда болады.

4. **Иллюстрациялық материалдар:** слайдтар, муляждар, планшеттер, плакаттар.

5. **Әдебиет:** № 1 қосымшаны қараңыз.

6. Бақылау сұрақтары (көрі байланысы):

1. Тыныс алу ағзаларын атаңыз?
2. Балаларда жоғарғы тыныс алу жолдарында қабыну процесі жиі жүре ме?
3. Бронх ағашы және альвеолалық ағаш қандай қызмет атқарады?
4. Өкпе қалай дамиды?
5. Жоғарғы тыныс алу жолдарына не жатады
6. Төменгі тыныс алу жолдарына не жатады

№6 Теория

1. **Тақырыбы:** Несеп жүйесінің анатомиясы. Бүйрек, топографиясы, қызметті. Эйел және ерек жыныс ағзалары.
2. **Мақсаты:** Несеп ағзалары және жыныс жүйесінің құрылышын және қызметтік ерекшеліктерін оқып білу. Бүйректің анатомиялық сипаттамасына түсінік беру. Білім алушыларға несеп ағзаларының анатомиялық құрылымын табу және көрсету.

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>«Морфологиялық пәндер» кафедрасы</p>	<p>№ 81-11-2024</p>
<p>«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені</p>	<p>28 беттің 10 беті</p>

Ерек және әйел жыныс ағзаларының, топографиясы, құрылышымен таныстыру. Жастық ерекшеліктері мен функциональдық маңызын түсіндіру. Аралық бұлшықеттері мен фасцияларын көрсету. Жыныс жүйесінің қызметтік ерекшеліктерін оқып білу.

3. Теория тезистері:

Несеп – жыныс жүйесі, systema urogenitale несеп ағзаларын, жыныс ағзаларын біріктіреді. Бұл ағзалар өзінің дамуы жағынан бір-бірімен тығыз байланысқан және сонымен бірге олардың шығару өзектері не үлкен бір несеп-жыныс түтігіне бірігеді (еркектердегі үрпі жолы), не бір ортақ қеңістікке ашылады (әйелдердегі қынап кіреберісі).

Несеп ағзалары, біріншіден екі безден (бүйректер, олардың экскреті - несеп) және екіншіден, несепті жинап, шығаруға арналған ағзалардан (несепағар, несеп құығы, несеп шығарғыштан) тұрады.

Несеп жыныс жүйесі организмнен өмір сұру қызметінің нәтижесінде бөлінген өнімдерді, ыдырау заттары – ақуыз молекулаларын, тұз және басқа заттарды сыртқа шығараты. несеп ағзалары – бүйректерден несеп жинап және шығаратын ағзалар – несепағар, несепқуық, несеп шығаратын өзектен тұрады.

Бүйрек дамуы ұзақ жол өтеді және бір ағзаның құрделенуі болмайды, а генерация болып ауысады, сосын үшінші бұл бүйрек алды (пронефroz), біріншілік бүйрек (мезонефро), соңғы бүйрек (метанефroz).

Несеп жыныс жүйесінің даму құрделілігі әр түрлі ауыткуларға әкеп соктырады, жиі кездесетін: бүйрек санының ауытқуы (бір, үш бүйректің болмауы), орын ауыстыру ауыткулары (жамбас, мықын, торакальді бүйрек), арақатынас ауыткулары (несепағар эктопиясы ішекке, жыныс жүйесінің ағзаларға), құрылымдық ауыткулар (бүйрек поликистозы).

Бүйректің құрылымдық-қызметтік бірлігі нефрон болып табылады – бұл құрделі несеп экскрет болып табылады және улы, қалдық заттарды организмнен шығару болып табылады. Бұл қызметті несеп шығару қызметін бүйректің экскреторлы ағашты құрайды – кіші тостағаншалары, үлкен тостағаншалары, тұбегі несепағар.

Бүйрек сонымен қатар инкремт бөледі – ренин, артериялық қысымды көтеретін.

Бүйрек гипертониясы сонымен байланысты.

Жыныс ағзалары еркектікі, әйелдікі болып бөлінеді. Ерек жыныс ағзалары құрамына қабықшаларымен қоса аталақ бездер, шәүхет қуықшаларымен бірге ұрық шығаратын өзектер, қуықасты безі, бульбоуретральды бездер, кеуекті денелерден тұратын жыныс ағзасы жатады. Әйел жыныс ағзалары екі бөлімнен тұрады: 1) жамбасастауында орналасқан ішкі жыныс ағзалары – аналық бездер, жатыр тұтікшелері, жатыр, қынап және 2) сыртынан көрінетін бөлім – сыртқы жыныс ағзалары, бұған үлкен және кіші жыныс еріндері, клитор, қыздық перде жатады.

Жыныс жүйесінің ағзалары көбею, сонымен қатар ұрпақ шығару қызметін атқарады. Көбею әйел және ерек жыныс жасушаларының бірігуінен болатын, ұрықтандыру, соңғы нәтижесінде организмге жаңа бастама береді.

Жыныс бездері клеткаларынан, аналық - әйел, сперматозоид – ерек организмдеріне бастама береді.

Аталақ без дамуының ауыткулары:

1. Аталақ без гипоплазия – эндокринді қызметінің төмендеуі;
2. Аталақ без ретенциясы – аталақ бездің төмен түсінде кедергі үрдісі.
3. Ерек жалған гермафродитизм – сыртқы жыныс ағзалары әйел жыныс ағзалармен үқсас.
4. Шынайы гермафродитизм – организмде екі жыныстың жыныс бездері дамыған.

<p>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 11 беті

5. Крипторхизм – ұмаға екі аталық бездің төмен түспеуі.
6. Монорхизм – ұмаға бір аталық бездің төмен түспеуі. Ұрық шылбыры мен ұрық қуықшасының даму ауытқулары:
1. Ұрық шылбырының артериясы;
 2. Ұрық қуықшаларының гипоплазиясы, несеп Несепжібергіш өзегінің даму ауытқулары:
 1. Эписпадия – несепжібергіш өзегінің жыныс мүшесінің жоғарғы жағынан бөлінуі;
 2. Гипоспадия – несепжібергіш өзегінің төменгі төменгі жағынан бөлінуі;
- Әйел жыныс ағзалары, екі бөлімнен тұрады: 1) жамбас астауында орналасқан ішкі жыныс ағзалары-анабездер, жатыр тұтікшелері, жатыр, қынап және 2) сыртынан көрінетін бөлім-сыртқы жыныс ағзалары, бұған үлкен және кіші жыныс ернеулері, делікті, қыздық перде жатады.
- Анабез, жұп ағза, атабезге ұқсас әйел жыныс безі болып табылады. Ол-жалпақ пішінді, ұзындығы 2,5 см, ені 1,5 см, қалыңдығы 1 см болатын дene. Оның екі шетін ажыратады жоғарғы біршама дөңгелектенген шеті жатыр жағына қарайды және тұтік шеті, қарама-қарсы төменгі, үшкір шеті, жатырмен меншікті байлам арқылы байланысқан.
4. **Иллюстрациялық материалдар:** слайдтар, планшеттер, муляждар, плакаттар.
5. **Әдебиет:** № 1 қосымшаны қараңыз.
6. **Бақылау сұрақтары (көрі байланысы)**
1. Несеп зәр шығару жүйесінің ағзаларын атаңыз
 2. Бұйректің құрылымдық функционалдық бірлігі не?
 3. Несеп ағзаларының анатомиялық, топографиялық орналасуы.
 4. Зәрағар және несеп қуық қабырғаларының құрылышына сипаттама беріңіз.
 5. Нефронның құрылышы. Еректің ішкі және сыртқы жыныс ағзаларын атаңыз
 6. Ішкі әйел жыныс ағзаларын атаңыз
 7. Сыртқы әйел жыныс ағзаларын атаңыз
 8. Жыныс ағзаларының қызметтік ерекшеліктері неде?
 9. Жатыр бұлшық еттерінің ерекшеліктері қандай?

№7 Теория

1. **Тақырыбы:** Ангиология. Микроциркуляция туралы түсінік. Коллатералды қан айналымы. Жүректің құрылышы, қызметі. Перикард. Аорта оның бөлімдері, тармақтары. Аорта доғасы. Иық-бас сабауы. Кіші және үлкен қанайналым шенбері. Жалпы ұйқы артериясы. Сыртқы, ішкі ұйқы артериясы. Мидың артериалдық шенбері. Кеуде құрсақ аортасы. Бұғана асты артериясы. Мықын артериясы.
2. **Мақсаты:** Қан тамырлар жүйесінің құрылышы ерекшеліктерін және қызметтін оқып білу. Жүректің анатомиялық сипаттамасына түсінік беру. Жүрек-қан тамыр жүйесінің анатомиялық құрылымын табу және білім алушыларға көрсету.

3. Теория тезистері:

Тамырлар жүйесі бөлінеді: 1) Қан тамырлар жүйесі. 2) Лимфатикалық жүйе. Қан тамырлар жүйесі – жүрек, тамырлар және капиллярлар. Жүрек 2 жартыдан тұрады, артериалды, венозды. Аорта сол қарыншадан артериальді қанды алып, бүкіл организмге таратады. Шашта, тырнақтарда, көздің мүйізді қабатында тамырлар болмайды.

Микроциркуляция – микроскопиялық деңгейдегі тамырлар арнасының қан мен лимфа арасындағы қозғалысы.

Коллатеральды қан айналымы бүйірлік жанама қан тамырлары арқылы жүретін қан ағымы. Капиллярдың физиологиялық маңызын айтуда керек – олардың арқасында клеткалар қоректенеді, артериальді қан веноздық қанға айналады.

<p>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>«Морфологиялық пәндер» кафедрасы</p>	<p>№ 81-11-2024</p>
<p>«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені</p>	<p>28 беттің 12 беті</p>

Қан және лимфа тамырлары әр уақытта құрамына формалық элементтер кіретін қан және лимфамен толтырылған. Формалық элементтер жілік майындағы бағандық клеткаларының есіп-өну нәтижесінде дамиды. Клеткалардың бір бөлігі осы жерде пайда болып, одан әрі айырша безде дамиды. Сондықтан жілік майы мен айырша без орталық қан жасаушы ағзалар деп аталады. Клеткалардың арнаулы формаларға айналу жолдарындағы өзгерістерінің едәуір бөлігі лимфа түйіндері мен көкбауырда іске асады, сондықтан оларды шеткі қан жасаушы және иммундық жүйе мүшелері деп атайды.

4. **Иллюстрациялық материалдар:** слайдтар, жүрек муляжі, плакаттар.

5. **Әдебиет:** № 1 қосымшаны қараңыз.

6. **Бақылау сұрақтары (көрі байланысы)**

1. Аорта, оның бөлімдері, тармақтарын атаңыз.
2. Иық-бас сабауы.
3. Қан тамырларының құрылышы, тармақталуы.
4. Жүректің құрылышы, қызметі.
5. Коллатеральді қан айналымы
6. Микроциркуляторлық ағым

№8 Теория

1. **Тақырыбы:** Жоғарғы және төменгі қуысты вена жүесі. Қақпа венасы. Кава –кавальді және порто-кавальді анастомоздар. Ішкі, сыртқы, алдыңғы мойындырық вена жүйесі.

Мидың веналары.

2. **Мақсаты:** Жүрек-қантамыр жүйесінің құрылышы мен қызметінің ерекшеліктерін зерттеу. Жүрекке анатомиялық сипаттама беру. Білім алушыларды жүрек-қантамыр жүйесінің анатомиялық құрылымын көрсетуге және табуға үйрету.

3. **Теория тезистері:**

Vena cava superior – жоғарғы қуыс вена жоғарғы көтерілетін қолқаның оң жағы мен сәл артына таман орналасқан жуан (2,5 см шамасында), бірақ қысқа (5-6 см) сабау. Жоғарғы қуыс вена I оң жақ қабырғаның төстікпен қосылатын жерінде vv. brachiocephalicae dextra et sinistra –лардың қосылуынан пайда болады. Ол бұл жерден төстіктің оң жақ жиегін бойлай бірінші және екінші қабырғаралықтардың артымен жүріп, III қабырғаның жоғарғы деңгейіне дейін төмен түсіп, жүректің оң жақ құлақшасы артында орналасып, оң жақ жүрекшеге құяды. Оның артқы қабырғасы оны оң жақ бронхыдан бөліп тұратын a.pulmonalis dextra – мен және жүрекшеге құйылар жерінде оң жақ жоғарғы өкпе венасымен жанасады, бұл екі тамыр да оны көлденең қызып өтеді.

Иық – бас веналары vv.brachiocephalicae dextra et sinistra – иық-бас веналары, жоғарғы қуыс венаны түзеді, ал өз кезеңінде әрқайсысы v.subclaviae мен v.jugularis internae-дың қосылуынан пайда болады. Оң жақ иық-бас венасы сол жақтағыдан қысқалау, небары 2-3 см-дей; ол оң жақ төстік-бұғана буыны артында түзіліп, қиғаш төмен медиальды бағытта сол жақтағы аттас венамен қосылатын жерге келеді. оң жақ иық-бас венасын алдынан mm.sternocleidomastoideus, sternohyoideus және sternothyroideus ал төменде I қабырға шеміршегі жауып тұрады. Сол жақ иық-бас венасы оң жақтағы венадан шамамен екі еседей ұзындау.

Төменгі қуыс венасы – v.cava interior - денедегі ең ірі вена сабауы, іш қуысында қолқамен қатар, оның оң жағында жатады. Ол IV бел омыртқа деңгейінде қолқаның бөлінетін жерінен сол төмендеу және одан онға қарай екі ортақ мықын веналарының қосылуынан түзіледі.

4. **Иллюстрациялық материалдар:** слайдтар, жүрек муляждары, планшеттер, плакаттар.

5. **Әдебиет:**

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 13 беті

6. Бақылау сұраптары (кері байланысы):
1. Жоғары күйес веналардың топографиясын беріңіз?
 2. Төменгі күйес веналардың сипаттамасын беріңіз?
 3. Иықбас веналарының құрылышы.
 4. Алдыңғы және сыртқы, ішкі мойындырық веналардың құрылышы.

№9 Теория

1. **Тақырыбы:** Лимфа жүйесі.

2. **Мақсаты:** Лимфа жүйесіне түсінік беру. Лимфа тамырлары және адам денесіндегі жекеленген лимфа түйіндерін оқыту.

3. **Теория тезистері:**

Лимфа жүйесі – systema lymphaticum – тамыр жүйесінің құрам бөлігі болып табылады және вена жүйесінің құрам бөлігі болып табылады және вена жүйесінің қосымша арнасы сияқты, онымен тығыз байланыста дамиды, әрі құрылышы жағынан ұқсас белгілері болады (қақпақшаларының болуы лимфа ағынының тканьдерден жүрекке қарай бағытталуы).

Оның негізгі қызметі – лимфаны тканьдерден вена арнасына өткізу (тасымалдық, резорбциялық және дренаждық қызметтер), сондай-ақ иммундық реакциядарға қатысатын лимфоидтық элементтердің түзу (лимфопоэз) және организмге келетін бөгде заттарды, бактерияларды және т.б. залалсыздандыру (тосқауылдық қызмет.) Қатерлі ісік (рак) клеткалары да лимфа жолдарымен таралады: бұл жолдарды анықтау үшін лимфа жүйесі анатомиясын терен білу керек.

Осы атаптап қызметтеріне сәйкес лимфа жүйесі құрамында мыналар болады: I.Лимфа өткізетін жолдар: лимфокапиллярлық тамырлар, лимфа тамырлары, сабаулары және өзекшелері.

II.Лимфоциттер дамитын жерлер:

- 1) жілік майы және айырша безі;
- 2) кілегейлі қабықтардағы лимфоидты түзілістер;
- a) жекеленген лимфа түйіншектері - folliculi lymphatici solitari ә) топтарға жиналған – folliculi lymphatici aggregati
- б) бадамша без түрінде лимфа тканінің түзілуі;
- 3) лимфа тканінің соқыр ішекте жиналуды;
- 4) көкбауыр жұмсағы;
- 5) лимфа түйіндер;

Лимфа жүйесі анатомиялық жағынан мына бөліктерден тұрады:

1. Лимфалық арнаның түйік ұшы лимфокапилляр торы түрінде мүше ткандарін шырмап жататын лимфокапилляр торы түрінде мүше ткандарін шырмап жататын лимфокапилляр тамырларынан басталады.

2. Лимфокапилляр тамырлары мүшесінің ұсақ лимфа тамырлары өріміне айналады.

3. Ол өрімдер өздерінің одан арғы жолдарында лимфа түйіндерімен үзіліп отыратын ірілеу әкетуші лимфа тамырлары түрінде мүшелерден шығады. Ірі лимфа тамырлары лимфа сабауларына, одан әрі дененің басты лимфа тұтіктеріне – оң жақ лимфа тұтігіне және көкірек тұтігіне, ал олар ірі мойын веналарына құйылады.

Лимфа тамырлары. Лимфокапиллярлық тамырлардың лимфа тамырларына айналуы оның қабырға құрылышының өзгеруіне байланысты ал қақпаашалар капилляларда да кездесе береді. Интрамүшелік лимфа тамырлары мүшениң дәнекер тканьді қабатшаларына орналаса, кеңширылған өрімдер түзіп, қан тамырларымен бірге жүреді.

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 14 беті

4. **Иллюстрациялық материалдар: слайдтар, муляждар, планшеттер, плакаттар.**
5. **Әдебиет:** № 1 қосымшаны қаранды.
6. **Бақылау сұрақтары (көрі байланысы):**
 1. Лимфа жүйесіне түсінік беру?
 2. Лимфа тамырларына түсінік беру?
 3. Лимфа түйіндеріне түсінік беру?
 4. Дененің жекеленген лимфа түйіндеріне сипаттама беріңіз?

№10 Теория

1. Тақырыбы: Неврология. Жұлын құрылышы, топографиясы. Жұлын қабықтары. Ішкі құрылышы. Мидың жалпы сипаттамасы. 12 жұп ми нервтерінің шығатын жері. Мидың қабықшалары, қойнаулары, өсінділері. Артқы ми. Сопақша ми және оның құрылышы. Көпір, оның топографиясы, құрылышы. Мишық: пішіні, құрылышы, топографиясы, аяқшалары және оның құрамы.

2. Мақсаты: Нерв жүйесінің құрылышын және қызметтік ерекшеліктерін оқып білу. Нерв жүйесінің анатомиялық сипаттамасына түсінік беру. Жұлынның анатомиялық құрылымдарын табу және білім алушыларға көрстеу.

3. Теория тезистері:

Тірі заттың негізгі қасиеттерінің бірі-тітіркенгіштік. Нерв жүйесін топографиялық принцип бойынша орталық және шеткі бөлімдер немесе жүйелер деп бөледі. Орталық нерв жүйесі деп сұр және ақ заттан тұратын жұлын мен миды, ал шеткі нерв жүйесі деп барлық қалғанын, яғни нерв түбіршектерін, түйіндерін, өрімдерін, шеткі нерв ұштарын атайды. Жұлын мен мидың сұр заты нерв орталықтары мен өсінділерінің тармақтарымен қоса алғандағы нерв клеткаларының жиыны.

Адамның біртұтас нерв жүйесі организмнің екі негізгі – ішкі және жануар бөлігіне сәйкес шартты түрде екі бөлікке бөлінеді: 1) Барлық ішкі ағзаларды, эндокриндік жүйе мен тері бұлшықеттерін, жүрек пен тамырларды, яғни организмнің ішкі ортасын түзетін ағзаларын нервтендіретін вегетативтік немесе автономды нерв жүйесі. 2) Нерв жүйесінің қаңқа мен кейбір ішкі ағзалардың (тіл, көмей, жұтқыншақ) ерікті бұлшықетін (жануар тіршілігі мүшелеңдерін) нервтендіретін анимальды нерв жүйесі.

Нерв жүйесінің вегетативтік бөлігін өз кезегінде симпатикалық және парасимпатикалық деп екіге бөледі, кейде қысқаша оларды жүйе деп те атайды. Симпатикалық жүйе организмнің барлық бөліктерін, ал парасимпатикалық жүйе оның тек белгілі бір аймақтарын ғана нервтендіреді.

Жұлын (medula spinalis) - омыртқа өзегінде жатады, (еркектерде 45 см және эйелдерде 41-42 см) алдынан артына қарай біршама қысыңқы цилиндр тәж тәрізді, ол жоғарыда (бас жағында) тікелей сопақша миға ауысып, ал төменде (құйрық жағында) конус тәрізді сүйірлене, II бел омыртқа деңгейінде аяқталады.

Мұны білудің практикалық маңызы бар (жұлын сұйықтығын алу немесе жұлынға анестезия жасау мақсатында белді тескен кезде шприц инесін III және IV бел омыртқаларының қылқанды өсінділері арасынан енгізу керек)

Жұлын нервтері - nn. spinales – дененің миотомдарына (миомерлеріне) сәйкес орналасады, әрбір нервке оған жататын тері участкесі (дерматом) сәйкес келеді.

Адамда 31 жұп жұлын нерві бар, атап айтқанда 8 жұп мойын 12 жұп көкірек, 5 жұп бел, 5 жұп сегізкөз және 1 жұп құйымшақ нервтері. Әрбір жұлын нерві жұлыннан екі түбірмен шығады:

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>	<p>№ 81-11-2024 28 беттің 15 беті</p>
<p>«Морфологиялық пәндер» кафедрасы</p>		
<p>«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені</p>		

артқы (сезімтал) және алдыңғы (қозғалыс) түбірлері. Екі түбір омыртқааралық тесік арқылы омыртқа өзегінен шығатын бір сабауға қосылады.

4. Иллюстрациялық материалдар: слайдтар, планшеттер, ми муляжі.

5. Әдебиет: № 1 қосымшаны қаранды.

6. Бақылау сұрақтары (көрі байланысы)

1. Нерв жүйесінің қызметтері
2. Нерв жүйесінің жіктелуі
3. Жұлын құрылышы, топографиясы.
4. Жұлынның қабықтарын атаңыз.
5. Жұлынның ішкі құрылышына сипаттама беріңіз.

№11 Теория

1. Тақырыбы: Ортаңғы ми. Төрт төмпешік. Ми аяқшалары. Мидың су құбыры. Аралық ми. Таламенцелофон және гипоталамус. Соңғы ми. Мидың ақ заты. Алдыңғы дәнекер. Сүйелді дене. Күмбез. Гипокамп.

2. Мақсаты: Мидың және ми қабықтарының құрылышын, қызметтік ерекшеліктерін оқып білу.

3. Теория тезистері:

Ми – бассүйек қуысында орналасқан және пішіні жалпы алғанда бассүйек қуысының формасына сәйкес келеді. Оның жоғары латеральды немесе дорсальды беті бассүйек күмбезіне сәйкес дәңес, ал төменгі беті немесе ми негізі біршама жалпайған, тегіс емес. Мидың үш ірі бөлігін ажыратуға болады: үлкен ми – cerebrum, мишиқ - cerebellum, және ми сабауы – truncus encephalicus. Мидың ең көп бөлігін үлкен ми сынарлары алғып жатады, одан кейінгі үлкені мишиқ, қалған шамалы бөлігін ми сабауы құрайды.

Ми қабығы – meninges – жұлын қабықтарының (қатты, торлы және жұмсақ) тікелей, жалғасын құрайды.

Қатты қабық – dura mater. encephali – басқа қабықтар сыртында жататын тығыз ақшылдау дәнекер тканьды қабық.

Торлы қабық – arachnoidea encephali – жулындағы сияқты қатты қабықтан субдуральды кеңестіктің капилляр саңылауымен бөлінеді.

Жұмсақ қабық – pia mater encephali – миға тығыз жанасып, оның бетінің барлық жүлгелері мен саңылауларына енеді. Жұмсақ қабықта қан тамырлар мен тамырлы өрімдер болады. Қабықша мен тамырлар арасында торасты кеңістігімен қатынасатын периваскулярлы саңылау орналасады.

4. Иллюстрациялық материалдар: слайдтар, ми муляжы, планшеттер, плакаттар.

5. Әдебиет: № 1 қосымшаны қаранды.

6. Бақылау сұрақтары (көрі байланысы):

1. Миға анықтама беріңіз?
2. Ми қабықтарына анықтама беріңіз?

№12 Теория

1. Тақырыбы: Бас ми нервтері, үшкіл нерв/V-жұп/. Нервтендіру аймақтары, Бет нерві /VII-жұп/. Тіл-жүткynшақ нерві /IX-жұп/. Кезбе нерв /X-жұп/. Қосалқы нерв /XI-жұп/. Тіласты нерві /XII-жұп/. Топографиясы, ядросы. Нервтендіру аймақтары. Жұлын нервтері.

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 16 беті

Артқы тармақтары. Көкірек нервтерінің алдыңғы тармақтары. Мойын өрімі. Нервтендіру аймақтары. Иық өрімі және тармақтары.

2. Мақсаты: Нервтендіру аймақтарын атап көрсету. Бас ми нервтері VII, VIII, IX, X, XI, XII. Вегетативті жүйке жүйесі, құрылыштың зандаулықтары, қызметі. Симпатикалық жүйесінің орталықтарын атап жалпы түсіндіру. Жұлын нервтерінің тармақтарын білім алушыға атап көрсетіп беру. Вегетативті жүйке жүйесі құрылыштың жалпы принциптерін білім алушыға атап, көрсетіп түсіндіру.

3. Теория тезистері:

Бассүйек нервтерінің жұлын нервтерінен ерекшеліктері бар. Бұл негізінен ми мен бастың жұлын мен тұлғаға қарағандағы басқаша даму жағдайларына байланысты. Бассүйек нервтері де, жұлын нервтеріндегідей, сұр зат ядролары болады: сомалық сезімтал, сомалық-қозғалыс және вегетативті. Вегетативті ядроларын висцералды-сезімтал және висцералды-қозғалыс ядролар деп бөлуге болады. Бассүйек нервтерінің 12 жұбының VII нев сомалық-сезімтал, ал III, IV, VI, XI, XII нервтер сомалық-қозғалыс нервтері болып саналады. Қалғандары (V, VII, IX, X) аралас нервтер.

Бассүйек нервтерінде де жұлын нервтеріндегідей сұр зат ядролары болады: сомалық-сезімтал, сомалық-қозғалыс және вегетативті. Вегетативті ядроларын вицералды-сезімтал және вицералды-қозғалыс ядролары бірінгай салалы, бұлшықетті ғана ем, вицералды текті қаңқа бұлшықеттерін де нервтендіреді. Жұлын нервтерінің бірігуінен пайда болған нервтер Бұл топқа бір нерв-n.hypoglossus жатады.

Тіласты нерві (XII)-n.hypoglossus, жануарларда дербес болып тіласты бұлшықеттің нервтендіретін 3-4 жұмыс сегменттік нервтерінің қосылып-бірігуінен пайда болады. Одан тіл бұлшықеттерінің оқшаулануына сәйкес бұл нервтер құрделі омыртқалылар мен адамда бірігеп-қосылып, жұлын нервтерінен бассүйек нервтеріне ауыспалы тип ретінде түзіледі. Бұлшықетті болып табылатын тіласты нервісінің тіл бұлшықеттеріне баратын эфферентті және осы бұлшықеттер рецепторларынан шығатын афферентті талшықтар бар. Бұлшықетті болып табылатын тіласты нервісінің тіл бұлшықеттеріне баратын эфферентті және талшықтар бар. Онда сондай-ақ жоғарғы мойын симпатикалық түйінінен шығаратын симпатикалық талшықтар да өтеді.

Үшкіл нерв (V) Үшкіл жүйке (тройничный жүйке); (n.trigeminus лат. nn — жүйке, trigeminus — үшкіл) — мидан шығатын ең ірі аралас жүйке (В-жұп). Ми көпірінен сезімтал және қозғалтқыш түбіршіктер: көздік, жоғарғыжақ және төменгіжақ жүйкелер болып шығып, қосылып бір жүйке бағанын түзеді. Көздік жүйке — көздік аумағын, мұрынның иіс сезу бөлігінің кілегейлі қабығын, маңдай, самай, қабақ терілерін жүйкелендіретін сезімтал жүйке. Оның құрамында көзжасы безінің қызметтің реттейтін парасимпатикалық жүйке талшықтары болады. Жоғарғыжақ жүйкесі бастың жоғарғыжақ аумағын, мұрын қуысының, тандайдың, жоғарғы еріннің кілегейлі қабықтарын жүйкелендіретін сезімтал жүйке. Төменгіжақ жүйкесі — самай және төменгіжақ аумағына сезімтал, шайнау бұлшық еттеріне қозғалтқыш жүйке талшықтарын беретін аралас жүйке.

Бет нерві (VII) N.facialis, бет нерві-аралас нерв. Екінші желбезек дөғасы нерв ретінде одан дамыған бұлшықеттерді барлық мимикалық және тіласты бұлшықеттерінің тіл бөлігін нервтендіреді және оның құрамында қозғалыс ядросының осы бұлшықеттерге баратын эфферентті талшықтары мен сол бұлшықеттердің рецепторларынан шығатын афферентті талшықтары болады. Сондай-ақ оның құрамында аралық, n.intermedius, нервке жататын дәм сезу және секреттік талшықтары бар.

Кезбе нерв (X) N. vagus, кезбе нерв-төртінші және одан кейінгі келесі желбезек

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 17 беті

доғаларынан дамыған кең тарағандықтан осылай деп аталады. Бұл бассүйек нервтерінің ішіндегі ең ұзыны. Кезбе нерв тармақтары арқылы тынысалу ағзаларын, асқорыту жолының едәуір бөлігін сигматерізді ток ішекке дейін нервтендіреді, сондай-ақ ол жүрекке оның соғуын баулататын тармақтар береді.

Қосымша нерв (XI) Қосымша нерв соңғы жебезек доғаларынан дамиды; эфферентті талшықтары және сопақша ми мен жұлында жайғасқан екі қозғалыс ядросы бар. Ядроларына сәйкес оның ми және жұлындық бөліктерін ажыратады. Ми бөлігі сопақша мидың, кезбе нервтің төменгі жағында шығады. Қосымша нерв жұлындық бөлігі алдыңғы және артқы түбіршіктері арасында және жоғарғы үш мойын нервтерінің алдыңғы түбіршіктерінен құралып, нерв сабаушасы түрінде жоғары көтеріліп, ми бөліміне қосылады. Қосымша нерв кезбе нервтің бөлініп шықкан тармағы болғандықтан, ол онымен бірге бассүйек қуысынан мойындырық тесігі арқылы шығып *m.trapezius* пен одан бөлінген *m.sternocleidomastoideus* екеуін нервтендіреді.

Орталық нерв жүйесінен шығатын жеріне қарай невр сабаулары жұлындық, және бассүйектік, болып бөлінеді. Жұлын нервтері, *nn. Spinals*, дененің миотомдарына (миомерлеріне) сәйкес орналасады, әрбір нервке оған жататын тері бөлігі (дермотом) сәйкес келеді.

Адамда 31 жұп жұлын нерві бар, атап айтқанда 8 жұп мойын, 12 жұп кеуде, 5 жұп бел, 5 жұп сегізкөз және 1 жұп құйымшақ нервтері. Әрбір жұлын нерві жұлыннан екі түбіршікпен шығады: артқы (сезімтал) және алдыңғы (қозғалыс) түбіршіктері.

Вегетативті талшықтар артқы түбіршікте де болады. Түбіршіктер арқылы анимал нервтерге келетін вегетативті талшықтар трофиқа, тамыр қозғалтқыш және т.б. үрдістерді қамтамасыз етеді.

Жұлын нервтерінің артқы тармақтары. Барлық жұлын нервтерінің артқы тармақтары, *rami dorsales*, омыртқалардың көлденең өсінділері арасынан олардың буын өсінділерін орай артқа қарай кетеді. Олардың барлығы (1 мойын, IV және V сегізкөз, құйымшак тармақтарын қоспағанда) желке терісін, мойын мен арқаның артқы бетің сондай-ақ терең арқа бұлшықеттерін жабдықтайдын, *ramus medialis* және *ramus lateralis* болып бөлінеді.

Жұлын нервтерінің алдыңғы тармақтары. Жұлын нервтерінің алдыңғы тармақтары, *rami ventrales*, дененің вентралды қабырғасының терісі мен бұлшықетін және кол- аяктарды нервтендіреді. Іш терісінің төменгі бөлігі сыртқы жыныс мүшелерінің дамуына катысадындықтан, оларды жабатын теріні де алдыңғы тармақтар нервтендіреді.

Үлкен үш өрімді ажыратады: мойын, иық және бел-сегізкөз. Бел-сегізкөз өрімі бел, сегізкөз және құйымшак өрімдері болып бөлінеді.

Мойын өрімі. Мойын өрімі, *plexus cervicalis*, төрт жоғарғы мойын нервтерінің алдыңғы тармақтарынан түзіледі. Олар өзара үш доға ілмектермен байланысып, көлденең өсінділердің бүйірінен медиалды жағынан омыртканың алдыңғы бұлшықеттері, ал латералды жағынан омыртқа бұлшықеттері.

4. **Иллюстрациялық материалдар:** слайдтар, муляждар, планшеттер, плакаттар.
5. **Әдебиет:** № 1 қосымшаны қаранды.
6. **Бақылау сұрақтары (көрі байланысы):**
 1. Нерв жүйесінің қызметтері?
 2. Нерв жүйесінің жіктелуі?
 3. Орталық нерв жүйесінің ағзаларын атаңыз?
 4. Шеткі нерв жүйесінің ағзаларын атаңыз?
 5. Кеуде нервтерінің алдыңғы тармақтарын атаңыз
 6. Мойын өрімдерін атаңыз.

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 18 беті

7. Иннервация аймактарын атанаңыз.
8. Иық өрімдері: қысқа, ұзын тармақтары.
9. Бел өрімдері. Сегізкөз және құйымшақ өрімдері.

№13 Теория

1. **Тақырыбы:** Эндокриндік жүйе. Иммундық жүйе ағзалары. Құрылышы, топографиясы.

2. **Мақсаты:** Эндокрин жүйесінің құрылышын және қызметтік ерекшеліктерін оқып білу. Иммундық жүйе ағзаларымен таныстыру. Құрылышы, топографиясы, қызметтерін түсіндіру.

3. Теория тезистері:

Эндокриндік немесе ішкі секреция бездері деп шығарушы өзегі жоқ өзексіз бездер және секрет немесе экскреттері терінің бетіне (тер, май бездері) немесе шырышты қабықшалардың бетіне (сілекей бездері, бауыр және т.б.) құйылатын сыртқы секреция бездеріне қарама-қарсы өз секреттің тікелей қанайналым жүйесіне бөлетін бездерді айтады. Даму орындарына қарай аталған бездерді 5 топқа бөлінеді:

1. Энтодермальды бездер бронхиогендік топ (қалқанша, қалқанша маңы және айырша бездер).
2. Ішек түтігінің энтодермальды бездері (ұйқы безі аралықтары).
3. Мезодермальды бездер (бүйрек бездің интерренальды жүйесі және жыныс бездері).
4. Аралық мидан пайда болатын эктодермальды бездер-неврогендік топ (эпифиз және гипофиз).
5. Симпатикалық элементтерден пайда болатын эктодермальды бездер – адренал жүйесі тобы (бүйрек бездердің ми заты мен хромаффинді денелер).

Қан және лимфа тамырлары әр уақытта құрамына формалық элементтер кіретін қан және лимфамен толтырылған. Олардың қызметі мен құрылышы әр алуан (эритроциттер оттегі мен көмір қышқыл газын тасымалдайды, әр түрлі лейкоциттер организмнің реттеуші және қорғаныш реакцияларына қатысады). Мұндай реакциялардың ішінде бөтентекті заттар мен клеткаларды залалсыздандыруға арналған иммундық реакциялар ерекше бөлінеді. Бұл реакциялар негізінен лимфоциттер және макрофагтардың қызметі арқылы жүзеге асады.

Иммундық жүйе мүшелері сырттан келетін немесе организмнің өзінде түзілетін генетикалық жағынан бөтентекті клеткалар мен заттардан организмнің қорғауын (иммунитетін) қамтамасыз етеді.

Көкбауыр – lie – қан тамырларымен молынан жабдықталған лимфоидты мүше. Көкбауыларымен молынан жабдықталған лимфоидты мүше. Көкбауырда қантамыр жүйесі лимфоидты тканьмен тығыз араласқан соның нәтижесінде бұл жерде қан көкбауырда пайда болып дамитын лейкоциттердің жаңа қорымен молығады. Сонымен қатар көкбауыр арқылы өтетін қан ондағы макрофагтардың фагоцитоздық қызметі нәтижесінде тіршілік қызметін аяқтаған қызыл қан түйіршіктер (эритроциттер «бейіті») мен қан арнасына келіп түскен ауру тудырушы микробтардан, бөгде заттардан және т.б. арылады.

4. **Иллюстрациялық материалдар:** слайдтар, муляждар, планшеттер, плакаттар.

5. **Әдебиет:** № 1 қосымшаны қараңыз.

6. Бақылау сұрақтары (көрі байланысы):

1. Эндокриндік бездерге анықтама беріңіз?
2. Эндокриндік бездердің жіктелуі?
3. Қан түзу ағзаларына түсініктеме беріңіз?
4. Иммундық жүйе ағзаларына түсініктеме беріңіз?
5. Көкбауырдың құрылышына түсінік беріңіз?

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>«Морфологиялық пәндер» кафедрасы</p>	<p>№ 81-11-2024</p>
<p>«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені</p>	<p>28 беттің 19 беті</p>

6. Айырша бездін құрылышына түсініктеме беріңіз?

№14 Теория

1. Тақырыбы: Көру мүшесі. Көздің аккомодациялық аппараты. Көздің қосалқы мүшелері. Көз жастық аппараты. Көру анализаторлары. Есту мүшесі. Құрылышы, Өткізгіш жолдары мен орталықтары. Тепе-тендік мүшесі. Дәм және иіс сезу жане оның мүшелері. Әткізгіш жолдары мен орталықтары.

2. Мақсаты: Сезім ағзаларының құрылышын және қызметтік ерекшеліктерін оқып білу. Есту, тепе-тендік және дәм ағзаларының құрылышын және қызметтік ерекшеліктерін оқып білу.

3. Теория тезистері:

Жарық тітіргендіргішінің әсерінен жануарлар дүниесінде арнаулы көру ағзасы – organum visus пайда болды, оның басты бөлігі барлық жануарларда эктодермадан пайда болатын арнаулы сезімтал жасушалар болып табылады. Олардың көбі пигментпен қоршалған. Пигменттің маңызы жарықты белгілі бір бағытта өткізіп, артық жарық сәулелерін ұстап қалуда.

Иіс сезу ағзасы - organum olfactus - өзінің негізгі бөлігінде эктодерманың ішкі жоқ ойысы болып табылатын иіс сезу шұңқырын астарлап жататын сезімтал (нейросенсорлық) иіс сезу жасушаларынан тұрады.

Бұл сезімтал элементтер, иіс сезу нейросенсорлық жасушалары мұрынның шырышты қабығында, жоғарғы мұрын қалқаны мен мұрын қалқасының қарсы жатқан бөлігінде орналасқан иіс сезу жолының бірінші нейрондарын түзеді, олардың аксондары nn.olfactorii құрамында торлы сүйектің lamina cribrosa – дағы тесіктепе арқылы bulbus olfactorius – қа өтіп, сол жерде иіс сезу шумактарында glomeruli olfactorii – аяқталады. Осы жерде екінші нейрондар (митралды жасушалар) басталады, олардың аксондары иіс сезу жолы құрамында жүріп, иіс сезу жолы сұр затының жасушалары trigonum olfactorium, anterior subsantia perforata және бозғылт қалқада аяқталады.

Торлы қабықтың нерв элементтері үш нейрондар тізбегінен құралады. I-ші звеносы торлы қабықтың жарық сезігіш клеткаларынан (таяқша және сауыша) көру анализаторының рецепторларынан құралады. 2-ші звеносы - биполярлы нейроциттер және үшінші ганглиоздық нейроциттердің есінділері көру нервтерінің нерв талшықтарына жалғасады.

Сыртқы құлақ auris externa, құлақ қалқаны мен сыртқы есту өтесінен тұрады. Құлақ қалқаны әдетте құлақ деп аталады, ол терімен қапталған серпінді шеміршектен түзілген. Құлақ қалқанының сыртқы пішіні мен шығыңқы жерлері шеміршекке байланысты бос қайрылғанжиегі құлақ шиыршығы- helix және оған паралель қарсы шиыршық antihelix, сондай-ақ алдыңғы томпақ құлақ бұртігі tragus және соның артында жатқан құлаққа қарсы бұртік antitragus деп аталады.

Ортаңғы құлақ, auris media дабыл қуысы мен есту тұтігінен тұрады. Ол дабыл қуысын жұтқыншақтық мұрындық бөлігімен жалғастырады. Ол дабыл қуысы мен есту тұтігінен тұрады. Ол дабыл қуысын жұтқыншақтық мұрындық бөлігімен жалғастырады.

Дабыл қуысы cavitas tympanica, самай сүйегі пирамидасының негізінде сыртқы есту өтісі мен ішкі құлақ (лабиринт) арасында жайғасқан.

Есту тұтігі (tuba auditiva) немесе Евстахий тұтігі (Eustachii, осыдан тұтіктің қабынуы - евстахиит), ауаның жұтқыншақтың дабыл қуысына келуіне арналған, осы арқылы қуыс іші мен сыртқы атмосфера қысымы арасындағы тепе-тендік сакталады. Бұл лабиринтке дабыл жарғағы тербелістерін дұрыс өткізу үшін қажет.

4. Иллюстрациялық материалдар: слайдтар, муляждар, планшеттер, плакаттар.

<p>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 20 беті

5. **Әдебиет:** № 1 қосымшаны қараңыз.
6. **Бақылау сұрақтары (көрі байланысы):**
 1. Сезім ағзаларына анықтама беріңіз?
 2. Анализаторлардың құрамды бөліктерін атаңыз?
 3. Көру ағзасының құрамды бөліктерін атаңыз?
 4. Есту ағзасының құрамды бөліктерін атаңыз?
 5. Тепе – тендік ағзасының құрамды бөліктерін атаңыз?
 6. Дәм сезу ағзасының құрамды бөліктерін атаңыз?

№15 Теория

1. Тақырыбы: Тері және оның туындылары.

2. Мақсаты: Терінің құрылымын зерттеу.

3. Теориялық сабак:

Тері дененің бетін жабады салмағы дene салмағының шамамен 16% құрайды, адам терісінің туындыларына тері бездері (тер және май), сондай-ақ шаш пен тырнақ жатады.

Тері үш қабаттан тұрады:

- эпидермис;
- дермис;
- тері астындағы май (гиподерма).

Қалың және жұқа терінің ажыратынысы.

Қалың тері (алақандар мен табандарда) — қуатты мүйізді қабаты бар қалың (400-600 мкм) эпидермистен, салыстырмалы түрде жұқа дермистен түзілген, шаш пен май бездері жоқ.

Жұқа тері (дененің қалған бөлігіндегі) - мүйіз қабаты нашар дамыған, салыстырмалы түрде қалың дермисі бар жұқа (75-150 мкм) эпидермистен түзілген; шаш, тері бездері бар.

Эпидермис-терінің сыртқы қабаты, ол көп қабатты жалпақ кератинді эпителиймен ұсынылған, онда (эпителий жасушаларынан басқа —кератиноциттер) процесс жасушаларының үш түрі орналасқан. Ол папиллалармен кезектесіп, эпидермальды тарақ түрінде дермага енеді. Бұл эпидермистің дермиспен байланысының механикалық беріктігін және олардың арасындағы өзара алмасу бетінің ауданын арттырады.

Қалың тері эпидермісі бес қабаттан тұрады: базальды, тікенді, түйіршікті, жылтыр және мүйізді. Жұқа теріде жылтыр қабат жоқ.

Эпидермистің эпителий жасушалары(кератиноциттер) базальды қабатта ұздіксіз түзіліп, үстіңгі қабаттарға ауысады, дифференциациядан өтіп, ақырында мүйізді қабыршақтарға айналады, тері бетінен қабыршақтанады.

Терінің базальды қабаты базальды мембранның орналасқан, жақсы дамыған органеллалары, көптеген кератин жіппелері(тонофиламенттер) бар текше немесе призмалық пішінді базофильді жасушалардың бір қатарынан түзіледі. Бұл жасушалар эпителийдің камбияльды элементтерінің рөлін атқарады (олардың арасында бағаналы жасушалар бар және митоз фигурандары кездеседі) және эпидермис пен дермис арасындағы берік байланысты қамтамасыз етеді (іргелес жасушалармен десмосомалармен, ал базальды мембраннымен жартылай десмосомалармен байланысты).

Терінің тікенді қабаты тонофиламенттер шоғыры бар көптеген процестер аймағында ("тікенектер") бір-бірімен десмосомалармен байланысқан бірнеше ірі, тұрақты емес пішінді жасушалардан тұрады. Органеллалар жақсы дамыған. Терең бөлімдерде бөлінетін жасушалар кездеседі.

<p>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>«Морфологиялық пәндер» кафедрасы</p>	<p>№ 81-11-2024</p>
<p>«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені</p>	<p>28 беттің 21 беті</p>

Түйіршікті қабат жұқа, бірнеше қатарлы тегістелген (кесілген фузиформды) жасушалардан түзілген. Ядро тегіс, қараңғы, цитоплазмада көптеген тонофиламенттер, сондай-ақ түйіршіктерекі типті:

ламелла түйіршіктері (кератиносомалар) — кішкентай, ламелла тәрізді құрылымы бар. Құрамында бірқатар ферменттер мен липидтер бар, олар экзоцитоз кезінде жасушааралық кеңістікке бөлініп, эпидермистің тосқауыл функциясы мен су өткізбейтіндігін қамтамасыз етеді.

Терінің жылтыр қабаты (тек қалың теріде болады) — жеңіл, біртекті, құрамында элеидин акуызы бар. Анықталмайтын шекаралары бар тегістелген окси菲尔ді жасушалардың 1-2 қатарынан тұрады. Органеллалар мен ядро жоғалады, кератогиалин түйіршіктері ериді, тонофиламенттер батырылатын матрица түзеді.

Мүйізді қабат ядросы мен органеллалары жоқ және тығыз матрицада жатқан тонофиламенттермен толтырылған жалпақ мүйізді қабыршақтардан түзіледі. Олардың плазмолеммасы акуыздардың ішкі бетінде (негізінен инволюкрин) шөгуіне байланысты қалындаиды. Таразылар жоғары механикалық беріктікке және химиялық заттардың әсеріне төзімділікке ие. Десмосома қабатының сыртқы бөліктерінде мүйізді қабыршақтар әпителій бетінен ыдырайды.

Эпидермистің регенерациясы (жаңауы) оның тосқауыл функциясын қамтамасыз етеді, оның бетінде зақымданған және микроорганизмдері бар сыртқы қабаттарды үнемі ауыстырып, алып тастайды. Жаңау кезеңі 20-90 күн (дene аймағына және жасына байланысты), ол теріге тітіркендіргіш факторлардың әсерінен және кейір ауруларда (мысалы, псoriаз) күрт төмендейді.

Эпидермистің пролиферативті бірлігі — эпидермистің өздігінен жаңаратын бірлігі, ені бойынша мүйізді қабыршаққа тең, ал биіктігі бойынша эпидермистің қалындығына тең және оның барлық қабаттарын қамтитын алтыбырышты жасуша бағанасы түрінде болады. ЭПЕ құрылымын өзін-өзі жаңарту және сақтау көзі-оның негізінде орналасқан базальды жасушалардың эпидермистің 1-2 орталық орналасқан дің жасушаларының айналасында бөлінуі. Базальды жасушалар одан әрі бағанға ауысады, онда олар тігінен қозғалады және сараланады, нағайесінде мүйізді қабыршақтарға айналады. Эпидермистің пролиферативті бірліктері терінің жаңау жылдамдығы төмен аймақтарында ғана сипатталады.

Эпидермистің есінді жасушаларына жасушалардың үш түрі кіреді (саны азайған сайын):
меланоциттер;

эпидермис ішіндегі макрофагтар (Лангерганс жасушалары);
тактильді эптиелиоидоциттер (Меркель жасушалары).

Меланоциттер нейрондық шығу тегі бар. Олардың денесі базальды қабатта жатыр, ұзын процестер тікенекке өтеді. Меланин-қара — қоңыр пигмент (эумеланин) немесе сары-қызыл (феомеланин) түстер-синтезделеді және жасуша денесінде оның процестеріне тасымалданатын түйіршіктерде (меланосомаларда) жиналады. Соңғыларынан олар кератиноциттерге енеді, онда олар ядролық аппараттарын ультракүлгін сәулелердің зақымдануынан қорғайды, содан кейін лизосомалармен жойылады. Меланин синтезі және оның әпителій жасушаларына тасымалдануы меланоциттерді ынталандыратын гормонмен және адренокортикотропты гормонмен, сондай-ақ күн сәулесінің әсерінен (тотығу) ынталандырылады. Олар жарықпен салыстырғанда қараңғы нәсілдерде күштейтілген. Альбинизм кезінде меланин синтезі бұзылады; бұл жағдайда меланоциттер саны өзгермейді. Лангерганс жасушалары (эпидермис ішіндегі макрофагтар) — эпидермиске енетін антигендерді ұстап алады, оларды өндейді және лимфа түйіндеріне тасымалдайды, лимфоциттерді ұсынады және иммундық реакцияның дамуына әкеледі. Олар сүйек кемігінен

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академия» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 22 беті

шыққан. Базальды немесе тікенді қабаттарда жатыр, құрамында дамыған органеллалар және теннис ракеткасы тәрізді арнайы мембраналық түйіршіктер (Бирбек) бар (функциясы түсініксіз).

Меркель жасушалары (тактильді эпителиоидоциттер) — нейрондық шығу тегі бар, афферентті талышықпен байланысқан және рецепторлық функцияны орындауды. Олардың денесі базальды қабатта жатыр, ал процестер десмосомалармен базальды және тікенді қабаттардың эпителиоциттерімен байланысады. Органеллалар орташа дамыған; жасушаның базальды бөлігінде тығыз ортасы және жеңіл жиегі бар түйіршіктер жиналады, олардың құрамында медиатор бар, олар процестердің механикалық деформациясы кезінде синаптикалық саңылауға бөлінеді.

Дерма (терінің өзі) — терінің дәнекер тінінің бөлігі (қалындығы: 0,5—5 мм) — эпидермистің астында орналасқан, оны қоректендіреді, теріге құш береді және оның туындыларын қамтиды. Ол екі қабатты қамтиды: папиллярлық қабат-эпидермиске енетін конустық дөңес (папиллярлар) түзеді, лимфа және қан капиллярлары, жүйке талышықтары мен ұштары бар борпылдақ, талышықты дәнекер тіннен тұрады. Дермистің эпидермистің базальды мембранасымен ретикулярлы, серпімді талышықтармен және арнайы якорь фибрillаларымен байланысын қамтамасыз етеді; торлы қабат-тығыз, талышықты, пішінделмеген дәнекер тіннен түзілген және серпімді талышықтар желісімен әрекеттесетін қалың коллаген талышықтарының үш өлшемді торын қамтитын тереңірек, Қалың, берік қабат.

Тері астындағы тін (гиподерма) жылу оқшаулағыш, қоректік заттар, дәрумендер мен гормондар қоймасы рөлін атқарады, терінің қозғалыштығын қамтамасыз етеді. Борпылдақ талышықты тіндердің қабаттары бар майлы тіндердің кесектерінен түзілген; оның қалындығы тамақтану күйімен және дененің бір бөлігімен байланысты, ал организмдегі таралудың жалпы сипаты жыныстық гормондардың әсерінен болады.

2. Тері бездері

Тер бездері терморегуляцияға, сондай-ақ метаболизм өнімдерінің, тұздардың, дәрілік заттардың, ауыр металдардың шығарылуына қатысады (бүйрек жеткіліксіздігімен қүшейеді). Тер бездері екіге бөлінеді экриндік(мерокриндік) және апокриндік.

Экриндік тер бездерідененің барлық аймақтарының терісінде кездеседі. Олардың саны 3-5 миллион (әсіресе алақандарда, табандарда, маңдайларда көп), ал жиынтық массасы шамамен бүйрек массасына тең. Олар мерокриндік (экриндік) механизм арқылы терминал жасушалары шығаратын және шығарылатын тутіктер арқылы терінің бетіне тұсіп, оны салқыннататын тәмен органикалық компоненттері бар мөлдір гипотоникалық терді шығарады. Олар қаралайым тутік бездеріне жатады және терминал бөлімінен және тар шығару каналынан тұрады.

4. Иллюстрациялық материалдар: слайдтар, муляждар, планшеттер, плакаттар.

5. Әдебиет: № 1 қосымшаны қараныз.

6. Бақылау сұрақтары (көрі байланысы):

1. Тері рецепторлары қайда орналасқан?

2. Тері неден пайда болады?

3. Эпидермис қалай қалыптасады?

4. Эпидермис қайда орналасқан?

<p>OÝTÚSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>		<p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>«Морфологиялық пәндер» кафедрасы</p>		<p>№ 81-11-2024</p>
<p>«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені</p>		<p>28 беттің 23 беті</p>

Қосымша № 1

Анатомия пәні бойынша:

Орыс тілінде

Негізгі:

1. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4 т. Т. 1. Учение о костях, соединении костей и мышцах: учеб. пособие . - 7-е изд, перераб . - М. : Новая волна : Издатель Умеренков, 2012.
2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4 т. Т. 2. Учение о внутренностях и эндокринных железах: учеб. пособие . - 7-е изд, перераб . - М. : Новая волна : Издатель Умеренков, 2012.
3. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4 т. Т. 3 Учение о сосудах и лимфоидных органах: учеб. пособие . - 7-е изд, перераб . - М. : Новая волна : Издатель Умеренков, 2012.
4. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4 т. Т. 4. Учение о нервной системе и органах чувств: учеб. пособие . - 7-е изд, перераб . - М. : Новая волна : Издатель Умеренков, 2012.
5. Привес М. Г. Анатомия человека : учебник. -12-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Изд. дом. СПБМАПО, 2009.

Қосымша:

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
«Морфологиялық пәндер» кафедрасы	№ 81-11-2024
«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені	28 беттің 24 беті

- Неттер Ф. Атлас анатомии человека: атлас - М. ГЭОТАР Медиа, 2015. - 624 с
- Анатомия человека. В 3 т. Т 2. Спланхнология и сердечно-сосудистая система: иллюстрированный учебник / М-во образования и науки РФ; под ред. Л. Л. Колесникова, - М. ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 320
- Анатомия по Пирогову, Атлас анатомии человека. В 3 т. Т. 2. Голова, Шея: М.: ГЭОТАР - Медиа, 2013
- Боянович Ю. В. Анатомия человека: атлас. - Ростов н/Д: Феникс, 2011

Қазақ тілінде

Негізгі:

- Адам анатомиясы: II бөлім. Оқу құралы/ Ә.О. Кузенбаева.- Алматы: Эверо, 2020. - 248 бет
- Адам анатомиясы: I бөлім. Оқу құралы/ Ә.О. Кузенбаева.- Алматы: Эверо, 2020. - 292 бет
- Рақышев А. Р. Адам денесі. 3 томдық. Т. 1. Сүйектер туралы ілім. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014
- Рақышев А. Р. Адам денесі. 3 томдық. Т. 3. Жүйке жүйесі. Сезім мүшелері: оқулық / А. Р. Рақышев. - М. :ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 376 бет
- Рақышев А. Р. Адам денесі. 3 томдық. Т. 2. Ас қорыту жүйесі. Тыныс алу жүйесі. Несепжыныс жүйесі. Эндокриндік бездер. Тамырлар туралы ілім. Лимфа жүйесі- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014.
- Досаев Т:М. Адам анатомиясы.-Ақ-Нұр, оқу құралы.2013
- Адам анатомиясы: оқулық- Алматы: ЖК «АҚНҰР» баспасы, 2013
- Адайбаев, Т. А. Тірек-қимыл жүйесі 1 бөлім [Мәтін] : оқу құралы / Т. А. Адайбаев, А. Й. Алмабаева, М. К. Жаналиева. - Алматы : TechSmith, 2023. - 380 бет.
- Адайбаев, Т. А. Тірек-қимыл жүйесі. 2 бөлім [Мәтін] : оқу құралы / Т. А. Адайбаев, А. Й. Алмабаева, М. К. Жаналиева. - Алматы : TechSmith, 2023. - 236 бет.

Қосынша:

- Адам анатомиясы. Т. 1. Тірек - қимыл жүйесі сүйектер, буындар, бұлшықеттер [Мәтін] : атлас / Ұ. Ж. Жұмабаев [т.б.] . - Астана : Фолиант, 2005. - 321 с.
- Адам анатомиясы. Т. 2. Ішкі мүшелер жүйесі және эндокринді бездер [Мәтін] : атлас / Ә. Б. Әубекіров [т.б.]. - Астана : Фолиант, 2006. - 250 с.
- Адам анатомиясы. 3- том. Жүрек тамыр жүйесі (жүрек, қан тамырлар, лимфа тамырлар) [Мәтін] : атлас / Ә. Б. Әубекіров [т.б.] ; ред. А. А. Идрисов. - Астана : Фолиант, 2010. - 280 бет.
- Адам анатомиясы. 4-том. Нерв жүйесі (нерв жүйесі, сезім ағзалары): атлас / Ә. Б. Әубекіров. - Астана Фолиант, 2012.
- Адам анатомиясы, 3- том. Жүрек тамыр жүйесі жүрек, қан тамырлар, лимфа тамырлар): атлас . А.Б. Аубакіров Астана: Болиант, 2010.
- Аубакиров А. Б. Адам анатомиясы: атлас. - Астана: "Сарыарка", 2008.

Электрондық басылымдар:

- Адам анатомиясы. 3 т. 2-ші т. Спланхнология және жүрек-тамыр жүйесі [Электронный ресурс]: оқулық / И. В. Гайворонский [т/б.]; - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 488 б. с.
- Адам анатомиясы. 3 томдық. 1- ші т. Тірек-қимыл аппараты [Электронный ресурс] : оқулық / И. В. Гайворонский [т/б.]; - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 416 б. с.
- Рақышев, А. Р. Адам денесі. 3 томдық. 1 т. [Электронный ресурс]: оқулық / А. Р. Рақышев. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 456 бет. әл. опт. диск
- Рақышев, А. Р. Адам денесі. 3 томдық. 3 т. [Электронный ресурс]: оқулық / А. Р. Рақышев. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 376 бет. әл. опт. (CD-ROM).

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>	<p>№ 81-11-2024 28 беттің 25 беті</p>
<p>«Морфологиялық пәндер» кафедрасы</p>		
<p>«Анатомия» пәні бойынша аудиториялық сабактар кешені</p>		

5. Рақышев А. Р. Адам денесі. 3 томдық. 2 т. [Электронный ресурс]: окулық / А. Р. Рақышев.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 472 бет. эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Билич, Г . Л . Анатомия человека. Атлас. В 3 т. Т.1. Опорно-двигательный аппарат. Остеология. Синдромология. Миология [Электронный ресурс] : учебник / Г . Л . Билич, В. А. Крыжановский. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2013.
7. Билич, Г . Л . Анатомия человека. Атлас. В. 3 т. Т. 3 [Электронный ресурс] : учебник / Г . Л . Билич, В. А. Крыжановский. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2013. - 792 с. эл. опт. диск (CD-ROM) : ил. - (Электронный учебник).
8. Билич, Г . Л . Анатомия человека. Атлас. В. 3 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учебник / Г . Л . Билич, В. А. Крыжановский. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM) : ил. - (Электронный учебник).
9. Несеп-жыныс ағзаларының анатомиясы. Ахмад Н.С., 2019 /ЦБ Aknurpress / <https://aknurpress.kz/reader/web/2357>
10. Адам анатомиясы. Досаев Т.М. , 2019./ ЦБ Aknurpress / <https://aknurpress.kz/reader/web/1054>
11. Анатомия. Омаш К.,2013/ЦБ Aknurpress <https://aknurpress.kz/reader/web/1088>
12. Гаврилов Л.Ф., Татаринов В.Г Анатомия: Учебник, - 2-е изд., перераб. и доп. – Алматы: Эверо, 2020. – 424 с https://www.elib.kz/ru/search/read_book/2795/
13. Сапаров, К.А. и т. д. Тестовые задания для проверки уровня знаний по анатомии человека. / К.А. Сапаров, К.М. Саугабаева, Б.А. Абдуллаева. – Алматы: Казахский университет, 2005. – 72 с. <http://rmebrk.kz/book/1160072>