



«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  
жанындағы медицина коледжі

**Бакылау олшесу күралдары**

Пәнні: АП 20 СД 20 «Хирургиядагы шұтыл комек»

Мамандыты: 0301000 «Емдеу ісі»

Біліктілігі: 0301013 «Фельдшер»

Курс: 3/4

Семестр: 6/8

Оқу түрі: күнділігі

Бакылау формасы: симихан

Жалпы еңбек сыйымдылығы барлық сағат/кредиттер КZ: 3/72

Аудитория: 10

Симуляция: 62


Шымкент, 2023 ж.

<b>OÝTÝSTIK-QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA</b> <small>-1979-</small>	<b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық		044-67/11 54 беттің 1 беті

Бағылау олису куралы «Хирургиядан шұғыл көмек» пәннің жұмыс бағдарламасы  
(силубусы) иегізіндегі курастырылды.

Курастыруны: Махамбетов Э.Т.

Хаттама №: 6 «01» 09 2023 ж.

Кафедра менгерушісі  Махмут А.О.

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

## 1- сабак

**5.1. Сабактың тақырыбы.** Хирургияға кіріспе. КР хирургиялық көмекті ұйымдастыру.

**5.2. Сабактың мақсаты:** оқушыларға хирургияда дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің теориялық және тәжірибелік дағдыларын үйрету.

**5.3. Пәннің міндеттері:**

- оқушыларға хирургиялық көмек көрсететін жағдайлармен таныстыру;
- емдік мекемелерінде және үйде науқасқа хирургияның теориялық және тәжірибелік негіздерін үйрету;
- кәсіптік этика және деонтология процесстерін үйрету;
- хирургиялық шаралармен таныстыру және үйрету;
- хирургиялық жағдайда науқасқа дәрігерге дейінгі көрсетілетін көмек дағдыларын үйрету.

**5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.**

1. Хирургиялық науқастарды тексеру әдістері
2. Клиникалық зерттеу әдістері туралы (жоспар бойынша ауру тарихы )
3. Жалпы клиникалық тексеру. Визуалды тексеру.
4. Дене мүшелерін немесе бөліктерін өлшеу ( пальпация, перкуссия, аускультация)
5. Зертханалық зерттеулер, гистологич., цитологич., ОАК, қанның биохимиялық талдауы, зәрдің жалпы талдауы, иммунолог., микробиолог.

### Хирургия тарихы

Қазақ жеріне Ресейден бірінші болып 1832 жылы Александр Андреевич Сергачев дейтін дәрігер келіпті. Оның орнына келген Василий Евланов деген дәрігер 15 кісіге шақталған орны бар кішігірім аурухана ашыпты. Қылشاға қарсы күрес жүргізе алатын мамандардың бірі болып Абдул-Халық Юсупов молданың есімі аталса, Хайрулла Бараев деген қазақ жігіті үш жыл ішінде 109 балаға екпе жасапты. 1867-1868 жылдары қазақ жеріндегі әрбір уездің дәрігерлерін, фельдшерлері мен акушерлерді патша өкіметі тағайындалап отырған. 1880 жылы Омбы қаласындағы фельдшерлік мектепті 5 қазақ жігіті бітіріп, фельдшер деген атақ алғып шықкан еді. Әміре Айтбакин деген қазақ жігіті 1894 жылы Томск қаласындағы медициналық оқу орнын бітіріп, тұнғыш қазақ дәрігері деген атақпен еліне оралады. Ұлы Қазан төңкөрісіне дейін Қазақстан жерінде дәрігерлік жоғары білімі бар 23 қазақ болды. Осылардың көбі кейін советтік медицинаның алға басуына белсене қатысты. Мысалы, дәрігер С.Д Асфендияров партия кенес қызметіне жан аямай еңбек етіп, Алматыда Қазақстанның тұнғыш медицина институтының қабырғасын Қусепқалиев, Х.Х. Досмухамедов, А.Ю.Ниязов, Т.Қасаболатов, М.М. Шомбалов сияқты

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

азаматтар еңбек етіп қоймай, төңкеріс ісіне де белсене қатынасқаны белгілі. Төңкерістен кейінгі жылдары бүкіл Қазақстан жерінде медициналық көмек көрсету ісі төмендегі цифrlардан көрінеді. 1903жылы Қазақстан бойынша 528 орынды 48 аурухана болса , 1914 жылы 1800 орынды 96 ауруханаға жетті. Бұлардың көбі ірі қалаларда орналасқан. Жалпы дәрігерлердің саны -196 болса, орта дәрежелі медициналық қызметкерлер саны -300-ге жеткен. 1917 жылы Қазақстан жерін мекендеген халықтың саны 5 миллион 600 мың адам болса, оларды емдеуге 244 дәрігер, 393 фельдшер мен акушерлер, 98 аурухана қызмет еткен.1919 жылғы шілде айының 10-шы жүлдізында В.И. Ленин Қыргыз (Қазақ) өлкесін басқару үшін Революциялық комитет құру туралы тарихи декретке қол қойды. Осы ревкомның қаулысы бойынша Қыргызстанның (Қазақстанның )денсаулық сақтаубөлімі құрылып, оның бастығы ретінде Ольга Николаевна Шишкинав деген дәрігер тағайындалды. Қыргыз (Қазақ) Автономиялық Кеңес Социалистік Республикасы құрылысын деген тарихи декретке 1920 жылғы тамыз айының 26-шы жүлдізында В.И. Ленин мен М.И. Калинин қол қойды. Осы декрет бойынша Денсаулық сақтау ісінің халық Сергеевич Шамов тағайындалды.1921 жылғы мамырдың 15-ші жүлдізы құні денсаулық сақтау қызметкерлерінің Бүкіл қазақстандық тұнғыш съезі ашылды. Денсаулық сақтау ісінің жаңаша дамуымен байланысты республикамызда өлгендердің саны азайып, өмірге келушілердің мөлшері арта бастады. Эрбір 1000 адамға шаққанда қосылып отырған адам мөлшері 1938 жылы -16,5% болса, 1940 жылы бұл көрсеткіш- 19,5%-ке жетті. Қазақстан жерінің түкпір-түкпірінде тұратын халықтың денсаулығын жақсарту үшін дәрігерлер, ауруханалар көптеп керек болды. Сол себептен 1931 жылы Алматы қаласында медицина институты ашылды, 1940 жылы оны 535 дәрігер бітіріп шықты, оның 118-і қазақ. Осы институттың қабырғасында 1935-1940 жылдары 10 адам медицина ғылыминың докторы, 19 адам медицина ғылыминың кандидаты деген ғылыми атаққа ие болу үшін дессертациялар қорғады. Көптеген майданнан оралған хирургтер, атап айтқанда, Михаил Иванович Брякин, Татьяна Павловна Денягина, Әкрам Сәлімұлы Ыдырысов, Алмағамбет Бекішұлы Дайыров, Г.Е. Вознесенский, доцент К.И. Ыбраев, Х.д. Гайсин, Н.С. Сулейменов, М.Т. Мәткәрімов, тағы басқалары кейінірек республика және одақ бойынша атағы шыққан профессорлар болды. Соғыс жылдары көптеген госпитальдар көшірілгені мәлім. Сондай мекемелерде терең білімімен, дәрігерлік шеберлігімен, адамгершілігімен көзге түскендер: А.Н.Сызганов, В.И. Зюзин, Х.А. Барлыбаев, Б.А. Алалықин, М.К. Тілеуғабылов, С.И.Телятников, Р.А: Сәтпаева, Х.Е. Мырзалиева, Г.Н. Удинцев, И.С. Баккал, А.П. Полосухин, В.В. Зикеев және басқалары. Соғыс жылдары республикамызда медицина саласында ғылыми-зерттеужұмыстары тоқтаған жоқ. Зерттеу жұмыстары жарапы жауынгерлердің, соғыс мүгедектерінің денсаулығын қалпына келтіру қамына қарай бағытталып отырды: 1944-1945 жылдары Қазақ ССР Ғылыми академиясының жанынан өлкелік патология Ғылыми-зерттеу институты, физиология институты, эксперименттік хирургия ғылыми-зерттеу институты ашылды. Согые үйленіп аяқталып, тың көшуден кейінгі жылдары Қазақстанда ірі каналдарында: семейде (1950), Қарағандыда (1964), Ақмолада (1967), Ақтөбеде (1953) медицина институты ашылды,

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA</b> <i>-1979-</i>	<b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы		044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық		54 беттің 1 беті

хирургтарды саны - 1950 жылмен салғанда 1966 жылы 44-тен 1578-ге дейін, акушергинеколог гинекологтар 391-ден 1317-ге, травматолог пенортопедтер саны 11-ден 158-ге, урологтар саны 7-ден 131-ге, онкологтар саны 15 - тен 22-ге, кулак, Мурын, комей ауруларын емдейтінгерлер саны 76-дан 406-га, ешкі дарирлерін саны 117-ден 465-ге ке дейін ОСИН еді. 1963 жылы алматы қаласында дарирлерді мамандықтарын жетілдіру институттары ашылды, 1934 жылы Алматы медицина институтында Жалпы хирургия кафедралары курылды, кафедралар куруга және сонадан эрі әзірлеу күшин салған аллександр николаевич Сызганов еді. 1961 жылға дейін кафедра менгерушісі болып келген аллександр николаевич хирургия саласындағы ашқанжандары үшін келе-кеle академик атын алды, сонан сон кафедраны 1981 жылға дейін А. н.сызғановтын шәкіргі профессор Қожахмет шуақұлы Шуақов басқарып келді. бұл кіші зейнеткерлікке шық Каннан сон орнына келген В.Л. головачев алты жылдай сибек етті. алматы медицина институтының Жалпы хирургия кафедрасын менгерушісі болып табылады, онда медицина ғылымдарының докторы, профессор Қалыбек дурманұлы дурманов белсене қызмет аткарып жүр.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жүппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Ситуациялық есеп:**

1.35 жастағы ер адам іштің ауырсынуына шағымданған аурухананың қабылдау бөліміне жеткізілді. Шамамен 8с бұрын ұрып-соғып, белгісіз. Орташа ауырлық жағдайы. Тамыр соғуыминутына 104 соққы, артериялық қысымы-120/80мм. рт.өнер. тіл құрғақ, құрғақ. Іштің алдыңғы қабырғасы тыныс алу актісіне қатыспайды, шиеленіседі. Іші ауырады, төмөнгі бөлімдерде көбірек. Бауыр түтігі сақталады. Щеткин-Блумберг симптомы оң. Бір әлсіз перистальтикалық шу естіледі. Қан анализі: лейкоциттер-16.4x109 л, таяқша ядролық нейтрофилдер-8%. Ерекшеліктері жоқ зәр анализі. Науқастың отырған жағдайындағы іштің шолу рентгенограммасында диафрагма күмбезінің астындағы бос газ анықталмайды. Ма деген сөздер алып тасталысын зардал шегуші алшақтық талшығын органының? Емдеу тактикасы қандай болуы керек?

## 2- сабак

**5.1. Сабактың тақырыбы.** Хирургиялық инфекцияның алдын- алу.  
Асептика.Антисептика және залалсыздандыру әдістері.

**5.2. Сабактың мақсаты:** оқушыларға хирургияда дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің теориялық және тәжірибелік дағдыларын үйрету.

<b>OÝTÝSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

### 5.3. Пәннің міндеттері:

- оқушыларға хирургиялық көмек көрсететін жағдайлармен таныстыру;
- емдік мекемелерінде және үйде науқасқа хирургияның теориялық және тәжірибелік негіздерін үйрету;
- кәсіптік этика және деонтология процесстерін үйрету;
- хирургиялық шаралармен таныстыру және үйрету;
- хирургиялық жағдайда науқасқа дәрігерге дейінгі көрсетілетін көмек дағдыларын үйрету.

### 5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

- Емдеу - алдын алу мекемелерінің жұмысының принциптері;
- Қабылдау жәні хирургия бөлімінің құрылымы, жұмысы;
- Операция бөлімінің және емханадағы хирург бөлмесінің жабдықталуы;
- Операция және хирургия бөлімінің санитарлы-эпидемиологиялық тәртібі;
- Инфекцияның ену жолдары және алдын алу шаралары;
- Заарсыздандыру тәсілдері;
- Асептика даму тарихы;
- Жараны эндогенді инфекциялануын ескеरту.

**Асептика-инфекциялардың жарақатқа түсуінің алдын алу шаралары.** Инфекцияның таралуының екі жолы ажыратылады: эндогенді және экзогенді.

#### 1 .Инфекцияның экзоген тарқалу жолы:

А) ауа арқылы (ауа инфекциясы)

Б) сүйкіткіш тамшы жарақатқа микроскопик бөлекшелер күйінде (сөйлегенде, жетелгенде, шүкіргенде)

В) контактты инфекция жарақатқа-тігу материалдарымен, дренаждармен, жарақатта естен шығып қалдырылған бөгде заттармен, аспаптармен.

II Эндоген жолмен ілгеріден организмде бар инфекцияның ота жасалғаннан кейін қан немесе лимфа жүйесімен тарқалуы

**Фюбрингер әдісі-ілгері** әдістен ерекшелігі 96 -спирт орнына 70° спиртпен 3 минут өндейді. Фюбрингер алғаш сулеманың 5:1000 ерітіндісімен өндеуді кіргізген. Кейінгі кездерде қолданылып жатқан дәрілерге: а) С-4 ерітіндісі немесе Первомур. Қолды 1-2минут өндейді. б) Гибинат-хлоргексидин биглюконат ерітпесі (20% хлоргексидин биглюконаты 70 спиртпен 1:40 қатынасында араластырады). Қолды тазартып жуғаннан кейін осы антисептикпен 2-3минут өндейді. в) Йод препараттары - йодинол, йодонат, йодопирон; г) Роккал д) дегмин, деоцид, дегмацид-құрамында сынап бар препараттар(улы заттар). Қолды жуудың ерекшеліктері бар. Қолды щеткамен жуғанда ағын су қолданылады: Ілгері білекті, алақанды ылғалдайды, кейін стерилденген щеткаға сабын жағып көпіртіп алақан, қолдың сырты, бармақтардың ұшы, тырнақтар бармақ аралығы кейін жоғарғы ұштігіне дейін жуылады. Жуу аяқталғаннан кейін білек жарым бүгілген

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

жағдайда, бармақтарды жоғары ұстау қажет. Операцион майданын даярлау. Операцион майданы Филончиков әдісімен өндөледі, 10% -йод тұнбасымен 5-10 минут ішінде 2 рет өндөледі, кейін теріні тірілтуден ілгері, жараға тігіс қоюдан ілгері және тігіс қойылғаннан соң жас балаларда 1-брилиант жасылы қолданылады. Баккал әдісі бойынша. Тігу материалдарын стиризациялау. Жібектен даярланған сабакты Кохер әдісімен стерилизациялайды-ол 5 - кезеңнен тұрады: 1-кезең механикалық тазалау. Жіп түйіндерін сабындал ыстық суда жуып , су таза болғанша жуған. Стерил сұлгімен құрғатады да, шиши катушкаларга орайды. 2 кезең - 24 сагат Эфирге салып майсыздандырады. 3 кезең- қатайтыру және стерилизация.Бұл үшін маска,стерил қолқап киіп,пинцетпен катушкаларды қайнап тұрган сулема ерітіндісінде 2минут қайнаталы. Кейін аузы бекітілетін банкаларда 96° спиртте сақтайды. 2 күннен кейін бактерияға тексереді, егерде жауабы сол болса жіпті қолдану мүмкін.Қайта сынап тексеру әр 10күнде қайталанады. Банкаға жіптін номері, тексерілген күні жауабы жазылады. Персин әдісі. Антисептик есебінде кояды.Диоцидтін 1:1000 ерітіндісінде 24сағатқа қояды. Кейін 1:5000 ерітіндісінде сактайтыды. Ат қылын стерилизациялау.Ат қылы негізінен мойында,бетте пластика ота жасағанда қолданылады. Ат қылын тазалауга стерилизациялауға коп коніл бөлінеді, себебі ат қылы беткейінде ірін шакыруши микроорганизмдермен бірге анаэроб инфекцияда болады. Ат қылын даярлау әдісі 5 - кезеңнен тұрады: 1-кезең механикалық өңдеу-жуатын заттармен жаксылап кайтара жуылған судағы көбіктін рені таза болғанша жуу. 2-кезең майсыздандыру - қылдарды бөліп, өріп бензинде сактау 7-таулік 3 - кезең стерилизациялау дистилляцияланган суда 40 минут кайнату, бояу жогалғанша суды өзгертіп тұру 4-кезең қылды стерил сұлгімен курғатады да 7 - таулікке 96 спиртте сактайтыды 5-кезең кейін 96 спертті баска банкага салып сактайтыды Стерилдігіне әр 10 кунде тексеріліп спирт ауыстырылады.

### **Кетгутты стерилизациялау.**

**Кетгут** - сорылатын жіп, койдың ішегінің сероз буышық ет кабаттарынан даярланады.

Кетгут Ситковский әдісі бойынша йод буында стерилизацияланады. 4 - кезеңнен тұрады:

**1-кезең** - майсыздандыру кетгутты эфирде 24 сагат сактайтыды

**2 - кезең** - кейінгі кезеңдерді операционныйда стерил жағдайда өткізіледі. Белшектеген сабактарды боялмаган сулеманын 1:10000 ерітіндісімен сұртеді.

**3-кезең** йод буы женіл сіну үшін 2% калий йод ерітіндісін сіндіреді. Кетгут жібінін калындығына сайкес көрсетілген ерітінділе 30С - 1,2,4 минут сактайтыды.

**4 кезең** йод буымен стерилизациялайды. Кетгут жібін денгелетіп орап жуан сабактарға байлай ауызды тығындалатын банкіге 60-70 мм тубіне йод кристалы салынады 3 литрлікке 30 г есебінде алынады. Банкі тығындалып стерил салфеткамен оралады.

Кетгутті бактериал сынак сол нәтиже бергенде колдануга руксат беріледі. Губарев әдісі - кен таралған стерилизация. Люгольдін спиртті ерітіндісінде откізіледі. 3-кезеңнен тұрады: 1 кезең - майсыздандыру, оралған кетгутті 12-24 сагат эфирде сактайтыды. 2 кезең - эфирді төгіп Люгольдін спиртті ерітіндісі куйылады. Кетгут сабагынын калындығына сәйкес 8-10 таулік сактайтыды. Суыктын кетгут жіптерінен >-3 см жогары болуы кажет. 3 кезең

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық	044-67/11 54 беттің 1 беті

істетілген Люголь ерітіндісін төгіп жанартады. 8-10 сактап, бактериологик сынак сол нәтиже берсе істету мүмкін. Таляр кеттегут Люголь ерітіндісінде сакталады, әр 8-10 тауліктे өзгеріп тұрады.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тест сұрақтары:**

1. Хирург қолын С-4 ерітіндісімен залалсыздандыру уақыты:
  - A. 1 мин.
  - B. 2 мин.
  - C. 3 мин.
  - D. 5 мин.
  - E. 10 мин.
2. Ауа инфекциясының алдын-алу шарасына жатпайды:
  - A. операция жасайтын алаңын өндеу
  - B. бактерицидті лампа
  - C. желдету
  - D. бетперде тағу
  - E. баҳила, қалпақ киу
3. Операция жасайтын аймақты ... әдісімен залалсыздандырады.
  - A. Гроссих-Филончик
  - B. Лукашевич-Оберст
  - C. Спасокукоцкий - Кочергин
  - D. Альфельд
  - E. Флюрбрингер
4. Химиялық және антибактериальді дәрі дәрмектерді жарадағы іріңмен күресу ... үшін қолданады.
  - A. емдік-алдын алу
  - B. иммуноды нығайту
  - C. дезинтоксикаилау
  - D. иммуноды қалыптастру
  - E. детоксикаилау
5. Операция бөлімшесінде ... қолданылмайды.
  - A. арнайы жинау
  - B. таңертенгілік жинау
  - C. ағымдыш жинау
  - D. күнделікті жұмыс сонында жинау

<b>OÝTÝSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

- E. отаудан кейінгі жинау
6. Антисептика түріне жатпайды:
- A. термиялық
  - B. механикалық
  - C. физикалық
  - D. химиялық
  - E. биологиялық
7. Антисептиканың негізін қалаушы ғалым:
- A. Д. Листер
  - B. М.Я. Преображенский
  - C. А.А. Чаруковский
  - D. Бергманн
  - E. Субботин
8. Антибиотиктерді қабылдаған кездегі болатын асқыну:
- A. дисбактериоз
  - B. пневмония
  - C. паротит
  - D. плеври
  - E. перитонит
9. Протеолиттік фермент:
- A. Трипсин
  - B. Декарис
  - C. Тимолин
  - D. Ритмилен
  - E. Кевзол
10. Физикалық антисептика әдісі:
- A. жараны жуу, тұтікшелеу
  - B. жараны біріншілік хирургиялық өндөу
  - C. қан құю
  - D. өлген тіндерді алып тастау
  - E. антибиотиктерді енгізу

**Ситуациялық есеп: №1.** Медбике ірінді операциядан кейін барлық құрал-саймандарды, скальпель, пышақ, тігіс және инъекция инелерін алдымен ағынды суда, кейін бір сағат сода ерітіндісінде қайнатты. Медбикенің іс-әрекеті дұрыс па?

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық	044-67/11 54 беттің 1 беті

### 3- сабак

**5.1. Сабактың тақырыбы.** Хирургиялық операциялар.

**5.2. Сабактың мақсаты:** оқушыларға хирургияда дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің теориялық және тәжірибелік дағдыларын үйрету.

**5.3. Пәннің міндеттері:**

- оқушыларға хирургиялық көмек көрсететін жағдайлармен таныстыру;
- емдік мекемелерінде және үйде науқасқа хирургияның теориялық және тәжірибелік негіздерін үйрету;
- кәсіптік этика және деонтология процесстерін үйрету;
- хирургиялық шаралармен таныстыру және үйрету;

**5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.**

- Операция түсінігі;
- Операция түрлері және этаптары;
- Операция көрсеткішін және қарсы көрсеткішін;
- Науқасты операцияға дайындау;
- Операциялық қалып;
- Оперативті көздеу, іс - әрекет.

**Операция алдындағы кезең** – науқас аурухананың хирургиялық бөлімшесіне түскен сәттен бастап операция басталғанға дейінгі кезең, оның барысында емдеуге бағытталған шаралар кешені жүргізіледі науқасты операцияға дайындау. Операция алдындағы кезең шартты түрде 2 кезеңге бөлінеді: диагностикалық және операция алдындағы деруу дайындық кезеңі. Операция алдындағы дайындықтың барлық шаралары негізінен хирургиялық араласу қаупін азайтуға және операциядан кейінгі ықтимал асқынулардың алдын алуға немесе оның ауырлығын азайтуға бағытталған. Сондай-ақ хирург, анестезиолог және басқа операцияға қатысуышыларды оқытуды қарастырады, астында! операциялық блокты және хирургиялық аспаптарды жасау. Бүкіл операция алдындағы дайындықтың күрделілігіне, патологиялық процестің ерекшеліктеріне, операцияның жеделдігіне, п.п. ұзақтығына байланысты басқаша болады. Қазіргі хирургия тәжірибесінде төмендеу үрдісі байқалады Р.р.. ауруханаішілік инфекция қаупіне байланысты, әдетте онымен кеңінен қолданылатын антибиотиктер және онымен инфекция қаупі операция алдындағы науқастар. Кейбір жағдайларда операцияға жалпы дайындық, эндокринологияның мамандандырылған бөлімшелерінде жүргізіледі, кардиологиялық, емдік негіздемелер операция, дәрігер қысқаша эпикреция жасайды операцияның қажеттілігі оның сипаты мен анестезия түрін анықтайды. Және операция алдындағы қажетті кездесулерді жасайды.

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA —1979—</b> <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>«Клиникалық пәндер» кафедрасы</b>	044-67/11
<b>Әдістемелік нұсқаулық</b>	54 беттің 1 беті

Науқас операцияға келісімі туралы қолхат, операцияға келісімі туралы қолхат алады. Науқасты операцияға дайындаудың жалпы шаралары. Жүйке жүйесін дайындау. Операция алдында дерлік әрбір науқас жүйке кернеуі жағдайында болады. Әсіресе егде жастағы адамдарда аурудың сипатына байланысты ауырсынудан қорқу жүйке жүйесінің шамадан тыс кернеуіне әкелуі мүмкін, осыған байланысты оларда сұық тер пайдада болады. ауыздың құрғауы, гиперадреналинемия және т.б. бір мезгілде профилактикалық хирургиялық шок және хирургиялық араласу кезінде мүмкін болатын бірқатар басқа да асқынулардың қызметін атқаратын осы құбылыстардың алдын алуды мұқият жүргізіңіз.

Хирургиялық бөлімшедегі жұмысты ойластырылған ұйымдастыру маңызды рөл атқарады, бұл операцияны қүтіп тұрған пациенттердің оны жаңадан өткен үлкен адамдармен байланысын болдырмайды, оларды көру ынқылдау, құсу, қанға малынған таңғыштар тудыруы мүмкін. қын эсер. Анестезиолог тағайындаған анестезияға дейінгі дәрі-дәрмектің жүйке жүйесі үшін қорғаныстық мәні бар. Нәтижесінде жүйке кернеуі операция алдында бірден төмендейді, науқас түнде ұйықтайты, тыныштық күйі. Жүректамыр жүйесін дайындау және қан құрамын қалыпқа келтіру. Жүрек-тамыр жүйесінің қалыпты белсенделілігімен шағын және орташа операциялар науқастың арнайы дайындығының орындалады. Жүрек-тамыр жүйесі функциясының органикалық өзгерістерсіз аздалап әлсіреуі кезінде әдетте кордиаминді немесе жүрек гликозидтерінің бірін бірнеше күн бойы ішке және көктамыр ішіне тағайындау жеткілікті, бірақ 20-40 мл 40% глюкоза ерітіндісі бар. аскорбин қышқылының 3 мл 5% ерітіндісін қосу, үлкен операцияларға дайындық аталған әрекеттерді ұзағырақ орындауда көрінеді. Жүректің және қан тамырларының органикалық закымдалуымен тиісті арнайы агенттер қосылады - гипотензивті, вазодиляциялық, спазмолитикалық. Үлкен операциялар әдетте айтарлықтай қан жоғалтумен байланысты екенін ескере отырып, олардың алдында 200- 250 мл бір реттік немесе қайталанатын қан құйылады. Жоспарланған операциялар етеккір кезінде тағайындалмайды, өйткені оларда; қан кетудің жоғарылауы және организмнің биологиялық реактивтілігінің төмендеуі байқалады. Тромбоздың және эмболияның алдын алу үшін, әсіресе варикозды тамырлар, флебит немесе тромбофлебит және тазалаумен ауыратын науқастарда, сондай-ақ әдетте бейім адамдарда. Операция алдындағы кезеңдегі қарқынды терапияның негізгі міндеті болып табылады өмірлік маңызының бұзылуын барынша толық өтеуге қол жеткізу ағзаның функциялары мен жүйелері. Операция алдындағы дайындық мыналарды қамтиды: психологиялық дайындық; өмірлік маңызды органдарды дайындау (CVS, DS, MVS және т.б.), гомеостаз жүйелерінің бұзылуын түзету; операцияға арнайы дайындық (ішек тазалау және т.б.); тікелей дайындық: - хирургиялық алаңды алдын ала дайындау; - бос асқазан - қуық бос - премедикация. Науқасты тыныштандыруға, операцияның қолайлы нәтижесіне сенімін оятуға бағытталған психологиялық дайындық қажет. Науқас операцияның бұлтартпастығын және оны орындау қажеттілігін түсіндіруі керек (жоспарланған операциялар үшін седативтер бір күн бұрын тағайындалады). Операциядан 30 минут бұрын науқасқа есірткі заттары кіретін

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA</b> <i>-1979-</i>	<b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>«Клиникалық пәндер» кафедрасы</b>		044-67/11 54 беттің 1 беті
<b>Әдістемелік нұсқаулық</b>		

премедикация беріледі. Өмірлік маңызды органдар мен жүйелерді дайындау маңызды. Өмірлік бұзылыстарды өтеуге қол жеткізу қажет ағзаның функциялары мен жүйелері. Бұзушылықтарды ғана емес өтеу керек негізгі хирургиялық аурумен байланысты органдар мен жүйелердің функционалдық жағдайы, сонымен қатар әртүрлі қатар жүретін аурулар (тыныс алу, қан айналымы, бауыр, бүйрек). Функцияның мүмкін болатын толық өтеміне қол жеткізу мәселесі әлі де бар тіпті шұғыл (шұғыл) хирургиялық араласуға байланысты уақыт қысымы жағдайында. Бұл ретте барлық бұзушылықтар бір мезгілде түзетілуі керек. Операция алдындағы дайындық адекватты, қарқынды және болуы керек мүмкіндігінше қысқа. Гиповолемиямен ауыратын науқастарда, оның белгілері жүрек тондарының керендейтін, тамырлардың құлауы, төмен қан қысымы және CVP және т.б., суэлектролит балансының бұзылуы, қышқыл негіз биохимиялық қан анализі арқылы анықталған жағдайларdereу жоғары және төмен молекулалық декстраттарды, суэлектролит ерітінділерін, ерітінділердің құюды қоса, инфузиялық терапияны бастау глюкозаны инсулинмен, сілтілі ерітінділермен. Өмірге қауіп төнген кезде қан жоғалту, эритроциттердің суспензиясы, плазма, толық қан енгізіледі. Инфузиялық терапиямен бір мезгілде жүрек-тамыр агенттері қолданылады. Тыныс алу жеткіліксіздігімен курсу - оттегі терапиясы, қан айналымын қалыпқа келтіру, бронходилататорларды қолдану, төтенше жагдайларда, өкпенің жасанды желдетуін жүзеге асырады. Операция алдындағы дайындауға бағытталған. Наркозды эвакуациялау алдында асқазанның мазмұны қажет - асқазанды шаю зондпен жүзеге асырылады. Сондай-ақ қыықты босату қажет. Науқас болмаса өз бетінше зәр шығаруы мүмкін - қыықтың катетеризациясы резенке немесе металл катетер арқылы жүзеге асырылады. Хирургиялық өріс аймағындағы шаш сызығы қырылған. Элективті хирургияда мұқият тексеруге болады науқас және науқасты операцияға арнайы дайындауға уақыт бар. Олар тыныс алу, қан айналымы, асқазан-ішек жолдары, бауыр және бүйрек функцияларының бұзылуын түзетеді. О.С.К., ақуыз және суэлектролит балансын қалыпқа келтіру үшін инфузиялық терапияны жүргізу, қышқылнегіз балансы. Қажет болса, парентеральды тамактануды жүргізініз. Операция қарсаңында науқасқа тазарту клизмасы беріледі. Науқас гигиеналық ванна немесе душ қабылдайды, содан кейін іш киімін және төсек-орын жабдығын ауыстырады. Науқас кешкі ас ішпейді, операция алдында таңертең тамақ ішпейді. Науқаста асқазаннан эвакуация бұзылса (ойық жаралы стенозда, өту немесе ісік) кешке және таңертең асқазан арқылы жуылады зонд. Таңертең науқастың шашы хирургиялық аймақта қырылады. Науқасты жоспарлы операцияға дайындау процесінде эндогендік инфекцияның алдын алады - созылмалы инфекция ошақтары анықталып, санитарлық тазартылады. инфекциялар (созылмалы тонзиллит, кариес, фарингит, терінің және жұмсақ тіндердің пустуляры) аурулары және басқа созылмалы қабыну аурулары). Менструация кезінде жоспарланған операцияларды тағайындауға болмайды, ейткені бұл күндері қан кетудің жоғарылауы және дененің реактивтілігінің төмендеуі байқалады. Бір күн бұрын седативтер тағайындалады. Операциядан 30 минут бұрын премедикация жүргізіледі, оның

<b>OÝTÝSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық	044-67/11 54 беттің 1 беті

құрамына промедол (есірткі анальгетиктер); атропин (М-холинолитин) сілекей бөлуді азайту үшін, ол анестезияға кедергі келтіреді; антигистаминдер (димедрол, пипольфен). Осыдан кейін науқасты гурнеде операция бөлмесіне апарады және операцияны орындау үшін қажетті позицияға сәйкес келеді.



**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жүппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тест сұрақтары:**

1. Шұғыл отау көрсеткіші тән емес:

- A. құрғақ гангрена
- B. би спецификалы гангрена
- C. ылғалды гангрена
- D. спецификалы гангрена
- E. диабетті гангрена

2. Аппендоэктомияға отау алды дайындыққа тән емес:

- A. тазалау клизмасы
- B. психологиялық дайындау
- C. примедикация
- D. отау жасайтын жерді тазалау
- E. түктөрді қыру

3. Операциядан кейінгі болатын тромбоэмболикалық асқынуына себеб бола алмайды:

- A. жараның аурсынуы
- B. кан кету
- C. гематома
- D. инфильтрат
- E. эвентерация

4. Лапаротмиядан кейінгі жараны ашылуына себеб бола алмайды:

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

- A. массивті инфузиялық терапия  
B. іш құысының жоғарғы қысымы  
C. гематома  
D. жараның іріндеуі  
E. апоневроздың әлсін тігілуі
5. Отаудан кейінгі метеоризм кезінде ... болмайды.  
A. спазмолитиктерді қолдануға  
B. перистальтиканы қоздыру ерітінділерін тағайындауға  
C. асқазанды жууға  
D. ішекті гипертониялық ерітіндімен тазалауға  
E. газ шығаратын түтікше қоюға
6. Операциядан кейінгі ерте өкпе асқынуына тән емес:  
A. бронхоэктатикалық ауру  
B. асфиксия  
C. бронхит  
D. ателектаз  
E. пневмония
7. Операциядан кейінгі зәрдің жіті кідіруі кезінде жасалынбайтын шара:  
A. зәр айдайтын дәрі-дәрмектер беру  
B. спазмолитиктер беру  
C. паранефральды новокаинды тежеу  
D. эпистостоманы қою  
E. қуықты катетерлеу
8. Отау кезеңдеріне (этап) тән емес:  
A. наркоздан шығуы  
B. операцияның бітуі  
C. операциялық іс-әрекет  
D. операция аланды тазалап, жансыздандыру  
E. операция қалпы
9. Операциядан кейінгі кезеңде зәрдің тежелуінде дәрігердің іс-әрекеті:  
A. катетермен зәрді шығару  
B. қуыққа пункция жасау  
C. паранефральді новокаинді тежеу, бүйірек диатермиясы  
D. қуық үстін жылтыту  
E. тік ішекті клизма арқылы тазарту
10. Перитонитке күмән туғанда диагнозды тұжырымдау үшін міндетті түрде ... кажет.  
A. жедел лапароскопия жасалу  
B. қанмен зәрдің жалпы клиникалық анализі алыну  
C. 1 сағаттан соң қайта тексеру  
D. іш құрсағын жалпы рентгеноскопия жасалу

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық	044-67/11 54 беттің 1 беті

Е. УДЗ жасалу

**Жағдайлық есеп:** 75 жастағы М., атты науқас сокыр ішек операциясынан кейін наркозда жатқан. 15 минуттан кейін науқас кенеттен көгерген. Тынысы сиреген, үзіліспен. Науқаста операциядан кейін қандай асқыну болды? Сіздің іс-әрекетіңіз?

#### 4- сабак

**5.1. Сабактың тақырыбы.** Хирургиялық операциялар.

**5.2. Сабактың мақсаты:** оқушыларға хирургияда дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің теориялық және тәжірибелік дағдыларын үйрету.

**5.3. Пәннің міндеттері:**

- оқушыларға хирургиялық көмек көрсететін жағдайлармен таныстыру;
- емдік мекемелерінде және үйде науқасқа хирургияның теориялық және тәжірибелік негіздерін үйрету;
- кәсіптік этика және деонтология процесстерін үйрету;
- хирургиялық шаралармен таныстыру және үйрету;

**5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.**

- Операция түсінігі;
- Операция түрлері және этаптары;
- Операция көрсеткішін және қарсы көрсеткішін;
- Науқасты операцияға дайындау;
- Операциялық қалып;
- Оперативті көздеу, іс - әрекет.

**Операция алдындағы кезең** – науқас аурухананың хирургиялық бөлімшесіне түскен сәтten бастап операция басталғанға дейінгі кезең, оның барысында емдеуге бағытталған шаралар кешені жүргізіледі науқасты операцияға дайындау. Операция алдындағы кезең шартты түрде 2 кезеңге бөлінеді: диагностикалық және операция алдындағы дереге дайындық кезеңі. Операция алдындағы дайындықтың барлық шаралары негізінен хирургиялық араласу қаупін азайтуға және операциядан кейінгі ықтимал асқынулардың алдын алуға немесе оның ауырлығын азайтуға бағытталған. Сондай-ақ хирург, анестезиолог және басқа операцияға катысушыларды оқытуды қарастырады, астында! операциялық блокты және хирургиялық аспаптарды жасау. Бұкіл операция алдындағы дайындықтың күрделілігіне, патологиялық процестің ерекшеліктеріне, операцияның жеделдігіне, п.п. ұзақтығына байланысты басқаша болады. Қазіргі хирургия тәжірибесінде төмендеу үрдісі байқалады Р.р.. ауруханаішілік инфекция қаупіне байланысты, әдетте онымен кеңінен қолданылатын антибиотиктер және онымен инфекция қаупі операция алдындағы науқастар. Кейбір жағдайларда операцияға жалпы

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

дайындық, эндокринологияның мамандандырылған бөлімшелерінде жүргізіледі , кардиологиялық, емдік негіздемелер операция, дәрігер қысқаша эпикреция жасайды операцияның қажеттілігі оның сипаты мен анестезия турін анықтайды. Және операция алдындағы қажетті кездесулерді жасайды.

Науқас операцияға келісімі туралы қолхат, операцияға келісімі туралы қолхат алады Науқасты операцияға дайындаудың жалпы шаралары. Жүйке жүйесін дайындау.

Операция алдында дерлік әрбір науқас жүйке кернеуі жағдайында болады. Әсіресе егде жастағы адамдарда аурудың сипатына байланысты ауырсынудан қорқу жүйке жүйесінің шамадан тыс кернеуіне әкелуі мүмкін, осыған байланысты оларда сұық тер пайда болады. ауыздың құрғауы, гиперадреналинемия және т.б. бір мезгілде профилактикалық хирургиялық шок және хирургиялық араласу кезінде мүмкін болатын бірқатар басқа да асқынулардың қызметін атқаратын осы құбылыстардың алдын алууды мұқият жүргізініз.

Хирургиялық бөлімшедегі жұмысты ойластырылған ұйымдастыру маңызды рөл атқарады, бұл операцияны күтіп тұрған пациенттердің оны жаңадан өткен үлкен адамдармен байланысын болдырмайды, оларды көру ыңқылдау, құсу, қанға малынған таңғыштар тудыруы мүмкін. қын әсер. Анестезиолог тағайындаған анестезияға дейінгі дәрі-дәрмектің жүйке жүйесі үшін қорғаныстық мәні бар. Нәтижесінде жүйке кернеуі операция алдында бірден төмендейді, науқас түнде ұйықтайды, тыныштық қүйі. Жүректамыр жүйесін дайындау және қан құрамын қалыпқа келтіру. Жүрек-тамыр жүйесінің қалыпты белсенділігімен шағын және орташа операциялар науқастың арнайы дайындығының орындалады. Жүрек-тамыр жүйесі функциясының органикалық өзгерістерсіз аздалап әлсіреуі кезінде әдетте кордиаминде немесе жүрек гликозидтерінің бірін бірнеше күн бойы ішке және көктамыр ішіне тағайындау жеткілікті, бірақ 20-40 мл 40% глюкоза ерітіндісі бар. аскорбин қышқылының 3 мл 5% ерітіндісін қосу, үлкен операцияларға дайындық аталған әрекеттерді ұзағырақ орындауда көрінеді. Жүректің және қан тамырларының органикалық зақымдалуымен тиісті арнайы агенттер қосылады - гипотензивті, вазодилляциялық, спазмолитикалық. Үлкен операциялар әдетте айтартлықтай қан жоғалтумен байланысты екенін ескеरе отырып, олардың алдында 200-250 мл бір реттік немесе қайталанатын қан құйылады. Жоспарланған операциялар етеккір кезінде тағайындалмайды, өйткені оларда; қан кетудің жоғарылауы және организмнің биологиялық реактивтілігінің төмендеуі байқалады. Тромбоздың және эмболияның алдын алу үшін, әсіресе варикозды тамырлар, флебит немесе тромбофлебит және тазалаумен ауыратын науқастарда, сондай-ақ әдетте бейім адамдарда. Операция алдындағы кезеңдегі қарқынды терапияның негізгі міндеті болып табылады өмірлік маңызының бұзылуын барынша толық өтеуге қол жеткізу ағзаның функциялары мен жүйелері. Операция алдындағы дайындық мыналарды қамтиды: психологиялық дайындық; өмірлік маңызды органдарды дайындау (CVS, DS, MVS және т.б.), гомеостаз жүйелерінің бұзылуын түзету; операцияға арнайы дайындық (ішек тазалау және т.б.); тікелей дайындық: - хирургиялық алаңды алдын ала дайындау; - бос асқазан - қуық бос -

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA —1979—</b> <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

премедикация. Науқасты тыныштандыруға, операцияның қолайлы нәтижесіне сенімін оятуға бағытталған психологиялық дайындық қажет. Науқас операцияның бұлтартпастығын және оны орындау қажеттілігін түсіндіруі керек (жоспарланған операциялар үшін седативтер бір күн бұрын тағайындалады). Операциядан 30 минут бұрын науқасқа есірткі заттары кіретін премедикация беріледі. Өмірлік маңызды органдар мен жүйелерді дайындау маңызды. Өмірлік бұзылыстарды өтеуге қол жеткізу қажет ағзаның функциялары мен жүйелері. Бұзушылықтарды ғана емес өтеу керек негізгі хирургиялық аурумен байланысты органдар мен жүйелердің функционалдық жағдайы, сонымен қатар әртүрлі қатар жүретін аурулар (тыныс алу, қан айналымы, бауыр, бүйрек). Функцияның мүмкін болатын толық өтеміне қол жеткізу мәселесі әлі де бар тіпті шұғыл (шұғыл) хирургиялық араласуға байланысты уақыт қысымы жағдайында. Бұл ретте барлық бұзушылықтар бір мезгілде түзетілуі керек. Операция алдындағы дайындық адекватты, қарқынды және болуы керек мүмкіндігінше қысқа. Гиповолемиямен ауыратын науқастарда, оның белгілері жүрек тондарының керендігі, тамырлардың құлауы, тәмен қан қысымы және СВР және т.б., суэлектролит балансының бұзылуы, қышқыл негіз биохимиялық қан анализі арқылы анықталған жағдайлар дереу жоғары және тәмен молекулалық декстраттарды, суэлектролит ерітінділерін, ерітінділерді құюды қоса, инфузиялық терапияны бастау глюкозаны инсулинмен, сілтілі ерітінділермен. Өмірге қауіп тәнген кезде қан жоғалту, эритроциттердің сусpenзиясы, плазма, толық қан енгізіледі. Инфузиялық терапиямен бір мезгілде жүрек-тамыр агенттері қолданылады. Тыныс алу жеткіліксіздігімен күресу - оттегі терапиясы, қан айналымын қалыпқа келтіру, бронходилататорларды қолдану, төтенше жағдайларда, өкпенің жасанды желдетуін жүзеге асырады. Операция алдындағы дайындық кезінде бірқатар процедуralар да орындалады: науқастың мүшелерін дайындауға бағытталған. Наркозды эвакуациялау алдында асқазанның мазмұны қажет - асқазанды шаю зондпен жүзеге асырылады. Сондай-ақ қуықты босату қажет. Науқас болмаса өз бетінше зэр шығаруы мүмкін - қуықтың катетеризациясы резенке немесе металл катетер арқылы жүзеге асырылады. Хирургиялық өріс аймағындағы шаш сыйығы қырылған. Элективті хирургияда мұқият тексеруге болады науқас және науқасты операцияға арнайы дайындауға уақыт бар. Олар тыныс алу, қан айналымы, асқазан-ішек жолдары, бауыр және бүйрек функцияларының бұзылуын түзетеді. О.С.К., ақуыз және суэлектролит балансын қалыпқа келтіру үшін инфузиялық терапияны жүргізу, қышқылнегіз балансы. Қажет болса, парентеральды тاماқтануды жүргізіңіз. Операция қарсанында науқасқа тазарту клизмасы беріледі. Науқас гигиеналық ванна немесе душ қабылдайды, содан кейін іш киімін және тәсек-орын жабдығын ауыстырады. Науқас кешкі ас ішпейді, операция алдында таңертең тاماқ ішпейді. Науқаста асқазаннан эвакуация бұзылса (ойық жаралы стенозда, өту немесе ісік) кешке және таңертең асқазан арқылы жуылады зонд. Таңертең науқастың шашы хирургиялық аймақта қырылады. Науқасты жоспарлы операцияға дайындау процесінде эндогендік инфекцияның алдын алады - созылмалы инфекция ошақтары анықталып, санитарлық тазартылады. инфекциялар (созылмалы

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

тонзиллит, кариес, фарингит, терінің және жұмсақ тіндердің пустулярлық аурулары және басқа созылмалы қабыну аурулары). Менструация кезінде жоспарланған операцияларды тағайындауға болмайды, өйткені бұл күндері қан кетудің жоғарылауы және дененің реактивтілігінің төмендеуі байқалады. Бір күн бұрын седативтер тағайындалады.

Операциядан 30 минут бұрын премедикация жүргізіледі, оның құрамына промедол (есірткі анальгетиктер); атропин (М-холинолитин) сілекей бөлуді азайту үшін, ол анестезияға кедергі келтіреді; антигистаминдер (димедрол, пипольфен). Осыдан кейін науқасты гурнеде операция бөлмесіне апарады және операцияны орындау үшін қажетті позицияға сәйкес келеді.



**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жүппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тест сұрақтары:**

1. Шұғыл отау көрсеткіші тән емес:
  - F. құрғақ гангрена
  - G. би спецификалы гангрена
  - H. ылғалды гангрена
  - I. спецификалы гангрена
  - J. диабетті гангрена
2. Аппендоэктомияға отау алды дайындыққа тән емес:
  - F. тазалау клизмасы
  - G. психологиялық дайындау
  - H. примедикация

<b>OÝTÝSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

- I. отау жасайтын жерді тазалау  
J. түктөрді қыру
3. Операциядан кейінгі болатын тромбоэмболикалық асқынуына себеб бола алмайды:  
F. жараның аурсынуы  
G. кан кету  
H. гематома  
I. инфильтрат  
J. эвентерация
4. Лапаротмиядан кейінгі жараны ашылуына себеп бола алмайды:  
F. массивті инфузиялық терапия  
G. іш қуысының жоғарғы қысымы  
H. гематома  
I. жараның іріндеуі  
J. апоневроздың әлсін тігілуі
5. Отаудан кейінгі метеоризм кезінде ... болмайды.  
F. спазмолитиктерді қолдануға  
G. перистальтиканы қоздыру ерітінділерін тағайындауға  
H. асқазанды жууга  
I. ішекті гипертониялық ерітіндімен тазалауға  
J. газ шығаратын түтікше қоюға
6. Операциядан кейінгі ерте өкпе асқынуына тән емес:  
F. бронхоэкстракциялық ауру  
G. асфиксия  
H. бронхит  
I. ателектаз  
J. пневмония
7. Операциядан кейінгі зәрдің жіті кідіруі кезінде жасалынбайтын шара:  
F. зәр айдайтын дәрі-дәрмектер беру  
G. спазмолитиктер беру  
H. паранефральды новокаинды тежеу  
I. эпизистостоманы қою  
J. қуықты катетерлеу
8. Отау кезендеріне (этап) тән емес:  
F. наркоздан шығуы  
G. операцияның бітуі  
H. операциялық іс-әрекет  
I. операция аланды тазалап, жансыздандыру  
J. операция қалпы
9. Операциядан кейінгі кезенде зәрдің тежелуінде дәрігердің іс-әрекеті:  
F. катетермен зәрді шығару

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

- G. қуыққа пункция жасау  
 H. паранефральді новокаинді тежеу, бүйірек диатермиясы  
 I. қуық үстін жылдыту  
 J. тік ішекті клизма арқылы тазарту
10. Перитонитке құмән туғанда диагнозды тұжырымдау үшін міндетті түрде ... қажет.
- F. жедел лапароскопия жасалу  
 G. қанмен зәрдің жалпы клиникалық анализі алыну  
 H. 1 сағаттан соң қайта тексеру  
 I. іш құрсағын жалпы рентгеноскопия жасалу  
 J. УДЗ жасалу
- Жағдайлық есеп:** 75 жастағы М., атты науқас соқыр ішек операциясынан кейін наркозда жатқан. 15 минуттан кейін науқас кенеттен көгерген. Тынысы сиреген, үзіліспен. Науқаста операциядан кейін қандай асқыну болды? Сіздің іс-әрекетіңіз?

## 5- сабак

**5.1. Сабактың тақырыбы.** Қан кету. Қан кетудің тоқтату әдістері. Қан кетудің асқынулары.

**5.2. Сабактың мақсаты:** оқушыларға хирургияда дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің теориялық және тәжірибелік дағдыларын үйрету.

### 5.3. Пәннің міндеттері:

- оқушыларға хирургиялық көмек көрсететін жағдайлармен таныстыру;
- емдік мекемелерінде және үйде науқасқа хирургияның теориялық және тәжірибелік негіздерін үйрету;
- кәсіптік этика және деонтология процесстерін үйрету;
- хирургиялық шаралармен таныстыру және үйрету;

### 5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

- Қан кетудің себептері
- Қан кетудің жіктелуі;
- Қан кетудің клиникасы;
- Қан кетудің қауіптілігі
- Қан кетудің түрлері;
- Қан кетуді уақытша тоқтату;
- Қан кетуді түпкілікті тоқтату;
- Қан кетудің зардаптары.

<b>OÝTÝSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

**Қан кету - қанның қан айналымынан сыртқы ортаға немесе ішкі ағзаларға төгілуі.**

Қалыпты жағдайда адамда шамамен 4 - 5 литр қан болады, оның 60% тамырлар арқылы айналады, ал 40% қан қоймасында (бауыр, көкбауыр және т.б.) болады. Қанның 1/3 бөлігінің жоғалуы өмірге қауіп тәндіреді, бірақ ол тез бітетін болса, пациенттер аз қан жоғалтумен өлүі мүмкін. Ерлер қан жоғалтуға нашар төзеді, ал әйелдер қан жоғалтуға көбірек бейімделеді. Ишкі және сыртқы қан кетуді ажыратыңыз. Зақымдалған қан тамырларының түріне байланысты қан кетуі мүмкін артериялық,

- веноздық,
- капиллярлық,
- паренхималық
- аралас

• Артериялық қан кету жарадан қанның пульсирулген ағынмен ағуымен сипатталады. Веноздық қан кету кезінде қан күнгірттенеді және өздігінен тоқтау үрдісінсіз үздіксіз ағынмен жарадан көп мөлшерде шығарылады. Жарада кесілген тамыр көрінеді. Бұлшықет-тері жарапарында капиллярлық қан кетулер байқалады. Қан үлкен вена зақымданғанға қарағанда аз қарқынды түрде бөлінеді, ол өздігінен тоқтауға бейім, сыртқа ағып жатқан қан мөлшері жараның мөлшеріне байланысты.

1. **Посттравматикалық** – жарақат немесе жарапар, соның ішінде операциялық жаракаттар нәтижесінде;
2. **Аррозиялық** – патологиялық процесспен тамыр қабырғасының тоттануынан: асқазан жарасы, ыдырайтын ісік, ұлпалар мен тамыр қабырғаларының ірінді бірігуі;
3. **Диапедиялық** - қан тамырлары қабырғаларының тұтастығын бұзбай қан кету - қан ауруларымен (гемофилия), авитаминозмен (цинга) және т.б.

### **Артериялық қан кету**

#### **Сыртқы артериялық қан кетуді тоқтатудың негізгі принциптері қандай?**

Көбінесе жәбірленушінің өмірін сақтайтын негізгі шүғыл шара сыртқы қан кетуді уақытша тоқтату болып табылады. Травматикалық ампутациялар кезінде жоғарғы және төменгі аяққолдың тамырларынан, сондай-ақ аяқ-қолдың дінгегінен қан кету екі кезеңде тоқтатылады: біріншіден, қан ағымын тоқтату үшін артерияны жаракаттанған жердің үстінен сүйектің шығынқы жеріне дейін басады. жарақат орнына, содан кейін стандартты немесе импровизацияланған турникет қолданылады. Жгуттың астына жгут салынған уақытты көрсететін белгі қойылады. Турникетті қолдану уақыты ілеспе парақта көрсетілуі керек. Сыртқы қан кетуді тоқтату алғашқы медициналық көмек көрсетудің басты мақсаты болып табылады. Артериялық қан кету ерекше қауіпті. Артериялар - қанды жүректен мүшелерге апаратын қан тамырлары. Ең қауіпті жаракаттар - үлкен артериялар - феморальды, иық, үйқы; бұл жағдайларда өлім бірнеше минут ішінде болуы мүмкін. Мысалы, феморальды артериядан қан кету 1-2 минут ішінде жәбірленушінің өліміне әкелуі мүмкін. Сондықтан артериялардың сандық қысымының әдістерін және артериялық жгут салу техникасын білу және қолдана білу қажет.

### **Веноздық қан кету**

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>«Клиникалық пәндер» кафедрасы</b>	044-67/11
<b>Әдістемелік нұсқаулық</b>	54 беттің 1 беті

## Веноздық қан кетудің белгілері

Егер қан қою қызыл түсті болса және жарадан тыныс алу кезінде баяу немесе аздал пульсиренген ағынмен шықса, науқаста веноздық қан кету бар. Ирі веналардан қан кету (феморальды, субклавиандық, мойындық) қанның тез жоғалуына да, ауа эмболиясының ықтималдығына байланысты науқастың өміріне қауіп төндіреді. Веналардың травматикалық зақымдануынан басқа, веноздық қан кету мұрынның шырышты қабығындағы қан тамырларының жарылуы немесе төменгі аяғындағы варикозды веналар болуы мүмкін. Аспирин қабылдаудан туындаған мұрыннан қан кету, қан қысымының жоғарылауы ұзақ уақыт бойы тоқтамауы мүмкін және науқасты ауруханаға жатқызууды талап етеді. Кез келген веноздық қан кету үшін алғашқы көмек қысымды таңғышты, сұықты және жоғары позицияны қолдануды қамтиды. Веноздық қан кетуге көмектесініз Қысым таңғышын салу және сұыққа ұшырау. Перифериялық тамырлардан жүрекке веноздық қан көтерілген кезде жараның астына қысым таңғышы қолданылады. Мұндай қысым таңғышы бірнеше заарсыздандырылған дәке жастықшаларынан немесе жараланбаған бинттен тұрады, оған турникет немесе серпімді таңғыш қолданылады. Веноздық жгутты қолданудың дұрыстығы қанның тоқтауымен, бірақ басылған жерден төмен пульсацияның сақталуымен дәлелденеді. Қан кету көзінے проекцияғы таңғыштың үстіне мұзды немесе сұық сумен толтырылған жылдықтың қолданған дұрыс. 30-40 минуттан кейін осы аймақтағы жалпы қан ағымын қалпына келтіру үшін сұықты 10 минутқа алып тастау керек екенін ұмытпаңыз.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жүппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тест сұрақтары:**

1. Қан кету дегеніміз, қанның ... кетуі.

- A. тінге, құысты және сыртқа
- B. сыртқа
- C. құысқа ағзага
- D. тінге
- E. сыртқа және құысқа

2. Қан кетудің себебі бола алмайды:

- A. тамыр жарақаты, нейротрофикалық процесс
- B. қабыну
- C. жарақат салдарынан қан тамырының зақымдалуы
- D. қан тамыр өткізгіштігінің бұзылуы
- E. сепсис

3. Анатомиялық құрылышына бойынша қансырау... болып жіктеледі.

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA</b> <small>-1979-</small>	<b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы		044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық		54 беттің 1 беті

- A. артериалды, көктамырлы, капиллярлы, паренхиматозды  
B. біріншілік, екіншілік  
C. сыртқы, ішкі, жасырын  
D. ерте, кеш  
E. септикалық, эррозивті
4. Қансырау клиникалық түріне қарай ... болып жіктелді.
- A. ішкі, сыртқы, жасырын  
B. біріншілік, екіншілік ерте, екіншілік кеш  
C. артериальды, көк тамырлы, капиллярлы, паренхиматозды  
D. механикалық, нейротрофикалық  
E. сыртқы және ішкі
5. Уақытына байланысты қансырау ... болып бөлінеді.
- A. біріншілік, екіншілік ерте, екіншілік кеш  
B. жіті, созылмалы, қайталамалы  
C. жалғасушы, тоқтаған  
D. ұзақ және қысқа  
E. интенсивті, баяу
6. АҚ ... мм. сынап бағанасына төмендеуі науқастың өміріне қауіпті.
- A. 100/60  
B. 90/60  
C. 70/50  
D. 80/50  
E. 50/0
7. Уақытша қан тоқтату тәсілі:
- A. қан тамыр қабырғасына тігіс салу  
B. жарадағы қан тамырын байлау  
C. қан кеткен жерден алшақ тігіс салу  
D. қан тамырын саусақпен басу  
E. қан тамырлы тігіс салу
8. Тұбкілікті механикалық қан тоқтату әдісі:
- A. қан тамырын саусақпен басу  
B. жгута салу  
C. айналдырып қысуды салу  
D. барынша буынды бұгу  
E. қан тамырлы тігіс салу
9. Эсмарх байламының ұзындығы:
- A. 1,5 метр  
B. 60 см  
C. 1 метр  
D. 3 метр

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

E. 50 см

10. Артериядан қан кеткенде Эсмарх жгуты ... салынады.

- A. 24 сағатқа
- B. 30 минутқа
- C. 2 сағатқа
- D. 1 сағатқа
- E. 45 минутқа

#### Жағдайлық есеп:

Қабылдау бөліміне 48 жастағы ер кісі жеткізілді. Ол әлсіздікке, басының айналуына, сол жақ қабырға астының ауырсынуына шағымданады. Анамнезіне қарағанда, 12 сағат бұрын баспалдақтан құлап, сол жақ қабырға дөғасына соққы алған. Қабылдау бөліміне түскенде естен танды. Науқас жағдайы ауыр. Дене қызының өзгеруіне байланысты іші қатты ауырсынады. Терісі бозарған. Тамыр соғысы -120/ минутына. Артериялық қан қысымы – 90/50 мм с.бағ. Жоғарғы тыныс жолдарын сипап көргенде іш қуысының бұлышық ет қабырғасы әлсіз қатылданған, қолмен қағып көргенде сол жақ қабырға астында және іш қуысының терең жағында тұйықтау дыбыс естіледі. Гемоглобин – 98 г/л.

Сіздің ой-түжірымыңыз? Болжамыңыз?

#### 6- сабак

**5.1. Сабактың тақырыбы.** Жансыздандыру. Жалпы жансыздандырудың түрлері.

**5.2. Сабактың мақсаты:** оқушыларға хирургияда дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің теориялық және тәжірибелік дағдыларын үйрету.

#### 5.3. Пәннің міндеттері:

- оқушыларға хирургиялық көмек көрсететін жағдайлармен таныстыру;
- емдік мекемелерінде және үде науқасқа хирургияның теориялық және тәжірибелік негіздерін үйрету;
- кәсіптік этика және деонтология процесстерін үйрету;
- хирургиялық шаралармен таныстыру және үйрету;

#### 5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

- Аnestезиология тарихы;
- Наркоз теориялары;
- Наркоз туралы түсініктем және түрлері;
- Ингаляциялы наркоздың түрлері және қолдану әдісі;
- Ингаляцилы дәрі дәрмектер;
- Наркоздың клиникалық кезеңідері;

<p>ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>«Клиникалық пәндер» кафедрасы</p>	<p>044-67/11 54 беттің 1 беті</p>
<p>Әдістемелік нұсқаулық</p>	

- Анестезияның түрлеріне байланысты көрсеткіштері және қарсы көрсеткіштері;
- Нейролептаналгезия;
- Тамыр ішілік наркоз;
- Наркоздық аппарат;
- **Наркоздың теориялары :**
  - Наркоз жағдайында бас миының тежелуі байқалады . Ол төменгі бөлімдерге және жұлдынға тарайды ( И.М. Сеченов ).
  - Н.Е. Введенский ( 1903 ) өте күшті тітіркендіргіш ұзак уақыт әсер ету салдарынан , тежелу дамитындығын көрсеткен . Олар жасушаның функциональді қозғалуын ( лабильділігін ) тежейді . Наркотикалық заттар нейрондардың лабильділігін өте қатты төмендетіп , наркотикалық тежелуге алып келеді .
  - В.С. Галкин ( 1953 ) - наркотикалық заттардың ОИЖ - не әсер ету теориясын ашқан . Ол алғашқы кезде ми қыртысының тежелуімен , содан кейін қыртыс асты құрылымдарының тежелуімен сипатталады .
  - П.К. Анохин наркоздың әсер теу механизмін бас ми бағанасының ретикулярлы формациясымен байланыстыруды . Оның ұсынған гипотезасы ми қыртысының бөліктерінің наркотикалық затқа сезімталдығының әртүрлі екендігіне негізделген . Ең сезімталы , ретикулярлы формация болып табылады , ал ол көптеген ми қыртысының орталықтарымен және қыртысасты құрылымдарымен байланысқан . Наркотикалық заттың әсерінен , оның ми қыртысына және қыртыс асты құрылымдарына беретін белсендеріші әсері төмендейді , сөйтіп наркотикалық ұйқы дамиды
- **Наркоздың түрлері**
  - Наркотикалық заттарды енгізу жолына қарай , наркоздың мынадай түрлерін енгізеді ингаляциялық емес наркоз - наркотикалық затты тыныс жолдары арқылы енгізеді;ингаляциялық емес науқас - наркотикалық затты басқа жолдармен енгізеді: веналық , ректальді , бұлышықтік және т.б.
- **Қолданылатын заттардың саны бойынша**
  - мононаркоз - бір зат қолданылады ; аралас наркоз - бір мезгілде екі немесе одан да көп зат қолданылады : қосарланған ( комбинирленген ) - операциялардың әр кезеңінде әртүрлі наркотикалық заттарды қолдану немесе оларды басқа заттармен қосып енгізу ( миорелоксаннтар . анальгетиктер , ганглиоблокаторлар ).
- **Наркоздың мынадай түрлерін ажыратады** : енгізу наркозы - аз уақыт әсер етеді , әсері тез басталады , қозу сатысы болмайды ; демеуші ( негізгі ) наркоз - операция жасау барысында қолданылады ; базисті наркоз немесе базис - наркоз - беткейлі наркоз , негізгі наркозben бірге немесе оның алдында анестетикалық зат енгізіледі , ол негізгі наркотикалық заттың мөлшерін төмендету үшін жасалады.
- **Ингаляциялық наркозды жүргізу әдістері**

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA</b> <small>-1979-</small>	<b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы		044-67/11 54 беттің 1 беті
Әдістемелік нұсқаулық		

- **1. Ашық әдіс** . Науқас аnestетикті атмосфералық ауамен қосып тыныс алады және оны қоршаған ортаға тынысымен шығарады ( маскалық наркоз ) . Бұл әдісте наркотикалық зат көп мөлшерде жұмсалады және операция бөлмесінің ауасын ластайды . Ол операцияға қатысатын медицина қызметкерлеріне зиянды әсер көрсетеді .
- **2. Жартылай ашық әдіс** . Науқас оттегімен қосып , аспап тыныс алады және оны қоршаған ортаға тынысымен шығарады . Бұл әдіс науқасқа арқылы наркотикалық затты қолайлыш болып табылады .
- **3.Жартылай жабық әдіс** . Науқас аспап арқылы наркотикалық қоспаны тыныс алады және оны жартылай аспапқа , жартылай коршаған ортаға тынысымен шығарады.Аспапқа қайтадан түсken қоспа адсорбер арқылы өтіп , ондағы көмірқышқыл газынан босап , наркотикалық қоспамен араласып , аспаптың тыныс алу жүйесіне түседі де , кайтадан науқастың тыныс жолдарына енеді . Бұл әдісте аnestетиктің мөлшері едәуір аз жұмсалады
- **4. Жабық әдіс**. Тынысалу және тыныс шығару аспапқа жүзеге асырылады. Бұл әдіске наркотикалық қоспа толығымен қоршаған ортадан шектелген.
- **Наркоздың клиникалық ағымы 4 сатыдан өтеді :**
- **I сатысы - анальгезия** . Наркоздың басталуынан 3-5 минут өткеннен кейін басталады . Есі жоғалады , бірақ терісінің түсі өзгермеген , гемодинамика мен тыныс алуы езгеріссіз болады . Рефлекстері жоғарылаған . Ауыру сезімі үдемелі түрде тежеліп , толық анальгезия дамиды . Бұл рауш - наркоз ( есенгіреу ) деп аталады . Оны қыска уақыт жасалатын операция кезінде колданады **II сатысы - қозу** . Есі толық жоғалғаннан кейін пайда болады . Бұл кезде науқас қозушаң болады , тынысы жиілеген , тахикардия . АҚ жоғарылауы , терісінің қызаруы байқалады , кездің қарашықтары кенейген , жарыққа жауап бермейді . Науқас құсу мүмкін .
- **III сатысы - хирургиялық үйқы -жансыздандырудың міндегі болып табылады** . Бұл сатыда хирургиялық операция жасалады . Хирургиялық үйқы сатысы 4 деңгейге бөлінеді . Олар бір - бірінен тыныс алу жағдайына , жүрек - кан - тамыр жүйесінің рефлекстердің жойылуына қарап ажыратылады . Хирургиялық үйқы сатысының деңгейін көздің рефлекстері арқылы анықтау ынғайлыш, өйткені олар сопақша мидың көзді қозғаушы орталығымен тығыз байланыста болады және тыныс алу мен қан айналым орталықтарына жақын орналасады . Сондықтан , қарашықтардың реакциясына қарап , тыныс алу мен жүрек кызметінің жағдайын анықтауға болады .
- 

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жүппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

<b>OÝTÝSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

## 5.6. Әдебиет. Соңғы бетте

## 5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

### Тест сұрақтары:

1. Электрлі пышақты ... наркозда қолдануға болмайды.
  - A. хлорэтилді
  - B. оттекті азот тотығы
  - C. азот тотығы
  - D. фторатанді
  - E. циклопропанды
2. Ең алғаш рет эфирлік жансыздандыруды қолданған ғалым:
  - A. Мортон
  - B. Ларрей
  - C. Уэлс
  - D. Амбруаз Паре
  - E. Авиценна
3. Суықты жансыздандыруды алғаш рет ... қолданды.
  - A. Иноземцев
  - B. Караваев
  - C. Авиценна
  - D. Уэлс
  - E. Пирогов Н.И.
4. Қозу кезеңізі өтетін наркоз түрі:
  - A. базис-наркоз
  - B. тері асты наркоз
  - C. ингаляциялы наркоз
  - D. нейтролептаналъгезия
  - E. кіріспе наркоз
5. Интубация маңызды жағдай:
  - A. гипервентиляция
  - B. бұлшық еттердің толық релаксациясы
  - C. есінің тануы
  - D. асқазан сұнгісінің болуы
  - E. құсықпен тығындануы
6. Дәстүрлі премедикацияда қолданылатын препарат:
  - A. промедол, фентанил
  - B. гексанал, тиопентал-натрий
  - C. метацин, кардиамин
  - D. строфантин, кориликон
  - E. кальция глюконат, кальция хлорид

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>«Клиникалық пәндер» кафедрасы</b>	044-67/11
<b>Әдістемелік нұсқаулық</b>	54 беттің 1 беті

7. Гемотрансфузиялық шок жағдайында ... тежеу қолданады

- A. паранефральді
- B. вагосимпатикалық
- C. Л.Г.Школьниковты
- D. футлярлы
- E. құрсақ ішілік нертік

8. Суықты жансыздандыруды алғаш рет ... қолданды.

- A. Иноземцев
- B. Караваев
- C. Авиценна
- D. Уэлс
- E. Пирогов Н.И.

9. Откізгішті жансыздыруды ... ерітіндісі қолданылады.

- A. 1 - 2 % новокаин
- B. 0,25 % новокаин
- C. 0,5 % новокаин
- D. анальгин
- E. совкаин

10. Жергілікті жансыздандыруды жиі қолданатын анестетик:

- A. новокаин
- B. тримекаин
- C. лидокаин
- D. совкаин
- E. кокaine

#### **Жағдайлық есеп:**

Хирургиялық бөлімнің қабылдаудына сол жақ жамбастағы кең көлемді жарамен және ауыр дәрежедегі қансыраумен науқас жеткізілді. Тез арада науқастағы қансырауды тоқтату керек. Хирург қандай тәсілмен жансыздандыру керек? 2. 68 жасар ер кісі оң аяғындағы жіліншіктің 3/1 бөлігінде жыртылған жарасымен (өлшемі 1,5x8,0 см.) қабылдауға келді. Жара шеті некроздалған, қансырап, айналасы ауырсынады. Жара спирттік ерітіндімен залалсыздандырылып, кептірілді, сосын 0,5% новокаин ерітіндісімен жараның іш жағынан жансыздандырыды. Жансыздандыру кезінде қандай қателіктер жіберді?

#### **7- сабак**

**5.1. Сабактың тақырыбы.** Жалпы наркозben жергілікті жансыздандырудың түрлері.

**5.2. Сабактың мақсаты:** оқушыларға хирургияда дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің теориялық және тәжірибелік дағдыларын үйрету.

**5.3. Пәннің міндеттері:**

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA</b> <i>-1979-</i>	<b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>«Клиникалық пәндер» кафедрасы</b>		044-67/11 54 беттің 1 беті
<b>Әдістемелік нұсқаулық</b>		

- оқушыларға хирургиялық көмек көрсететін жағдайлармен таныстыру;
- емдік мекемелерінде және үйде науқасқа хирургияның теориялық және тәжірибелік негіздерін үйрету;
- кәсіптік этика және деонтология процесстерін үйрету;
- хирургиялық шаралармен таныстыру және үйрету;

#### **5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.**

- Наркоздың клиникалық кезеңідері;
- Анестезияның түрлеріне байланысты көрсеткіштері және қарсы көрсеткіштері;
- Нейролептаналгезия;
- Тамыр ішілік наркоз;
- Наркоздық аппарат;
- **Наркоздың теориялары :**
  - Наркоз жағдайында бас миының тежелуі байқалады . Ол төменгі бөлімдерге және жұлынға тарайды ( И.М. Сеченов ).
  - Н.Е. Введенский ( 1903 ) өте күшті тітіркендіргіш ұзак уақыт әсер ету салдарынан , тежелу дамитындығын көрсеткен . Олар жасушаның функциональді қозғалуын ( лабильділігін ) тежейді . Наркотикалық заттар нейрондардың лабильділігін өте қатты төмендетіп , наркотикалық тежелуге алып келеді .
  - В.С. Галкин ( 1953 ) - наркотикалық заттардың ОНЖ - не әсер ету теориясын ашқан . Ол алғашқы кезде ми қыртысының тежелуімен , содан кейін қыртыс асты құрылымдарының тежелуімен сипатталады .
  - П.К. Анохин наркоздың әсер теу механизмін бас ми бағанасының ретикулярлы формациясымен байланыстыруды . Оның ұсынған гипотезасы ми қыртысының бөліктерінің наркотикалық затқа сезімталдығының әртүрлі екендігіне негізделген . Ең сезімталы , ретикулярлы формация болып табылады , ал ол көптеген ми қыртысының орталықтарымен және қыртысасты құрылымдарымен байланысқан . Наркотикалық заттың әсерінен , оның ми қыртысына және қыртыс асты құрылымдарына беретін белсендіруші әсері төмендейді , сөйтіп наркотикалық ұйқы дамиды
- **Наркоздың түрлері**
  - Наркотикалық заттарды енгізу жолына қарай , наркоздың мынадай түрлерін енгізеді ингаляциялық емес наркоз - наркотикалық затты тыныс жолдары арқылы енгізеді;ингаляциялық емес науқас - наркотикалық затты басқа жолдармен енгізеді: веналық , ректальді , бұлышықтік және т.б.
- **Қолданылатын заттардың саны бойынша**
  - мононаркоз - бір зат қолданылады ; аралас наркоз - бір мезгілде екі немесе одан да көп зат қолданылады : қосарланған ( комбинирленген ) - операциялардың әр

<b>OÝTÝSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA —1979—</b> <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

кезеңінде әртүрлі наркотикалық заттарды қолдану немесе оларды басқа заттармен қосып енгізу ( миорелоксанттар . анальгетиктер , ганглиоблокаторлар ).

- **Наркоздың мынадай түрлерін ажыратады :** енгізу наркозы - аз уақыт әсер етеді , әсері тез басталады , қозу сатысы болмайды ; демеуші ( негізгі ) наркоз - операция жасау барысында қолданылады ; базисті наркоз немесе базис - наркоз - беткейлі наркоз , негізгі наркозбен бірге немесе оның алдында анестетикалық зат енгізіледі , ол негізгі наркотикалық заттың мөлшерін төмендету үшін жасалады.
- **Ингаляциялық наркозды жүргізу әдістері**
- **1. Ашық әдіс .** Науқас анестетикті атмосфералық ауамен қосып тыныс алады және оны қоршаған ортаға тынысымен шығарады ( маскалық наркоз ) . Бұл әдісте наркотикалық зат көп мөлшерде жұмсалады және операция бөлмесінің ауасын ластайды . Ол операцияға қатысатын медицина қызметкерлеріне зиянды әсер көрсетеді .
- **2. Жартылай ашық әдіс .** Науқас оттегімен қосып , аспап тыныс алады және оны қоршаған ортаға тынысымен шығарады . Бұл әдіс науқасқа арқылы наркотикалық затты қолайлы болып табылады .
- **3.Жартылай жабық әдіс .** Науқас аспап арқылы наркотикалық қоспаны тыныс алады және оны жартылай аспапқа , жартылай қоршаған ортаға тынысымен шығарады.Аспапқа қайтадан түскен қоспа адсорбер арқылы өтіп , ондағы көмірқышқыл газынан босап , наркотикалық қоспамен араласып , аспаптың тыныс алу жүйесіне түседі де , кайтадан науқастың тыныс жолдарына енеді . Бұл әдісте анестетиктің мөлшері едәуір аз жұмсалады
- **4. Жабық әдіс.** Тынысалу және тыныс шығару аспапқа жүзеге асырылады. Бұл әдіске наркотикалық қоспа толығымен қоршаған ортадан шектелген.
- **Наркоздың клиникалық ағымы 4 сатыдан өтеді :**
- **I сатысы - анальгезия .** Наркоздың басталуынан 3-5 минут өткеннен кейін басталады . Есі жоғалады , бірақ терісінің түсі өзгермеген , гемодинамика мен тыныс алуы езгеріссіз болады . Рефлекстері жоғарылаған . Ауыру сезімі үдемелі түрде тежеліп , толық анальгезия дамиды . Бұл рауш - наркоз ( есенгіреу ) деп аталады . Оны қыска уақыт жасалатын операция кезінде колданады **II сатысы - қозу .** Есі толық жоғалғаннан кейін пайда болады . Бұл кезде науқас қозушаң болады , тынысы жиілеген , тахикардия . АҚ жоғарылауы , терісінің қызаруы байқалады , кездің қарашықтары кеңейген , жарыққа жауап бермейді . Науқас құсуы мүмкін .
- **III сатысы - хирургиялық үйқы -жансыздандырудың міндепті болып табылады .** Бұл сатыда хирургиялық операция жасалады . Хирургиялық үйқы сатысы 4 деңгейге бөлінеді . Олар бір - бірінен тыныс алу жағдайына , жүрек - кан - тамыр жүйесінің рефлекстердің жойылуына карап ажыратылады . Хирургиялық үйқы сатысының деңгейін көздің рефлекстері арқылы анықтау ыңғайлы , өйткені олар сопақша мидың көзді козғаушы орталығымен тығыз байланыста болады және

<b>OÝTÝSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

тыныс алу мен қан айналым орталықтарына жақын орналасады . Сондықтан , қарашыктардың реакциясына қарап , тыныс алу мен жүрек кызметінің жағдайын анықтауға болады .

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жүппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тест сұрақтары:**

1. Электрлі пышақты ... наркозда қолдануға болмайды.

- A. хлорэтилді
- B. оттекті азот тотығы
- C. азот тотығы
- D. фторатанді
- E. циклопропанды

2. Ең алғаш рет эфирлік жансыздандыруды қолданған ғалым:

- A. Мортон
- B. Ларрей
- C. Уэлс
- D. Амбруаз Паре
- E. Авиценна

3. Суықты жансыздандыруды алғаш рет ... қолданды.

- A. Иноземцев
- B. Караваев
- C. Авиценна
- D. Уэлс
- E. Пирогов Н.И.

4. Қозу кезеңізіз өтетін наркоз түрі:

- A. базис-наркоз
- B. тері асты наркоз
- C. ингаляциялы наркоз
- D. нейтролептанальгезия
- E. кіріспе наркоз

5. Интубация маңызды жағдай:

- A. гипервентиляция
- B. бұлшық еттердің толық релаксациясы
- C. есінің тануы
- D. асқазан сұнгісінің болуы

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>«Клиникалық пәндер» кафедрасы</b>	044-67/11
<b>Әдістемелік нұсқаулық</b>	54 беттің 1 беті

- E. құсықпен тығындануы
6. Дәстүрлі премедикацияда қолданылатын препарат:
- A. промедол, фентанил
  - B. гексанал, тиопентал-натрий
  - C. метацин, кардиамин
  - D. строфантин, кориликон
  - E. кальция глюконат, кальция хлорид
7. Гемотрансфузиялық шок жағдайында ... тежеу қолданады
- A. паранефральді
  - B. вагосимпатикалық
  - C. Л.Г.Школьниковты
  - D. футлярлы
  - E. құрсақ ішілік нертік
8. Суықты жансыздандыруды алғаш рет ... қолданды.
- A. Иноземцев
  - B. Караваев
  - C. Авиценна
  - D. Уэлс
  - E. Пирогов Н.И.
9. Өткізгішті жансыздыруда ... ерітіндісі қолданылады.
- A. 1 - 2 % новокаин
  - B. 0,25 % новокаин
  - C. 0,5 % новокаин
  - D. анальгин
  - E. совкаин
10. Жергілікті жансыздандыруда жиі қолданатын анестетик:
- A. новокаин
  - B. тримекаин
  - C. лидокаин
  - D. совкаин
  - E. кокaine

#### **Жағдайлық есеп:**

Хирургиялық бөлімнің қабылдаудына сол жақ жамбастағы кең көлемді жарамен және ауыр дәрежедегі қансыраумен науқас жеткізілді. Тез арада науқастағы қансырауды тоқтату керек. Хирург қандай тәсілмен жансыздандыру керек? 2. 68 жасар ер кісі оң аяғындағы жіліншіктің 3/1 бөлігінде жыртылған жарасымен (өлшемі 1,5x8,0 см.) қабылдауға келді. Жара шеті некроздалған, қансырап, айналасы ауырсынады. Жара спирттік ерітіндімен

<b>OÝTÝSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA —1979—</b> <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

залалсыздандырылып, кептірілді, сосын 0,5% новокаин ерітіндісімен жараның іш жағынан жансыздандырыды. Жансыздандыру кезінде қандай қателіктер жіберді?

## 8- сабак

**5.1. Сабактың тақырыбы** Десмургия. Таңғыштың түрлері. Жұмсақ таңғыштар. Қатты таңғыштың түрлері.

**5.2. Сабактың мақсаты:** оқушыларға хирургияда дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің теориялық және тәжірибелік дағдыларын үйрету.

**5.3. Пәннің міндеттері:**

- оқушыларға хирургиялық көмек көрсететін жағдайлармен таныстыру;
- емдік мекемелерінде және үйде науқасқа хирургияның теориялық және тәжірибелік негіздерін үйрету;
- кәсіптік этика және деонтология процесстерін үйрету;
- хирургиялық шаралармен таныстыру және үйрету;

**5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:**

- Сынық түсінігі;
- Сынықтың жіктелуі;
- Сынықтың ауыртпалығын анықтау;
- Клиникалық ағымын;
- Сынықпен буын шығуының диагностикасы;
- Алғашқы көмек көрсету;
- Жергілікті және хирургиялық емі.
- Дененің анатомия - физиологиялық ерекшеліктері;
- Десмургия түсінігі;
- Жұмсақ және қатты таңғыш түрлері;
- Таңғыштарды салу техникасы

**Десмургия** дегеніміз — таңғыш байлау және қолдану туралы ілім. Таңғыш-адамденесінеemdікмақсаттатаңған материал.

Таңғыштар адамның жарасын, сынықты т.б. ауруларды емдеуге қолданылады. Әрбір медицина қызметкері таңудың түрлерін білуі керек, кез келген уақытта, кез келген жерде, жағдайда дереу көмек көрсетіп, қан тоқтатып, жараны байлау үшін таңғышты қолдана білуі тиіс. Таңғыш жасалған материалына қарай жұмсақ және қатты болып бөлінеді. Қолдану мақсатына қарай: Қорғайтын таңғыш болады- ол жараны инфекция түсіден қорғайды. Қысатын таңғыш – қан тоқтату үшін дененің бір жеріне қысым жасайды. Қозғалтпайтын таңғыш- иммобилизациялайтын- сынықты не шықкан буынды қозғалтпай науқасты тасымалдау, емдеу кезінде пайдаланады. Ауа жібермейтін – окклюзиялық таңғыш- плевра қуысы жарақаттанған кезде салынады. Коррекциялайтын-түзейтін таңғыш- дененің дұрыс емес біткен жерлерін түзейді, мыс, гипс

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

жаға мойны қисық болып туған балаға салынады. Тартатын, созатынтаңғышсынықтыемдеудеколданылады.

## 1. Таңғышматериалдары жәнетаңтуғрлери

Таңғыш ретінде дәкеден істелген бинт, мақта, эластик бинт, торлы-тұтікше бинт, мақта-мата материалын қолданады. Материал ретінде – ағаш, гипс, металл, пластмасса, клей т.б. қолданады.

Қолдану мақсатына қарай:

**Қорғайтын таңғыш болады**- ол жараны инфекция түсуден қорғайды.

**Қысатын таңғыш** – қан тоқтату үшін дененің бір жеріне қысым жасайды.

**Қозғалтпайтын таңғыш**- иммобилизациялайтын- сынықты не шықкан буынды қозғалтпай науқасты тасымалдау, емдеу кезінде пайдаланады. Ауа жібермейтін – окклюзиялық таңғыш- плевра қуысы жарақаттанған кезде салынады.

**Коррекциялайтын-түзейтін таңғыш**- дененің дұрыс емес біткен жерлерін түзейді, мыс, гипс жаға мойны қисық болып туған балаға салынады.

**Тартатын, созатын таңғыш**- сынықты емдеуде қолданылады.

Таңғыш ретінде дәкеден істелген бинт, мақта, эластик бинт, торлы-тұтікше бинт, мақта-мата материалын қолданады. Материал ретінде – ағаш, гипс, металл, пластмасса, клей т.б. қолданады.

**Жұмсақ таңғыштар**: бинт, үшбұрыш орамал, клей, праща, эластик, торлы тұтікше.

**Қаттытаңғыштар**: шина, гипс, пластмасса, kleol, желім.

Жұмсақ таңғыштар 2 бөліктен тұрады: жараны жабатын стерильді салфетка. оны бекітетін таңғыш материал. Көбіне таңғыш ретінде бинтті пайдаланады. Оның спиральді, орап байлау, жорғалата байлау, 8-тәрізді байлау, айқастырып байлау т.б. түрлері бар.

**Үшбұрыш (косынка) орамал**- бас, аяқ, қол жарақаттанған кезде таңылады. Праща-бастың шығыңқы тұстарына: мұрын, иек, мандай, желке тұсқа салынады.

**Жеке тану пакеті (ИПП)**- дайын стерильді пакетке салынған бинт, 2 жұмсақ уыс мақтасы бар, пакет іш жағынан резинамен тысталған. Бинт, бір уыс мақта аралас сырылған 2 бөлігі жараны жабуға, сыртқы тысы кеуде жарасын бітеуге қолданылады.

**Клейлі (желімді) таңғыш** – жараны инфекциядан қорғау үшін таңылады.

Салфетканы жараға клейлі таңғышпен желімдеп бекітуге болады. Кейбір науқастарды сүйегі сынып, буыны шыққан кезде тасымалдау кезінде жарақат алған жерін қозғалтпайтын ету керек. Ол үшін иммобилизациялық тасымалдау шиналарын пайдаланады. Мұндай адамды фельдшер жалғыз не екі адам болып, үш адам болып

колмен тасымалдауға болады. Немесе коляскамен, каталкамен, зембілмен тасымалдауға болады.


Қандай әдіспен тасымалдаса да мына ережелер сакталуы керек: Шина окиға болған жерде санылады. Әуелі жарасы таңылып, содан кейін шина салынуы керек. Шина закымдалған тұстағы көрші 3 буынды, кем дегендे 2 буынды бекітуі тиіс. Тоқпан жілік сынғанда және ортан жілік сынғанда міндетті түрде көрші 3 буын бекітіледі.

Науқастыөтәқырынтастымдау керек

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>«Клиникалық пәндер» кафедрасы</b>	044-67/11
<b>Әдістемелік нұсқаулық</b>	54 беттің 1 беті



Крамер шинасын салу кезіндегі көрініс.



### 1. Таңу ережелері

Таңылатын бөлік қол жететіндей және физиологиялық жағдайда болуы керек. Таңғанда науқастың бет-әлпетіне қарап, ауырсынбай ма соны бақылап отырады. Бинтті солдан онға, шеттен ортаға қарай орайды. Бір қолмен бинтті жазып, бір қолмен оны түзеп жатқызады. Гипс таңғыш— тез қататын, емдеуге қолданылатын таңғыш. Гипс ұнтағы мен бинттен жасалынады. Гипс- сұр тұсті сульфат кальций ұнтағы, сумен араластырған кезде тез қатады. Оны гипс таңу кабинетінде дайындалап таңады.

<b>OÝTÝSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

Гипс таңғыш түрлері:

- 1.бітей
- 2 алмалы-салмалы (лонгета).
- 3. «етік».
- 4 «жаға».
- 2. «корсет».
- 6 «коксит».
- 7. «кроватка».
- 8. «туптор» және т.б.

Гипс таңғышы салынатын бөлік физиологиялық ұтымды жағдайға келтіріліп, 2 көрші буын бекітіліп, шошайған сүйек түстарына бір уыс мақта салынады.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жүргіпен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

### **5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тест сұрақтары:**

1. Жиі кездесетін буынның шығуы:
  - A. иық
  - B. төменгі жақ
  - C. бұғана
  - D. жамбас
  - E. тізе тобық буыны
2. Шығудың этиологиялық белгілеріне жатпайды:
  - A. толық шығу
  - B. жарақаттық
  - C. біріншілік
  - D. тұа пайда болған
  - E. патологиялық
3. Тұа пайда болған буынның шығу ... жиі кездеседі.
  - A. жамбас сан буынында
  - B. иықта
  - C. шынтақта
  - D. шыбық білезік буыны
  - E. 1-ші саусақтың негізгі фалангасы
4. Ұманы ұстап тұратын таңғыш түрі:
  - A. суспензиялы
  - B. масақ тәрізді
  - C. сақпанша тәріздес
  - D. сырғымалы

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

E. шеңберлі

5. Айналмалы таңғыш:

- A. салынған орамдар бір-біріне тимей тұруы
- B. келесі орамы алдыңғы орамның 1/2 жабады
- C. келесі орамы алдыңғы орамның 3/4 жабады
- D. келесі орам алдыңғы орамнан бинттің еніндей калыңқы орналасады
- E. келесі орамы алдыңғы орамды толық жабады

6. Тығын таңғышы ... қолданады.

- A. ашық пневмоторакста
- B. сан жілігі сынығында
- C. капилляры қан кетуде
- D. венозды қан кетуде
- E. артериальді қан кетуде

7. Сан сүйегі сынығының операциясынан кейін ... гипісті таңғыш салынады.

- A. терезелі
- B. лангетті
- C. айналмалы
- D. лангетті-айналмалы
- E. корсетті

8. Сынық кезіндегі сүйектің ығысуының себебі:

- A. бұлшықеттердің жиырылуты
- B. сүйек буын қапшағының жарақаттануы
- C. остеомиелиттің салдарынан
- D. бұлшықет жарақатынан
- E. сінірдің жарақатынан

9. Сүйектің репозиция түрі:

- A. бірмезетті
- B. кейінге қалдырылған
- C. кештік
- D. ертелік
- E. уақытшалық

10. Сүйек жарқыншағының дұрыс қалпында болғанда, иммобилизациялау әдісі:

- A. гипісті байлам
- B. қаңқалы тарту
- C. ортопедиялық аяқ-киім
- D. дәкелік тану
- E. тасымалдау құрсауы

#### 9- сабак

**5.1. Сабактың тақырыбы** Қан құю. Қан құюдың асқынулары. Қан алмастырғыштар.

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

**5.2. Сабактың мақсаты:** оқушыларға хирургияда дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің теориялық және тәжірибелік дағдыларын үйрету.

**5.3. Пәннің міндеттері:**

оқушыларға хирургиялық көмек көрсететін жағдайлармен таныстыру;  
емдік мекемелерінде және үйде науқасқа хирургияның теориялық және тәжірибелік негіздерін үйрету;  
кәсіптік этика және деонтология процесстерін үйрету;  
хирургиялық шаралармен таныстыру және үйрету;

**5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:**

- Қан құюдың тарихы;
- Трансфузиология түсінігі;
- Қан құюдың көрсеткіштерімен керікөрсеткіштері;
- Құйған қанның әсер ету механизімі;
- AB0 жүйесі бойынша қан топтары;
- Негізгі гемотрансфузиялық ерітінділер;
- Қан құюдан кейінгі болатын асқынулар.

Қан құю-ол күрделі, алуан түрлі қызметі бар тірі тінді трансплантациялау болып табылады. Гемотрансфузия айналымдағы қан көлемін толтырады, зат алмасуын, қаннның оттегіні, қоректік заттарды, метаболизм өнімдерін тасмалдауын жақсартады. Құйылған қанмен бірге дененің көптеген қызметіне катысатын гормондар мен ферменттер енгізіледі. Құйылған қан ұзак уақытқа дейін қан түйіршіктегі, ферменттер, гормондар және т.б. арқасында қызметін атқарады. Дәрігер трансфузиологтың міндеттері:

- Өз ісін адаптациялық шебер атқара білу қажет
- Қан дайындағанда донорлықты ұйымдастыру
- Емдік-профилактикалық мекемелерде трансфузиологиялық көмекті ұйымдастыру және оны қадағалауларға катысу
- Түрлі топтағы донорларды медициналық тексерулерден өткізу.
- Қан жасушаларын, плазманы, донорлық қанды түрлі әдістермен дайындау.
- Донорлардан алған қанды бактериологиялық тексеруден өткізу
- Трансфузиологиялық заттарды сақтауды ұйымдастыруға катысу.
- Трансфузиялық терапия алдында науқастарды тексеріп және әр түрлі аурулар мен травмада индивидуальды трансфузиологиялық ақпаратты (программа) құрастыру
- Емдеу орталықтарында аутогемотрансфузияны және реинфузияны ұйымдастыру
- Қан құйып болған сон асқынуларды анықтау, асқынулар бола қалған жағдайда алғашқы көмек көрсету және емдеу.
- Қан орталығында санитарлық жағдайды сақтау және жұмыс барысында аппараттармен жұмыс істегендеге қауіпсіздік ережесін сақтауды қадағалау.

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық ғондер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

- Травма және өлім қаупі бар жағдайда шуғыл медициналық көмек көрсету.
- Орта және кіші буынды медицина қызметкерлерінің дұрыс жұмыс істеуін бақылау.
- ҚР денсаулық сақтау министерлігінің талабына сай медициналық құжаттарды толтыру.
- Барлық кезде өзінің теориялық және тәжірибелік білімін жетілдіру
- Соңғы трансфузиология іліміндегі жетістіктер мен іс-тәжірибелерді өз жұмысында қолдану Құйылған қанның әсер ету механизмі
- **Гемостатикалық(қан тоқтатушы) қызметі**-бұл қанның ұю жүйесінде ауытқулар болған кезде, мысалы: гемофилия, холемия, геморрагиялық диатез, қаңсырау кезінде өте маңызды Құйылған қанның гемостатикалық әсері қанның ұюшы факторларының енуімен түсіндіріледі. Жаңа алынған немесе сакталу мерзімі аз қанниң гемостатикалық әсері күшті болады.
- **Дезинтоксикациялық әсері**- құйылған қан реципиент қанында жүрген токсиндерді абсорбция жасайды. Оттегі тасмалдау мен улы заттардың ағзаға тасмалдануының ұлғауы маңызды роль атқарады. Бұл ағзаларда улы заттар байланыстырылып, шығарылып отырады.
- **Иммунокоррекциялық әсері**-денеге фагоцитозды іске асыратын нейтрофилдардың, жасушалық иммунитетке жауап беретін лимфоциттердің еңгізілумен түсіндіріледі. Гумморальді иммунитет те иммуноглобулиндер, интерферон және т.б. аққасында үдейді. • Қан құйылғаннан соң, организмде стресске ұқсас өзгерістер дамиды. Реципиенттің негізгі зат алмасуы, газ алмасуы жақсарады. Қан құю табиги иммунитет факторларына белсендеріруші әсер көрсетеді. Гипоталамо- гипофизарлы-адреналды жүйенін белсенделігі жоғарылайды Тромбоцитті масса-донор қанынан тромбоцитті бөлу арқылы алынады. Оны 4 градус температурада 6-8 сағат, 22 градус температурада 72 сағат сақтайды.

### Қан құю әдістері.

- 1. Стандартты трансфузия (жанама құю)-консервленген қанды немесе оның бөлшектерін контейнер немесе флаконнан құю.**
- 2. Қанды тікелей құю-донордан реципиентке қанды тікелей құю өте сирек қолданылады.**

### Қанды тікелей құюдың көрсеткіштері мынадай:

- а) гемофилиямен ауыратын науқастарда ұзак уақыт қанының ағуы кезінде гемостатикалық емнің қонбауы.
- б) массивті гемотрансфузиядан кейін және қан ауруларында қанниң ұю жүйесінің бұзылуы.
- в) ЦҚҚ 25-50 пайыз қаны жоғалған III дәрежелі жарақаттық шок және консервленген қанды құюдан әсер болмаса

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы Әдістемелік нұсқаулық	044-67/11 54 беттің 1 беті

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жүппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тест сұрақтары:**

1. Қан құюға қарсы қорсеткіш:

- A. бауыр, бүйрек қызметтерінің ауыр бұзылыстары
- B. ірінді анемия
- C. жедел анемия
- D. ағзаның қарсы күресу күшінің төмендеуі
- E. қан кетуде

2. Артерия тамырына ... мм.сынап бағанасындағы қысымда құйылады.

- A. 200
- B. 100
- C. 50
- D. 300
- E. 80

3. Стандартты сары судың титр көлеміне қатынасы:

- A. 1:32
- B. 1:30
- C. 1:20
- D. 1:25
- E. 1:64

4. Лимонды-қышқылды натрий ерітіндісімен өнделген күйылатын қаның сакталу мерзімі:

- A. 21 күн
- B. 5 күн
- C. 10 күн
- D. 14 күн
- E. 1 күн 5

5... ауырған науқас доноң бола алмайды.

- A. вирусты гепатитпен
- B. тұа пайда болған буынның шығуымен
- C. қыликеz
- D. қисық аяқпен
- E. гипертониялық аурудың I - II сатысымен

6. Қан құюдың абсолютті кері қорсеткіші:

- A. туберкулездің активті кезеңі

<b>OÝTÝSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

- B. темір жетіспеушілік анемия  
C. гемофилии  
D. цистит  
E. тымау
7. Жарақаттан ... өткеннен кейін реинфузия жүргізуге болмайды.
- A. 4 сағат  
B. 2- сағат  
C. 6- сағат  
D. 3-тәуләк  
E. 12- сағат
8. Цитратты шоктың алдын алу үшін ... енгізіледі.
- A. 10 % - кальций хлориді  
B. 4 % калия хлориді  
C. 10 % желатин ерітіндісі  
D. 0,5 % новокаин  
E. 5 % Вит С
9. Қан тобын анықтау үшін ... қолданылады.
- A. I,II,III топтың стандартты сары сұзы  
B. әмбебап моноклональді A антигені  
C. әмбебап антирезус сары сұзы  
D. I және II топ эритроциті  
E. I-III топты науқас сары сұзы
10. .... қанды құюға жарамсыз.
- A. гемолизиді  
B. консервіленген  
C. жаңа дайындалған  
D. 7 тәулік сакталған

### Жағдайлық есеп:

Науқас хирургиялық бөлімшеге 12 елі ішектегі ойық жараның асқынған түрдегі қан кетуімен түсті. Жедел қан айналуының жетіспеушілігі – 35 пайызды құрайды. Жоғалған қан орнын толтыру үшін жедел түрде қан құю керек екені анықталды. Гемотрансфузиясыз лабораториялық зерттеулер жүргізу керек пе? жаңа мұздатылған

### 10- сабак

- 5.1. Сабактың тақырыбы** Жарақаттар. Жарақат түрлері. Асқынулары. Асқынулардың алдын алу шаралары.
- 5.2. Сабактың мақсаты:** оқушыларға хирургияда дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің теориялық және тәжірибелік дағдыларын үйрету.

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

### 5.3. Пәннің міндеттері:

- оқушыларға хирургиялық көмек көрсететін жағдайлармен таныстыру;
- емдік мекемелерінде және үйде науқасқа хирургияның теориялық және тәжірибелік негіздерін үйрету;
- кәсіптік этика және деонтология процесстерін үйрету;
- хирургиялық шаралармен таныстыру және үйрету;

### 5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

- Сынық түсінігі;
- Сынықтың жіктелуі;
- Сынықтың ауыртпалығын анықтау;
- Клиникалық ағымын;
- Сынықпен буын шығуының диагностикасы;
- Алғашқы көмек көрсету;
- Жергілікті және хирургиялық емі.
- Дененің анатомия - физиологиялық ерекшеліктері;
- Десмургия түсінігі;
- Жұмсақ және қатты таңғыш түрлері;
- Таңғыштарды салу техникасы

### Жарақат травмалар.

Жарақат немесе травма деп ағзаға сыртқы агент әсерінен органның анатомиялық және физиологиялық бүтіндігінің бұзылуын жалпы және жергілікті реакция бақылауын айтамыз. Травманың жіктелуі. Өндірістік емес жарақат а) транспорттық (теміржол, автомобиль, трамвайлық т.б; б) жаяу жүріп келе жатқанда; в) тұрмыстық; г) спорттық т.б. Өндірістік жарақат (өнеркәсіптік және ауылшаруашылық). Әскери жарақат. Тудырушы әрекетке байланысты жарақат мынадай түрге бөлінеді: механикалық, термиялық, химиялық, электрлік, психикалық, операциялық, туғаннан кейінгі. Жарақат зақымдалуына байланысты ашық және жабық болып бөлінеді. Ашық жарақатты терінің және кілегей қабаттың бүтіндігі бұзылады. Бұл кезде зақымдалған тканьге инфекция түсіү мүмкін. Жабық жарақат кезінде тері және кілегей қабатын тұтастыры бұзылмайды. Жарақат қуысқа енген және қуысқа енбеген болып бөлінеді (қарын, көкірек, бас буын қуысы). Қуысқа инфекция түсіү жарақаттың ағымын қынданады. Жарақат тағы да жекеленген және қосарланған жәй және қыстырылған болып бөлінеді. Егер зақымдалу тек бір жерге құш түсірсе ол тікелей жарақат, ал басқа аймақта дамитын болса тікелей емес жарақат деп аталады. Жарақттануды аяқ - асты болған және созылмалы жарақаттану деп белгіленеді. Аяқ астынан болған жарақат бір ұзақ әсер етуден болғанда пайда болады. Созылмалы травмаға ұзақ уақыт тар етік киодің әсерінен пайда болған мүйізгекті жатқызуға болады. Созылмалы мамандық жарақатта тізерлей жұмыс істегендерде тақым алды бурсит пайда болады. Жарақаттанудағы қауіптер мен асқынулар. Жарақаттан кейінгі

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA —1979—</b> <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

қауіпті жайлар келесі топтарға бөлінеді. Тікелей қауіпті жағдай. Бұл жарақаттанудан кейінгі алғашқы сағаттарда пайда болады. Оған коллапс, қансырау, өмірге маңызды органдардың зақымдануы. Жарақаттану салдарынан адам өміріне қауіп бірнеше сағаттан соң туады. Оның нәтижесінде хирургиялық инфекция пайда болады. Онда жергілікті ірінді инфекция (жараның іріндеуі, перитонит, плеврит т.б.) және жалпы ірінді инфекция (сепсис, сис, газды гангrena, сіреспе т.б.). Ұлпалардың ұзақ уақыт қысылуынан травмалық токсикоз пайда болуы мүмкін. Асқынулар мен қауіпті жайлар жарақаттанкейін байқалады. Оған созылмалы ірінді инфекцияны жатқызуға болады. Созылмалы остеомиелит, жыланкөз(свиш), тканьдердің трофиқасының бұзылуының трофиқалық жара, тканьдарда тыртықтың пайда болуы, контрактура травматикалық (токсикоз) эилепция, әртүрлі анатомиялық және функционалдық дефектілер. Зақымданудың күші және оны кейінгі әсері көптеген шарттарға байланысты мынадай топтарға бөлінеді.

1. Трамва механизмі және зақымдануға әкелетін ішкі фактор.
2. Ұлпа және органдардың анатомо -физиологиялық қасиеті.
3. Зақымдалған органдарда өзгерістің болу немесе болмауы.
4. Зақымдалу болған ортандың ерекшелігі.

### **Бас және мидың жабық зақымдалуы.**

Бастың жұмсақ тканьдерінің жарақатында және емдеуінде, басқа құбылыстарының зақымынан ерекшеленбейді. Ми зақымында ғана ерекшелік болады. Ми жарақаттары, ми зақымы, мидың отыруы, көпірсінің және бас негізі сынуы болып табылады. Мидың зақымдалуы. Мидың зақымдалуы басқа мағыналы құштің құрылуынан т.б. болады. Бұл кезде мидың жұмсақ ткані және клеткалары өзгеріске ұшырайды. Ми зақымын патологиялық өзгерісі мидың анемиясы, нүктелік қан ұюға, яғни ақ және сұр заттың манындағы қан ұюға, мидың ісінуіне әкеледі. Екінші бір маңызды симптомы болып ретроградты амнезия саналады. Мұнда адам есін жиғаннан соң травмаға дейін не болғанын ұмытады. Мидың зақымдалуына клиникасының пайда болуында үш сатыны бөліп қараймыз.

### **Құрсақ қуысының органдарының жабық зақымдалуы.**

Құрсақ қуысы органдарының зақымдалуы да жиірек кездестірудегі қуысты және паренхиматозды органдар зақымы. Мұндағы жарақат ішке соққы тигенде немесе қатты зақым тигенде болады. Зақымдалған жердің саттылары зақымдалушы агентке байланысты болады. Мысалы: аттың тепкенине алған зақым, машина теміріне соғылу, тас тиу т.б. болады. Егер қуысты органдар соққы тигенде тола болса қарын, ішек ілмектері сирек жыртылады. Паренхиматозды органдардың жыртылуы түрлі патологиялық әсерден де жиі кездеседі. Мысалы: көкбауыр маляриясы, бауыр гепатиттен т.б. Куысты органдар зақымы

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

кезінде оның ішіндегі құрамы салдарынан түрлі инфекциялы және ірінді процестер туындауы мүмкін. Ал паренхиматозды органдарда қансырау, жедел анемия туындаиды.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жүппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тест сұрақтары:**

1. Жиі кездесетін буынның шығуы:

- A. иық
- B. төменгі жақ
- C. бұғана
- D. жамбас
- E. тізе тобық буыны

2. Шығудың этиологиялық белгілеріне жатпайды:

- A. толық шығу
- B. жарақаттық
- C. біріншілік
- D. түа пайда болған
- E. патологиялық

3. Түа пайда болған буынның шығу ... жиі кездеседі.

- A. жамбас сан буыннанда
- B. иықта
- C. шынтақта
- D. шыбық білезік буыны
- E. 1-ші саусақтың негізгі фалангасы

4. Ұманы ұстап тұратын таңғыш түрі:

- A. сүспензиялы
- B. масақ тәрізді
- C. сақпанша тәріздес
- D. сырғымалы
- E. шеңберлі

5. Айналмалы таңғыш:

- A. салынған орамдар бір-біріне тимей тұруы
- B. келесі орамы алдыңғы орамның 1/2 жабады
- C. келесі орамы алдыңғы орамның 3/4 жабады
- D. келесі орам алдыңғы орамнан бинттің еніндей калыңқы орналасады
- E. келесі орамы алдыңғы орамды толық жабады

6. Тығын таңғышы ... қолданады.

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

- A. ашық пневмоторакста  
B. сан жілігі сынығында  
C. капиллярлы қан кетуде  
D. венозды қан кетуде  
E. артериальді қан кетуде
7. Сан сүйегі сынығының операциясынан кейін ... гипісті таңғыш салынады.
- A. терезелі  
B. лангетті  
C. айналмалы  
D. лангетті-айналмалы  
E. корсетті
8. Сынық кезіндегі сүйектің ығысуының себебі:
- A. бұлшықеттердің жиырылуды  
B. сүйек буын қапшағының жарақаттануы  
C. остеомиелиттің салдарынан  
D. бұлшықет жарақатынан  
E. сінірдің жарақатынан
9. Сүйектің репозиция түрі:
- A. бірмезетті  
B. кейінге қалдырылған  
C. кештік  
D. ертелік  
E. уақытшалық
10. Сүйек жарқыншағының дұрыс қалпында болғанда, иммобилизациялау әдісі:
- A. гипісті байлам  
B. қаңқалы тарту  
C. ортопедиялық аяқ-киім  
D. дәкелік тану  
E. тасымалдау құрсауы

## 11- сабак

- 5.1. Сабактың тақырыбы** Жаралар. Жаралардың түрлері. Хирургиялық көмек.
- 5.2. Сабактың мақсаты:** оқушыларға хирургияда дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің теориялық және тәжірибелік дағдыларын үйрету.
- 5.3. Пәннің міндеттері:**
- оқушыларға хирургиялық көмек көрсететін жағдайлармен таныстыру;  
емдік мекемелерінде және үйде науқасқа хирургияның теориялық және тәжірибелік негіздерін үйрету;  
кәсіптік этика және деонтология процесстерін үйрету;

<b>OÝTÝSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

хирургиялық шаралармен таныстыру және үйрету;

#### **5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:**

- Ашық механикалық зақымданулардың түрлері.
- Кесілген жараның ерекшелік клиникалық белгілері.
- Шанышылған жараның ерекшелік клиникалық белгілері.
- Шабылған жараның ерекшелік клиникалық белгілері.
- Тістелген жараның ерекшелік клиникалық белгілері.
- Атылған жараның ерекшелік клиникалық белгілері.
- Жыртылған жараның ерекшелік клиникалық белгілері.
- Мыжылған жараның ерекшелік клиникалық белгілері
- Уланған жараның ерекшелік клиникалық белгілері.

**Жаралар** – тіндердің немесе органдардың механикалық зақымдануы, олардың тұтастығы немесе шырышты қабығының тұтастығын бұзылуы. Осы жаралардың басқа зақымдалулардан айырмашылығы тіннің бүтіндігінің бұзылуы.

#### **Жараның шығу тегі бойынша түрлері:**

- Қасақана (операциалық)
- Кездейсоқ

Операциялық жаралар қасақана болып табылады және олар емдік, диагностикалық мақсатта пайдаланылады.

Жарақаттардан туындаған барлық жаралар кездейсоқ болып саналады. Олардың сипаттамасында міндетті түрде инфекция болады.

Жарақаттың сипаты бойынша, жарақаттың түріне байланысты жаралар бөлінеді:

- Кесілген
- Жарылған
- Ұсақталған
- Оқ тиген
- Уландырылған
- Арапас

**Кесілген** – субъектісінің тері бетіне өткір нәрсе (шыны, металл, пышақ, ұстара т.б.) әсерінен пайда болады. Ол жаралар арнасы мен айналасындағы тіндердің бойында тіндердің минималды бұзылуымен ерекшеленеді. Жараның шеттері тегіс және тіндердің эластикалық қабілетіне қарай, жараның кесілу бағытына қарай иіледі. Ауру синдромы

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA</b> <small>-1979-</small>	<b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>«Клиникалық пәндер» кафедрасы</b>		044-67/11 54 беттің 1 беті
<b>Әдістемелік нұсқаулық</b>		

қалыпты, қан кету айтарлықтай дәрежеде. Бұл жарақат түрінде үлкен қан тамырлары, нервтері, бұлшықеттер, сіңірлер зақымдалуы мүмкін.

### **Кесілген жара симптомдары:**

- Жараның тереңдігі, жара жиектерінің болуы
- Айқын қансырау
- Гематомалар
- Тіндердің қатаюы
- Көгеру
- Ауыру сезімі
- Бас айналу
- Ес жоғалту
- Тахикардия
- Аяқ-қолдың салдануы
- Бозару

### **Кесілген жаралар үшін типтік патоморфологиялық және физикалық белгілер:**

- Закым келтірілген заттың үшкір қырлары бар және ол жұқа, ұзын
- Жараның тереңдігі соққы күшіне байланысты
- Әдеттігідей қан кетеді және жара шеттері тегіс соның арқасында біріншілік тігіспен тез жазылуы мүмкін
- Жараға инфекция түскеннен ірінді асқынулар болуы
- Үлкен тереңдіктегі жараларда айқын қан кетулер мен ауыру сезімі

### **Кесілген жара кезіндегі алғашқы көмек:**

Жараны ағын сумен жуады. Кесілген жердің айналасындағы теріні дәке жастықша арқылы тазаланады, және антисептикалық өндөледі бинтпен жабылады. Веналық немесе капиллярың қан кету болған жағдайда таңғыш байлау пайдаланылады. Ал артериялық қан кету де иыққа немесе жамбасқа жгут байланады. Кесілген жердің үлкен-кішілігіне, қан кету дәрежесіне қарамастан медициналық мекемеге жедел жеткізіледі.

### **Кесілген жараларды емдеу:**

Қабыну белгілері болмаған кезде 24 сағаттан аз уақытқа созылған жараларды кесу бастапқы хирургиялық емдеуге жатады. Зақымдалудың дәрежесімен орналасуына қарай, бастапқы хирургиялық емдеу жергілікті немесе жалпы анестезиямен жүргізіледі.

**Кеуде аймағы зақымдалған кезде дәрігер сол аймақтағы ағзаларға перкуссия, өкпе мен жүрекке аускультация және пальпация жүргізеді.**

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

Жараны перекисводорода және фурацилип ерітіндісімен жуылады, ары қарай бұлшықет, сіңір, нерв, тамырлардың зақымдалуын тексереді. Сіңір зақымдалған болса біріншілік тігіс салынады, ұсақ тамырларды байлайды. Жара тағы бірнеше рет ертінділермен жуылады, дренаж койылады. Қажет болған жағдайда зақымдануды пластикалық немесе гипстік линтпен иммобилизациялайды. Операциядан кейін ауыру сезімін басатын дәрілер және антибиотиктер тағайындалады. Дренажды 2-3 күннен кейін алыш тастайды.

Жақсы көрсеткіштер кезінде жара 7-10 күн ішінде жазылады және тігістер жойылады. Ары қарай емдеу тактикасымен оңалту бұлшықеттердің, сіңірдің, тамырлардың зақымдалу дәрежесіне байланысты.

Ішкі органдардың зақымдалу кезінде тиісінше хирургиялық шаралар жүргізіледі: Өкпе зақымдалуында – торактомия, Іш қуысы зақымдалуында – лапаротомия және т.б. Операция көлемі сол ағзаның зақымдалу дәрежесіне байланысты. Операциядан кейін антибиотиктер, анальгетиктер тағайындалады және таңу жүргізіледі. Кесілген жара кезіндегі болжам жараның локализациясына, жарақаттың пайда болған уақытына, қан жоғалту көлеміне, ішкі ағзалардың зақымдалуына және науқастың ағзасына байланысты. Көптеген жағдайда жара біріншілік тігістен кейін жазылады. Бірак айрықша ауыру бар (мысалы қант диабет) науқастарда жараның жазылуына ауыру теріс әсер етеді, тіпті кішігірім кесіктер үлкен көлемдегі асқынуларға іріндерге әкелуі мүмкін.

**Барлық қажетті медициналық манипуляциялар жүргізілгеннен кейін, жарақаттанған тіндерді қалпына келтіру мақсатында жақпа қолданылады.**

- Пантестин, Д-пантенол
- Календула жақпасы
- Этония

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шагын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жүппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тест сұрақтары:**

1. Жаңа жарақатқа тән емес:

- A. бұлшықеттердің тартылуы
- B. ауырсынуы
- C. қансырауы
- D. жараның ашылуы
- E. жараның ашылуы, қансырауы

2. Жарадағы ауырсыну интенсивтілігі ... байланысты.

- A. жарақаттаушы снаряд көлеміне және жылдамдығына
- B. зақымдалу аймағындағы нервтің санына

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

- C. жәбірленушінің нервтік- психикалық жағдайына  
D. жарақаттаудың жылдамдығына  
E. жарақаттаушы снардтың өткірлігіне
3. Тесіп өткен атылған жарада, оқтың шыққан жерінен кірген жерінің үлкен болуы ... салдарынан дамиды.
- A. жақын жерден ату  
B. алтын жерден ату  
C. қылышпен зақымдау  
D. жарықшақ (осколка) тиу  
E. садақ жебесінен зақымдау
4. Жараның ластануына байланысты ... болып бөлінеді.
- A. асептикалық, жаңа инфекциаланған, ірінді  
B. асептикалық, тістелген, ірінді  
C. уланған, жаңа инфекциаланған, ірінді  
D. асептикалық, жаңа инфекциаланған, жұқтырылған  
E. қансыраған, жаңа инфекциаланған, ірінді
5. Құрсақ құйсына енген жара деп ... жарақаттануын айтады.
- A. париетальды қабаттың  
B. терінің  
C. апаневроздың  
D. бұлшық еттің  
E. май қабатының
6. Жараның ашылу дәрежесі ... байланысты.
- A. эластикалық тері талшықтары, бұлшықеттермен сінірлердің зақымдалуына  
B. зақымдалудың терендігіне  
C. нерв талшықтарының зақымдалуына  
D. фасцияның зақымдалуына  
E. бұлшықеттер мен сінірлердің зақымдалуына
7. Біріншілік бітуге бейім, ... жара.
- A. кесілген  
B. мыжылған  
C. соғылған  
D. тістелген  
E. шабылған
8. Жарада инфекция дамуына ... әсер етпейді.
- A. шок  
B. гематома  
C. қан кету  
D. бөгде заттар  
E. жүдеу,avitaminoz
9. Жараның түйіршіктеніп бітуі алты қабаттан тұрады, соның төртінші қабаты:
- A. жетілүші (созревающий)  
B. лейкоцитті-некротикалық  
C. көлденең қан тамырлы  
D. қан тамырлы шоғырлану  
E. қигаш фибробластты

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

10. Атылған жарада ... аймағынан басқа барлық аймақтардың зақымдалуы анықталады.

- A. қабыну
- B. жарақаттану каналы
- C. молекулярлық шайқалу
- D. біріншілік некроз
- E. қанталау

#### **Жағдайлық есеп:**

Ағаштан құлап және қатты заттан соққы алудың нәтижесінде зардал шегушінің сол жақ сирағының сыртқы беткейінде өлшемі 5x8 см, дұрыс емес формадағы, тегіс емес шекарасы бар жара пайда болды. Жараның түбіндегі баяу қансыраумен бұлшықеттің бөлшектенуі бар. Мұндай жара жараның қай түрінде жатады және жара процесінің барысында қандай асқынулар болуы мүмкін?

### **12- сабак**

**5.1. Сабактың тақырыбы** Хирургиялық инфекция. Жіктелуі. Хирургиялық инфекцияның көріністері. Емдеу қағидалары

#### **5.3. Пәннің міндеттері:**

окушыларға хирургиялық көмек көрсететін жағдайлармен таныстыру; емдік мекемелерінде және үйде науқасқа хирургияның теориялық және тәжірибелік негіздерін үйрету; кәсіптік этика және деонтология процесстерін үйрету; хирургиялық шаралармен таныстыру және үйрету;

#### **5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:**

Ірінді инфекция этиологиясы, патогенезі;

- Ірінді инфекция жіктелуі, патолого-анатомиялық суреттемесі;
- Клиникалық ағымы;
- Диагностика, дифференциальді диагностика;•

Консервативті, оперативті емдерінің негізгі принциптері

- Антибиотиктерді қолдану;•

#### **Хирургиялық инфекция**

**Хирургиялық инфекция** - бұл пиогендік флорадан туындаған әртүрлі локализация мен сипаттағы қабыну ауруы. Өмірдің бірінші күнінің сонында бала қазірдің өзінде бактериялардың 12 түрін мекендейді. Үшінші - жетінші күні олар оның ішектеріне енеді.

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

Бала өскен сайын оның микробтық популяциясы тез өседі. Ересек адамның денесінде ол жүздегенмен ұсынылған, олардың саны астрономиялық сандарға жетеді. Адам ағзасында өмір сүретін бактериялардың жалпы салмағы екі келіге жуықтайты. Адамда микроорганизмдердің 200-ге жуық түрі өмір сүрсе, оның 80-і ауыз қуысында болады. Әдетте адамның ішегінде жалпы салмағы 1 кг-ға дейінгі бактериялардың 300-ден 1000-ға дейін түрі өмір сүреді және олардың жасушаларының саны адам ағзасындағы жасушалардың санынан көп мөлшерде болады. Олар көмірсуладың қорытуында маңызды рөл атқарады, витаминдерді синтездейді, патогенді бактерияларды жою. Бірақ олар үнемі өзгеріп отырады, патогенді болады. Олардың қаншасы бізге тамақпен, тыныспен, лас қолмен, мейірбикелік және медициналық манипуляциялар кезінде келеді. Хирургиялық инфекция микробтардың олар үшін әдеттен тыс мекендеу орындарына (жараптар, ішкі органдар мен қуыстар, талшықтар) ену және даму процесі ретінде анықталады. Ірінді-қабыну аурулары бар науқастар барлық хирургиялық науқастардың үштен бірін құрайды.

## Жіктелуі

### 1. Клиникалық ағымы бойынша

1.1. Жедел хирургиялық инфекция: ірінді; шірік (спорадикалық түзбейтін анаэробтар); анаэробты; спецификалық (сіреспе, сібір жарасы және т.б.).

1.2. Созылмалы хирургиялық инфекция: бейспецификалық (пиогенді); спецификалық (туберкулез, мерез, актиномикоз және т.б.).

### 2. Көрсетілген нысандардың әрқайсысының мынадай нысандары болуы мүмкін:

2.1. Жергілікті хирургиялық инфекция (жергілікті көріністердің басым болуымен);

2.2. Жалпы хирургиялық инфекция (септикалық ағымы бар жалпы құбылыстардың басым болуымен).

## Этиологиясы

Ірінді-қабыну аурулары инфекциялық сипатқа ие (моноинфекция немесе аралас, организмге экзогендік немесе эндогендік жолмен енетін). Ең көп тараған қоздырғышы стафилококк болып табылады, бұл олардың а/б және антисептиктерге жоғары төзімділігімен, сонымен қатар экзотоксингерді шығару қабілетімен түсіндіріледі.

Стрептококктар (ауыр интоксикация береді), пневмококктар, протей, коли бактериялары, *Pseudomonas aeruginosa*, клостридиялар сирек кездеседі. Экзогенді – ауа – ауа – шаң – контакт – имплантация ) Инфекцияның ену жолдары: Патогенезі Қабыну процесінің одан әрі дамуы енген микробтардың саны мен вируленттілігінің ағзаның иммунологиялық құштерімен қатынасымен анықталады. Тіндердің жағдайы және жергілікті иммундық

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

факторлар да маңызды! Жараға түскен микробтар 5-6 сағаттан кейін белсенді бола бастайды! Клиникалық көріністері

### **Жергілікті симптомдар – қабынудың классикалық белгілері:**

- Гиперемия
- Ісіну
- Ауырсыну
- Жергілікті температураның жоғарылауы
- Органның дисфункциясы

### **Қабыну процесінің екі fazасы бар:**

алғашқыда қабыну ошағы тығыз, ауырсыну тұрақты (инфилтративті фаза). );

инфилтраттың жұмсаруы, жиырылған ауырсынулар, флюктуация абсцесс фазасының дамуын көрсетеді.

### **Жалпы симптомдар:**

- дene температурасының жоғарылауы, қалтырау
- Аймақтық лимфа түйіндерінің ұлғаюы
- Науқастың қозуы немесе летаргиясы
- Бас ауруы, әлсіздік сезімі, тахикардия
- Қан құрамының өзгеруі (лейкоцитоз, ЭТЖ жоғарылауы, гемоглобин мен эритроциттердің төмендеуі)

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шагын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жүппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

### **5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

1. Флегмона белгісіне тән емес:

- A. қапшықпен қапталған ірінді қуыс
- B. дene қызының жоғарлауы
- C. шектелген ауырсыну
- D. шектелген тері гиперемиясы
- E. ортасы жұмсарған ауырсынулы инфильтрат

2. Беткей ірінді тромбофлебитке тән емес:

- A. кезектескен ақсандау
- B. аяқ ісігі

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

- C. тамыр бойында тромбының пайда болуы  
D. ден температурасы 37-37,5 С  
E. тері цианозы
3. Абсцесстың радикальді емі:
- A. абсцессты ашу және түтікшелеу  
B. абсцесс қуысын пункциялау  
C. инфузиялық және дезинтоксикациялық терапия  
D. абсцесс аймағын антибиотиктермен шашу  
E. физиотерапиялық шаралар
4. Ірінді плеврит диагностикасы дәлелденеді:
- A. плевральды пункция арқылы іріндікті алу  
B. қабынған бөліктің аускультацияда тыныстың әлсіз естілуі  
C. перкуссияда дыбыстың түйікташы  
D. рентгеноскопияда өкпе тіндерінің айқындалуы  
E. пальпацияда дауыс дірілінің болмауы
5. Үлгілік гангренаны құрғақ гангренаға айналдыру үшін ... қажет.
- A. жергілікті жансыздандыру арқылы "лампасты" тілік жасап, жақпа майын жағып, УКС емі  
B. инфекциямен күресу, алдын алу  
C. қан айналымын жақсарту  
D. жараны УКС емдеу  
E. спиртті тану
6. Хирургиялық сепсистің пайда болуына себеп бола алмайды:
- A. жабық синықтар  
B. терең күйік  
C. перитонит  
D. бетте орналасқан сом  
E. мыжылған жара
7. Сепсистің клиникалық жіктелуіне тән емес:
- A. жарақатты  
B. жіті  
C. кенеттен  
D. қайталанбалы  
E. криптогенді
8. Сепсистің еміне тән емес:
- A. гипертоникалық ерітіндіні, сұйықтықты шектеу  
B. іріндікті ашу  
C. антибиотиктерді енгізу  
D. қан құю  
E. витаминді терапия

<b>OÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Әдістемелік нұсқаулық	54 беттің 1 беті

9. Сепсистің маңызды емі:

- A. біріншілік ошақты жою
- B. қатаң тосекті режим
- C. анамнезін нақты жинау
- D. қосалқы ауруларын емдеу
- E. тұқым қуалаушы факторларын анықтау

10. Сеписке тән емес:

- a. анурия
- b. тахикардия
- c. лейкоцитоз
- d. дene температурсының көтерілуі
- e. ірінді ошақ

#### Жағдайлық есеп:

Қабылдау бөліміне оң аяғының ауырғанына шағымданып 9 жасар бала түсті. Екі аптадан бері ауырады, үйде емделген. Жағдайы нашарлап, стационарға емделуге келді. Кешкісін дene қызы 400 С-қа дейін көтеріледі. Өкпесін тындағанда, біркелкі ылғалды және құрғақ дыбыс естіеді. Бауыры, көк бауыры ұлғаймаған. Оң жақ санының төменгі үшінші бөлігі терісі ісінген, қызарған, бірден ауырады. Тізе буыны көлемді ұлғайған, аяғы жартылай бүгілген. З апта бұрын партаға оң жақ санын ұрып алған. Сіздің диагнозыңыз? Қабылдау бөлімінде қандай тексерулер жүргізу керек? Сіздің емдеу ісәрекетініз?

#### Негізгі әдебиеттер:

Қазақ тілінде: Нұрмақов Аман Жәменұлы «Хирургиялық аурулар» (клиникалық дәрістер). – Алматы: Асем-Систем: 2008 - 176 бет.

Орыстілінде: 1. Общая хирургия: учебник + CD. С.В.Петров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.,2009. – 768 с.

2. Сестринскоедоловхирургии:учебноепособие.–М.,ГЭОТАР-Медиа,2009. – 400 с.

3. Общая хирургия: учебник В.К. Гостищев. –2013. - 728 с.

#### 3.10.1. Қосымша әдебиеттер:

1. Хирургия для фельдшеров: практикум. Барыкина Н.В., Заянская В.Г. -2003.
2. Хирургия. Морозова А.Д., Конова Т.А. -2005.
3. Хирургия. Рубан Э.Д. -2006.
4. Сестринское дело в хирургии практикум. Барыкина Н.В., Чернова О.В. 2005.
5. Хирургия в практике сельского фельдшера. Н.Н. Тимофеев. – Л., М., 1990.